


M. FILINGII
—
ANATOMIA
LIENIS.

1673







XII.

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

TILING, M.

65858/A J J d 1

~~4~~
~~22~~

B 2 29

XII₂

MATTHIÆ TILINGII,
Doct. & Med. in Academia Hasso-
Schaumburgica, quæ est Rinthelii
ad Visurgim, Prof. P.Ord.

ANATOMIA LIENIS,

*Ad circulationem Sanguinis, aliæque
Recentiorum Inventa, accommodata.*



RINTHELII,

Impensis THOMÆ HENRICI HAUEN-
STEINII, Bibl. Hannover. Hildensiens. &
Cellensis

Typis G. C. Wächter! Acad. Typ. An. 1673.

THE
MUSEUM
OF
MEDICAL
HISTORY
LONDON

See
M

D

C

HAS

VIC

FEL

TIN

CH

ND

I



PT

*Serenissimo ac Cel-
sissimo Principi
ac Dn.*

**DOMINO
CAROLO,**
HASSIÆ LANDGRA-
VIO; PRINCIPI HERS-
FELDIÆ; COMITAT-
TIMELIBOCI, DE-
CIÆ, ZIGENHAINÆ,
NIDDÆ ET SCHAUM-
BURGI, &c. &c.

Principi ac Domino suo
Clementissimo




Salutem ac perennem felicitatem!



*Serenissime ac Celsissime Prin-
ceps, Domine Clemen-
tissime.*

QUod olim *Hippocra-
tes*, summus ille
Medicinę dictator,
sect. 1. aph. 1. de universa Me-
dicina dixit, quòd nostrum
judicium in ea sit difficile;
hoc ego jure merito de so-
lo *Lienis* usu affirmare pos-
sum, quòd scilicet judi-
cium nostrum in eo inda-
gando



gando maximè difficile
fit. Est quidem tale judi-
cium, quod circa morbo-
rum *Διάγνωσιν, πρὸς γνῶσιν καὶ Je-
γπείας* versatur, admodum
difficile. Quædam cum
in aquam demissa sunt,
speciem curvi præfracti-
que sæpè reddunt. Sic a-
nimus noster ad perspici-
enda vera caligat, non so-
lùm in arte ipsa discenda,
sed etiam facienda & ex-
ercenda. Ast judicium,
quod sæpius nobis de ve-
ro Lieni usu est ferendum,
non difficile modò est; ve-




  

tum omnes etiam difficultates, quibus Medicina vel Anatomia unquam obnoxia fuit, facile superare videtur.

Hinc cum usum ejus accuratâ mentis acie perstringere volumus, necessum nobis est, ut cum subtilissimo Scaligero exclamemus: *Nos in luce rerum tenui caligamus, in mediocri coecutimus, in majore coeci sumus, in maxima insanimus; Et videtur nobis esse in sylva quadam ignota, ubi nec arbores cognoscamus, aut*
viam

❖ ❖ ❖
viam investigemus, nec
cœlum ipsum aut lucem
intueri possimus.

Uſus & actio Lienis fuit
certè ab ipſis Medicinæ
primordiis inter omnes A-
natomicos ac Medicos,
maximè tamen Recentio-
res, pomum Eridos. Et tot
hîc audimus ſententias,
quot ferè cœlum aſtra ha-
bet. Genuinum namque
Lienis uſum per totius Me-
dicinæ ætatem nondum
ſatis investigatum eſſe, ve-
riſſimè quilibet ſagaciſſi-
mus

mus naturæ perscrutator
fatebitur, licet omnes,
quotquot de Liene scri-
pserint, in hoc eruendo
mirè desudârint. Neque
ulla alia quæstio in descri-
benda animalium Oeco-
nomia reperitur, quæ ma-
joribus unquam agitata
sit contentionibus, quam
hæc ipsa, quæ est de usu
Lienis. Et tantum abest,
ut hoc falsum sit, ut potius
omnium verissimum, adeo
quidem, ut suasu doctissi-
mi ac acutissimi *Lindani* ad
cas bono consilio extrican-





das, Parlamenti, ceu Con-
cilii Principum ac Procu-
ratorum populi Medici
convocatione opus esset.
Idque satis appositè; tantis
enim difficultatibus atque
scrupulis scatet, ut plerique
sagacissimi etiam ab eo ab-
erraverint. Alii planè nul-
lum cognoverunt Lienis u-
sum. Alii melancholici ex-
crementi receptaculum ip-
sum vocârunt; alii medium
observantes, alicui tantum
usui dicârunt; fermentati-
onē nimirum sanguinis, co-
ctionem succi crassi & me-




lancholici, & quæ sunt huius generis officia alia ei adscripserunt.

Nec accurata partium ejus inspectio usum hunc aliquo modo illustrare valet. Partium enim munia & actiones non perpetuò ex diligenti & perspicaci organi inspectione innotescunt, cum natura exiguis machinis, hisque simplicibus, miras, ultra humani ingenii captum, edat operationes, ut contingit in musculis, ex quorum simplici structura tanta
im-




impellendi vis emergit, ut
nisi eam sensibus attinge-
remus, incredibilis videre-
tur. Aliud etiam occur-
rit, quod magis dolen-
dum; cognitionem, quam
hucusque homines in-
strumentorum etiam o-
pe tenent, adeò hebetem
& rudem esse, ut mini-
mum illud organicum,
quo naturæ maximum e-
mergit, adhuc nos lateat;
quare difficilimum vide-
tur ex accurata etiam par-
tium inspectione emanan-
tem usum prædicere. Illud

can-




tantum nobis relinquitur;
ut in cæteris humanis pro-
gressibus accidit, phæno-
menorum & effectuum
variâ observatione, agen-
tium vim, & determina-
tam causarum energiam
colligere; solent autem ob-
multiplices, quæ conjun-
ctim in animali promun-
tur operationes, mixturam
habere; ideo non raro
nos fallunt. In viventibus
ergò vigente salute ita na-
tura operatur, ut nobis
non imperantibus, & qua-
si perrennanti illo habitu



consopitis, variae nostrarum partium operationes emergant. Ventriculus, nobis etiam nolentibus, concoquit, commixto liquido adhuc ignoto; dormientibus nobis, bilis separatur, renes cribrant, & muscoli moventur; vigilantes eorum, quæ etiam nolumus, recordamur, multorum nolentes obliviscimur, ita ut sit locus *Pliniano dicto: ignota nobis sunt per quæ vivimus.*


Cum ergo Lienis usum semper tantis difficultatibus



bus irretitum viderim ,
mentem quoque meam
de eo sub peculiari aliquo
Libro, qui Anatomia Lie-
nis dicitur , exprimere,
mecum constitui. Usus,
quem ipsi in hac Anato-
mia tribui , non commu-
nis, sed ferè singularis est;
quem tali modo Anato-
micorum nemo ipsi ha-
ctenus adscripsit ; quare
etiam hanc Anatomiam i-
ta institui, ut in omnibus
veris de sanguinis circulari
motu fundamentis sit con-
formis. Materiam quidem
spi-



spinofam & maximè intri-
catam elaboravi; ejus at-
tamen gravitas, prolixitas,
& tot Autorum discrepan-
tes fententiæ me nunquam
ab hac abfterruerunt. La-
bores habui graviffimos;
verùm omnes tandem læ-
to animo fuperavi, non
immemor magni illius
mundi domitoris *Alexan-*
dri Magni. Is cum acced-
fiflet aliquando petram a-
liquam, deque ejus obfi-
dione jam tùm meditatus
fuiffet, pectâ loci ipfius
difficultate, fecum confti-
tuiſſe






ruisse fertur, inde rursus a-
bire. Sed mox incensit ani-
mo ipsius cupido naturam
quoque fatigandi. Prius in-
taque quàm fortunam ob-
fessionis experiretur, dele-
ctos suos milites, ne despe-
rarent de victoria, neque
crederent petram inexpu-
gnabilem esse, hisce allo-
quutus est verbis : *Nihil*
tam altè natura constituit, quod
virtus non possit eniti.

Hanc ergò Anatomiam
Lienis, Serenissime ac Cel-
sissime Princeps, Domine
Clementissime, ad Sere-
niss.



niss. Cels. Vestr. pedes in gra-
tiani pro multis à Sere-
niss. Cels. Vestra in me col-
latis beneficiis *ταπεινῶς*, eâ,
quâ par est, reverentiâ de-
pono, humillimè rogans,
ut illam sereno ac placido
vultu, vel, ut omnia sciet,
benignè accipiat, & Vestro
sub Præsidio prodire gra-
tiosè permittat, improbi-
que livoris dentem, ne vi-
rulentus infigi valeat mor-
sus, Sereniss. ac Celsiss. Ve-
strâ autoritate fortiter reji-
ciat, ac me ulteriori favo-
re & gratiâ complecti non
dedignetur.

DEUS ter Optimus Ma:
ximus Sereniss: Celsitud..
Vestram diutius salvam &
incolumem præstet, felici
regimine bect, totque bo-
nis tam animi quàm cor-
poris cumulet

Littora quot conchas, quot amœnas
rosaria flores,

Quotque soporiferum grana pa-
paver habet,

Sylva feras quot alit, quot piscibus
unda natatur,

Et tenerum pennis aëra pulsat avis.

Dabam Rinthelii

è museo meo die 1. SERENISS. CEL.

Martii Anno SITUD. VESTRAE

1673.

Subjectissimus

Matthias Tilingius

Med. U. D. & P. P.



Quod de LIENE opus TILINGE
moliris,

Hoc nomini, auguror, tuo dabit mul-
tum,




Librorum abunde est; Non tamen vias
clausæ

Doctis cerebris plurima ad nova inven-
ta,

Vel, quæ vetustas protulit, novâ luce
Ornanda. Prodeat liber tuus faustis
Sideribus, & diu Vale, diu Vive!

Ita festinanter vovet

G. W. Molanus.

TILLING, qVI non es petULantI
SpLEne CaChInno, *Peis: Sat. I.
De SpLEne ast porrò sCrIbere DIa
CUplS.

O indefessum Ingenium! Sic itur ad astra:
Sic TUA nostra atas posteritasque
leget. (tulor ausus!

Gratulor hunc animum TIBI: claros gra-
Det TIBI pro meritis optima quaque
Dens! (perta =

Perge novo inventa vulgare antiqua re-
Perge simul morbis ferre potenter opem,
Et bene de nostra RINTHLENSI per-
ge mereri:

Sit TIBI jam parva laude perennis
honor.

Excellentissimo TILLINGIO, Medico
famigeratissimo, Dno Collegæ &
Fautori honoratissimo, splendi-
dum de SPLENE Tractatū evul-
ganti FELICITER adprecatur
DANIEL WILHELMI, Professor
Pastor, & Ecclesiarum Haffo-
Schaumburg. Inspector.



*Ad Nobilissimum, Excellentissimum,
Experientissimum nec non Doctissimum
Virum, Dominum Tilingium utriusque
Medicina Doctore, eiusdemq; Professore
ordinarium, Authorem libri, Collegam,
Fautorem & amicum suum plurimum
honorandum sterili venâ fudit
rogatus*

Johan. Helfrich Chuno J. U. D.

Sunt qui præfigant vultus in fronte li-
brorum

Et doctâ ponant lumina picta manu,
scilicet ut cunctis facies ac ora verenda
Sint nota & major inde resultet honos
Nec malè; nam pulchro sicut de corpore
virtus (let.

Quæ manat semper pulchrior esse so-
lic augent famam quæ grata videntur in
Lumina nec parvū mentis & ingenii (ere
iudiciū præbent. At tu qui clarus utraq;
Arte rei medicæ est, hisce movere nihil
Non pictâ facie non vultu charta super-
bit

Nec

...

...

...

...

...

...

...



Nec curas, fallax quam tibi peniculus
Promittat Venerem, est aliud tibi suppe-
rat unde

Gloria, sunt alia, quæis tua felicius (que
Fama viris doctis animus, mens ingeniū-
detegitur. nempe nomē ad astra ferunt
Alta tuum libri & quæ plurima lemmata
nobis

Jam pridem exhibuit, docta Minerva
Es quos sermones iterum nunc lumine
multo


Nectis de splene & quā queat arte ma-
Illius auferri, Medico quæ cura adhiben-
Et quæ præterea, continet iste liber (da
Nonne tuum verè testantur mentis acu-
men?

Sic nullus dubito, Gratulor ergo tibi
Nec nō successus dignos conatibus opto
Ac ut vota Deus impleat omnipotens
Nam nova sic scriptis semper tibi gloria
libris

Crescet & alta tuum nomen ad astra
feret.

Dabam Rinthelii ex Museo

A. 1673. 12. Cal. Mart.





INDEX

Sectionum & Capitum,
quæ hac in Anatomia Lienis
continentur.

*Anatomia Lienis Prefatio, in qua de nobi-
litate & præstantia hujus visceris in
corpore humano agitur.*

pag. 1.

*Anatomix Lienis Sectio I. Lienis ad-
mirandam structuram, secundum ejus
situm, connexionem, substantiam quan-
tatem & qualitatem repræsentat.*

p. 27.

*Cap. I. Lienis definitionem nominalem
examinat. p. 27.*

*Cap. II. Realem Lienis descriptionem
sen latè dictam definitionem detegit.
pag. 36.*

Cap. III. Lienis situm ostendit. pag. 39.

*Cap. IV. Lienis connexionem & con-
sensum cum vicinis partibus expo-
nit. pag. 50.*

*Cap. V. Quaritur primò: An Lien in in-
fimo ventre corporis humani nobi-
lior*



lior ac praestantior hepate sit, & an
locus supremus ei debeatur? p. 61..

Cap. VI. Queritur secundo: Cur he
par potius in dextro, & Lien in
 sinistro hypochondrio locum habeat?

Cap. VII. Queritur tertio: Cur in ho
mine, & ad ejus normam in aliis
 quoque animalibus Lien semper
 sinistro hypochondrio situs sit? pag.
 75.

Cap. VIII. Queritur quarto: utrum
 situs Lienis in sinistro latere plus i
 boris, motuique expediendo prom
 ptitudinis huic lateri quam hepa
 dextro conferat? pag. 79.

Cap. IX. Lienis substantiam & pr
 mum ejus carnem exhibet. pag. 91.

Cap. X. Lienis fibrae praeponit. pag. 111.

Cap. XI. Lienis membranas illustrat.
 pag. 126.

Cap. XII. Lienis vasa & primū
 jus arterias disquirat. pag. 234.

Cap. XIII. Lienis venae perscrutatur
 pag. 146.

Cap.



Cap. XIV. *Lienis vasa lactea indagat.*
pag. 166.

Cap. XV. *Lienis vasa lymphatica per-*
vestigat. pag. 173.

Cap. XVI. *Lienis nervos perspicit.* pag.
177.

Cap. XVII. *In vasorum Lienis capsu-*
lam inquirat. pag. 186.

Cap. XVIII. *Lienis materiam ac rem-*
pus generationis continet. pag. 187.

Cap. XIX. *Lienis quantitatem conti-*
nuam ac discretam, & primò ejus
magnitudinem perlustrat. pag. 190.

Cap. XX. *Lienis numerum compre-*
hendit. pag. 202.

Cap. XXI. *Lienis continuitatem con-*
templatur. pag. 209.

Cap. XXII. *Lienis qualitates explanat*
pag. 212.

Cap. XXIII. *Lienis colorem intuetur*
pag. 214.

Cap. XXIV. *Lienis figuram delineat*
pag. 217.

Cap. XXV. *Lienis superficiem cir-*
cumscribit. 223.



Anatomiae Lienis Sectio II.

Verum Lienis usum in corpore humano certis ac validissimis rationibus remque innumeris ferè autoritatibus demonstrat. pag.

225.

- Cap. I.** *Veterum & recentiorum Anatomicorum ac Medicorum de usu Lienis opiniones recenset. pag. 225.*
- Cap. II.** *Cogitata Medicorum ac Anatomicorum quorundam precipue circa Lienis usum enunciat atque examinat. p. 173.*
- Cap. III.** *Primum ac verum Lienis usum, qui est sanguificare, manifestat. pag. 293.*
- Cap. IV.** *Alterum Lienis usum; scilicet tincturam illam nobilem, quam ipse in se generat, fideliter propalat. pag. 315.*
- Cap. V.** *Tertium Lienis usum: qui est sanguinem beneficio & ope huius tincturae nobilis à succis crassis, tartareis, & salinis liberare, eumque*

hic ratione purificare, declarat. pag.
323.

Cap. VI. Universe Lienis compagis
auxilium, quod hisce actionibus
desert, memorat. pag. 333.

Cap. VII. Tinctura illius nobilis ac sin-
gularis in Liene producti nobilita-
tem ac praestantiam in appetitus
corroboratione chyificatione, san-
guificatione, spirituum generatione,
nutritione, feminis elaboratione &
excrementorum sequestratione per-
tractat. pag. 340.

Cap. VIII. Lienem non immediate
per certos quosdam meatus partes
sanguinis terrestiores, tartaro &
salibus sylvestribus imbutas, sed sero
copiosiore mixtas expurgare; ve-
rum tincturam ejus coquere, fer-
meptare, digere re ac ita disponere i-
stas, ut postea in singulis corporis e-
mundioris, si non unâ vice, crebria-
retamen transitu, beneficio circula-
tionis commodius segregari & ex-
pelli possint, docet. pag. 367.

Cap. IX. *Vsum Lienis secundarium*
proponit. pag. 382.

Anatomix Lienis Sectio III.
Lienis affectus præter naturales enum-
rat. pag. 387.

Cap. I. *Lienis affectus p.n. in intemper-*
rie & in situ mutatio proponit. pag.
387.

Cap. II. *Lienis affectus in magnitudi-*
ne aucta vel imminuta p.n. addu-
cit. pag. 392.

Cap. III. *Lienis affectus p.n. in substan-*
tia perpendit. pag. 400.

Cap. IV. *De Lienis affectibus p.n. in*
mitate soluta, & quidem primò de
ius ulceribus agit. pag. 414.

Cap. V. *Lienis vulnera examinat. pag.*
415.

Cap. VI. *Veterum σπληνотомίαγ ratio*
facit. pag. 419.

Cap. VII. *Lienis affectionem demonstrat*
pag. 438.

Cap.



Cap. VIII. *Ad Lienis symptomata, & primum ad ejus dolorem progreditur. pag. 442.*

Cap. IX. *Lienem variorum morborum & symptomatum aliarum partium per consensum esse featuriginem demonstrat. pag. 445.*

Cap. X. *Ventris supremi in corpore humano affectus & symptomata, quae à Liene ortum trahunt, enarrat. pag. 448.*

Cap. XI. *Ventris medii in corpore humano affectus & symptomata, quae Lienem primum autorem agnoscunt, proferit. pag. 454.*

Cap. XII. *Ventris infimi in corpore humano affectus & symptomata, quae causam radicalem in Liene habent, exprimit. pag. 456.*

Cap. XIII. *Febres, quarum fons Lien est, exprimit. pag. 472.*

Cap. XIV. *Externos quosdam corporis humani affectus à Liene provenientes producit. pag. 479.*

✠✠✠ ✠✠✠

Anatomia Lienis Sectio IV.

Quaestiones quasdam singulares ad Lienem spectantes ventilat. pag. 477.

Cap. I. *Queritur* (1.) *An Lien semper sit sedes & causa melancholiae?* pag. 477.

Cap. II. *Queritur* (2.) *An Lien pro vero ac proprio subiecto in quolibet scorbuto haberi possit?* pag. 484.

Cap. III. *Queritur* (3.) *An in affectibus Lienis potius in sinistro quam dextro latere vena sit secanda?* pag. 488.

Cap. IV. *Queritur* (4.) *An saluatella sectio in affectibus Lienis eam, quae vulgò iactatur, utilitatem habeat?* pag. 490.

Cap. V. *Queritur* (5.) *An haemorrhoidum & mensium provocatio in affectibus Lienis conveniat?* pag. 494.

Cap. VI. *Queritur* (6.) *An Lienosis in usus aceti conducatur?* pag. 495.

Cap. VII. *Queritur* (7.) *An Lienosis & scorbuticis fontes aciduli conveniant?* pag. 498.

Cap.




Cap. II^x. *Quaritur* (8.) *An in Lienis ac*
hepatis obstructionibus chalybis usus
prosit? pag. 500.


Cap. IX. *Quaritur* (9.) *Num etiam mo-*
derata quadam ambulatio Lienis
conducibilis? pag. 508.











Σὺν Θεῷ καὶ νῶ.

ANATOMIÆ LIENIS

PRAEFATIO.

In qua de nobilitate & præ-
stantia hujus visceris in corpore
humano agitur.



Uemadmodum res
humanæ surgunt, ca-
dunt, & rursus, quæ
cecidere, resurgunt,
ita & opiniones sen-
tentiarq; mortalium

de rebus: fuerunt secula, quibus antipo-
les esse omnes uno ore affirmabant:
successerunt *Augustini & Lactantii*

A

tem;

tempora. quibus ii, qui ita sentiebant
damnabantur; jam rideretur, imò im-
nus haberetur, qui negaret: ita de m-
tu terræ: & solis quiete in Astronomi-
cis, jam probabile est, aut ut minimū
tolerabile, quod annis abhinc quinqu-
ginta & ultra tantū non inter ho-
reses computabatur: & quis scit, an
lunæ incolis opinio, de quibus jam
furrari audimus, non aliquando maj-
rem accipiet à tempore probabilitatem.

In microcosmo certè eadem est se-
tentiarum varietas: ut de circulatio-
sanguinis taceamus, quæ prorsus non
videtur scientia potius quàm opinio.
Quid dicamus de liene. Hic olim, nun-
tamen suâ culpâ, præ omnibus aliis
scribis contemptus fuit. De hoc tam-
altè Philosophati sunt homines, ut, in-
glectâ planè mirandâ Lienis organ-
compagē, merum crediderint pondus
quo sinistrum corporis latus dextro co-
jccoris præponderantiam, æquaretur:
pud alios nec ad ponderis munia est
vocatus, sed inutile quoddam naturæ

ervacaneum, veriusque abscindendum
reputatum est; & quoniam veterum sol-
licita fuit cura, naturam in multiplici ex-
crementorum generatione eorumque e-
liminatione perpetuò retinere, ideò in-
ter viscera, quæ copiosè ad hujusmodi
operas destinârunt, non infimum habuit
splen locum, cum ad terrestriorem sepa-
randum limum damnârint. Et certè Lien
in partium corporis nostri numero erat
abjectissim⁹; Capilli & ungues nobiliori
fruebantur conditione. Ex antiquis enī
Erasistratus, uti narrat *Galenus* l. 4. d. usq.
part. c. 15. Lienem frustra esse factum
existimavit; & quoniam natura in uterò
hepar in dextris conformavit, metuit, ne
artis suæ oblivisceretur, ipsa ex sinistris
partibus splenem apposuit, volens hac in
parte aliquid etiam moliri. *Aristoteles*
l. 3. d. part. animal. c. 7. non nisi ex eventu
necessarium esse scribit, licèt trahere a-
liquando à ventriculo excrementum, il-
ludque conficere voluerit. *Ruffus E-*
phesius membrum otiosum vocat & nul-
lius usus. Alii, & maxima quidem vete-

rum pars hunc pessimi excrementi melancholici sedem & receptaculum dixerunt, quasi ipsi cum spurco & coenoco duntaxat sanguine res esset, & sedes melancholiæ existeret, acidoque humore in ventriculum effundendo pervas bene venosum inserviret. Quod probro quibusdam saltem Lienis datum videtur.

Quamvis ergò Lienis autoritas olim fuerit præ omnibus aliis visceribus minima ac planè abjectissima, singulari tamen Neotericorum Anatomicorum industriâ nunc in tali honoris fastigio positus est, ut ferè cum principibus corporis nostri partibus de nobilitate & præstantia certet. Ea certè est Lienis in corpore nostro præstantia & nobilitas, ut vel rudis & imperfecta ejus cognitio expetibilior sit, quam exquisita & perfecta aliarum partium. Ejusmodi autem præstantia & nobilitas elucescit maximè ex actionibus, quas perficit. Eum enim unumquodque judicatur nobilitate & excellentius, quo illustrioribus viribus præditum & præclarioribus de-

PRÆFATIO. 5

bus ornatum est; id est, quò est opifex
unctionum nobiliorum, quarum fru-
ctus & emolumentum in plures redun-
dat. Dicimus, ab actionum præstantia
argui partis nobilitatem, quia partes
sunt in gratiam actionum.

Posthabitis igitur veterum de Liene
omnibus, actiones ejusdem nobis repræ-
sentantur manifestiores, nobiliores ac
præstantiores. Quòd enim appeti-
tus excitetur, chylusque probè &
eliciter in ventriculo ex alimentis
sumptis coquatur, inque sangui-
nem commutetur, Lien facit: quòd spi-
ritus tam vitales quàm animales benè in
corde & cerebro generentur, & in actum
ascendantur, Lien facit: quòd semen in te-
stibus cæterisque vasis spermaticis præpa-
retur ac perficiatur, Lien facit: quòd san-
guis in universo corpore depuretur, ex-
altetur ac illustretur, nutritioniq; idone-
reddatur, Lien facit; hic enim ipse sangui-
nem generat, reliquoque sanguini talem
dispositionem tincturâ suâ imprimit, ut
usus usus ad omnes actiones obeundas

illustrior ac laudabilior evadat. Quae
denique etiam fuligines sylvestres
pulmone, mediante respiratione, expun-
gentur: bilis in hepate, cæterique hu-
mores excrementitii in pancreate: hu-
miditates serosæ in renibus, reliquæ quæ
noxiae superfluitates in habitu corporis
& cæteris emunctoriis exactè à sanguine
separentur; & in hisce locis eliminantur.
Lien autor est. Namq; sanguis è chylo
de elaboratus quasdam particulas adhuc
imperfectas recrementis mixtas obtinet
quæ deinde in aliis officinis, institutâ
teriore coctione, segregantur, & diver-
simodè in locis secluduntur. Pars quidem san-
guinis subtilior ad mentis arcem cer-
ebrumque sublimatur, cum ut istud nou-
triatur, tum ut ibi ulterius alteretur, co-
quatur, & pro sensuum ministerio exa-
retur, retrimentis per palatum, nares, oc-
culos, aures; suturas, ipsosque totius cra-
pitis poros emissis; pars verò crassior in
feriora petit, non solum ut convenienter
omnibus membris nutrimentum offe-
rat, sed quoque, ut coctione ubivis poris
depuretur, & in regressu ad cor ad me-

orem perfectionem aspirare queat.
 Lien hic suam navat operam. Et hoc
 purandi sanguinis munere, ut scribit
Andr Laurentius l. 1. Histor. Anat. c. 18. si
 austretur Lien, mirum dictu est, quàm
 dè emergant & suscitentur symptoma-
 Nam & spiritibus tenebræ offun-
 untur, & tetra ad cor cerebrumque ef-
 ertur anathymiasis, & livet palletque u-
 iversum corpus: Unde Stratonicus Cy-
 narædus in Caria dicebat ambulare
 mortuos, quòd Lienosi essent omnes.
 Interim hoc adserimus, præter rationem
 non esse, Lienem, vitâ superstite, iis, qui-
 us per naturam inest, abesse posse:
 & a deò necessarius sit non tam ad esse,
 quàm ad benè esse: non tam ad nutri-
 onem ac conservationem simpliciter,
 sed ad nutritionem ac conservationem
 meliorem, utpote ad sanguinis tenuioris,
 laboratoris ac magis spirituosius in cor-
 e nimirum à continuo motu sanguinis
 fermentativo producendi generatio-
 nem. Unde infelicitè vivunt, qui eo
 arent, nisi ejus munere aliud defunga-
 ur viscus.

Astrologi quidem Saturnum Planetarum frigidissimum, siccissimum funestumque Lienī præfixerunt, cum tamē ille nec calore, nec humiditate modico scateat, multò minùs autem tot tantarumque calamitatum ferax vitæ valetudinisque nostræ principiis insidietur. Id in causam inquirimus, cur Astrologi hoc fecerint, variz Autorum opinionēs sese exhibent. Non absque causa, inquit *Franciscus Osuvaldus Grembsius in Arbor. integr. & ruinos. l. r. c. 8. §. 6.* antiqui Saturnum spleni dedicârunt tanquam deastrorum parentem, qui deorsum in reliquas influeret, & pueri devoratores dixerē, significantes per hoc, quòd imāgines à facultate irascibili fabricatæ, semina & hospitia in nobis fœcundent; quando verò exorbitat, novellum sanguinem consumunt, & plurimos morbos generant. Ex alia ratione veteres spleni adscripserunt Saturnum, quem in forma fauni generis hominum salacissimi pinxere; & excitari Venerem credebant à splene, & non à renibus, &

pro-

propterea primi Veneris motus sentiri circa os stomachi, non secus atque feræ poenitentiae; quare Venus animæ officium habet in parte, in qua primi motus; hinc vita caduca degener initium ducit; observatur etiam, primorū motuum irrequiem per Venerem lassari, & perinde splenem per Venerem purgari.

Alii opinantur hoc evenisse, quod Lien frigidus affectus & siccus v. gr. hydropem, scirrhus, cachexiam, melancholiam producat: & sic diuturnorum morborum fons uberrimus existat, cujus calor & humiditas etiam; exsicicans licet esse videatur, debiliortamen & parciior omninò sit, si cum cordis, hepatis & aliarum partium, sanguificationi inservientium, calore humidoq; comparetur. Quemadmodum enim regnante Saturno, regionem elementarem sublunaremque frigore, ventis, pluviis nubibusque opacis imbui & obduci constat, eandem ad rationem in proclivieffe, Liene tanquam microcosmi aliquo Saturno, dominium acqui-

rente in corpus nostrum, cuiuslibet membrum obtingere, & in his ipsis spectari effectus consimiles, quos Saturnum in macrocosmo solitum excitare pro comperto habetur.

Verum, etsi hæc omnia suo sensu rectè se habere possint, atque inter illos analogia quædam quoad effectus enumeratos intercedat; cum tamen hi ipsi non sint benè & secundum naturam operantis, sed præter naturam & malè agentis causæ alicujus, vel Saturni aut Lienis iradices, (nihil enim ad integritatem totius spectans, sibi ipsi aut illi, cujus in gratiam natum est & conditum, interitum inferre) existimamus velle nomine, Lienem adsignatum pro domicilio Saturni fuisse, aut huic æquiparandum, quoniam primum Lien est viscus tale, quod potentissimum in corpore universo exercet dominiam; deinde quod utilissimum ac maximè ad vitam necessarium est, adeoque ut *Helmontius* dubiè haud scripserit *Tractat* quod calor non efficiatur digeratur, sed excitativè: auræ & Saturni

ia regna Lienis subsidio nos possidere
vivere.

Hujus visceris nobilitatem ac præ-
stantiam non parùm etiam variæ & qui-
dem gravissimæ infirmitates & symp-
tomata, quibus interdum exponitur, ar-
guunt. Quò enim pars in corporis no-
stri œconomia nobilior ac præstantior,
quàm majoribus, gravioribus ac periculo-
sioribus morbis obnoxia est, ut in cere-
bri & cordis adfectibus pro dolor vide-
mus. Quemadmodum autem floren-
te Liene, omnia in corpore nostro flo-
rent, ac fermentatione ejus naturali ve-
getiora fiunt, spirituque copiosiore per-
unduntur; ita si per vitium Lienis quod-
cunque sensibile, vel sensibus fortè mi-
nùs perceptibile, fermentationis hujus
accidat defectus, flaccescunt omnia in
corpore, ac spiritu deficiente tandem
torpent atque concidunt: hinc menti
offunduntur tenebræ, mœstitia obori-
tur, livescit corpus universum, ac pallore
facies fœdatur. Hic malè affectus tò-
tius corporis œconomiam turbare, plu-

rimasque partes in consensum trahere potest. Imò quod *Democritus* ad *Hippocratem* de utero scripsit, quod sequitur sexui sexcentarum ærumnarum aut sit; idem & de Liene, quòd infinitarum ferè calamitatum faber existat, adsistere nulli dubitamus; quod etiam nobiscum varii viri in arte Medica & Anatomica excellentissimi putant, quando Lienem fontè illum malorum nostri corporis ferè omnium, si malè habet, salutant.

Dicat nobis quispiam in corporis nostri structura artificiosissima ac summe miranda partem, ex cujus actione læsa plures, majores ac graviores morbi pronascentur, quàm ex Liene, malè in actionibus suis habente. Ex eo enim malè affecto oriuntur apoplexia, epilepsia, paralysis, contractura, incubus, vertigo, catarrhi, dolores capitis, deliria, insomnii immoderata, melancholia, amentia, rabies, phrenitis, mania, ptyalism^{us} cordis palpitationes, febris hectica, cæteræq; febres tam continuæ quàm intermittentes, asth-

phthi-

na, phthisis, pleuritis, indigestiones, appetitus dejectus, singultus, cruditates, vomitiones, cardialgia, ructus, flatus, ventris murmura, alvi constipationes, ejusdemque fluxus nimii, hepatis obstructions, passiones hypochondriacae, hydrops, cachexia, icterus, scorbutus, mesenterii, pancreatis & vesiculae felleae obstructions. Patitur ipsemet male habens obstructions, inflammationes, tumores, ulcera, producitque non raro icterum nigrum aliosque affectus gravissimos. Ex eo male disposito & in actionibus suis corrupto propullulant haemorrhoides tumores, fluxusque haemorrhoidum, calculi renum, vesicae, pollutiones nocturnae, muliebri profluvium, passio hysterica, mensium suppressiones, podagra, arthritis, cancer, scabies, elephantiasis, ulcera tibiarum, varices, oris ulcuscula, &c. Atque sane impossibile nobis esset, omnes affectus & symptomata, quae Lieinem tanquam fecundissimam matrem agnoscunt, enarrare.

Ad quorum autem morborum ac
sym-

symptomatum jam recensitorum omnium
 generationem non parùm etiam ventri-
 culus confert. Splen enim & ventricu-
 lus in unum conspirant, unum constitu-
 unt regimen; majoremque consensum
 cum ventriculo habet Liē quàm hepatis.
 Hinc etiam ventriculo malè se habente,
 malè etiam se habet Lien; & Liene id
 contrario florente ac vigente, floret ac
 viget etiam ventriculus. Hujusmodi Lie-
 nis & ventriculi conspirationem egre-
 giè nobis ante oculos ponit Cl. *Franti-*
siscus Osvaldus Grembsius Arbor. integr.
& ruinos. l. 2. c. 1. §. 4. ita scribens: *Sto-*
machus & splen unum regimen constitu-
unt, & primi motus spleni, & primi sen-
sus stomacho competunt, unde splen maris
nomen, & stomachus mulieris habet, quae
duo si benè conspirant, tùm œconomia na-
turalis ritè peragitur; si verò dissentiunt,
tùm partim oriuntur excentricitates, fa-
bricantes ideas morbosas, & figentes in ar-
cheali corpore, unde fiunt entia potentiissi-
ma, quæ in ipsum anima janitorem ar-
cheum agere possunt. Anima archeo im-

mediate utitur in splene residenti, qui determinat actiones animæ in stomacho, nam anima vix quidquam meditatatur extra oem archei, & archeo velit nolit utitur semper, atque iste duum viratus archæus omnium ferè morborum causa existit; uti verò anima in partibus operativa magis sentitur, ita morbosa entia in duum viratu fabricata per actionem regiminis partem unam magis afficiunt quam alteram; sic in splene morbosum ens asthmatis residens per solam actionem regiminis pulmonum viros constringit: sic quoque in duum viratu alia morbosa entia suam tyrannidem nos exercent; imò si splenis archæus proprio & spontaneo luxu regimen subrahatur, tum fiunt apoplexie, epilepsie, vertigines, & cum duum viratus ex radicali ordinatione continuo phantasia incumbat, ideo accidentia in illum late viriant imaginationis œconomiam: qua causa unica est, cur antiqui sedem melancholie in Liene collocaverint. In splene igitur omnis origo perturbationum, à quibus solis passiones hypochondriacæ ortum habent. Si quis horum

rum

rum duorum viscerum æconomiam intellexerit, quæ conspiratio, activitas ac potestas sit, tum facile ruinosum hominis stultum hypochondriacum percipiet; dum enim hæc duo non benè conspirant, in ataxiam distracta, per quam potestates magis ac magis conculcantur & fermenta pessumdantur; ab isto malo regimine omnis morbi initium sumit, & licet in aliis visceribus stabulati esse videantur, habent tamen vel fomentum vel occasionem primam eundem viratu, malè habente, vel ex potestativa facultate malè gubernante.

Cùm igitur Lien benè dispositus tam illustribus virtutibus præditus, & præclarioribus dotibus ornatus sit, ac è contrario malè constitutus tam innumeros ferè morbos secum ducat, summâ industriâ indaganda ac perscrutanda est omnibus Medicis ejus anatome, si alia veri morborum curatores videri velint. Veri autem esse possunt Medici morborum curatores & expugnatores, si hujus visceris artificiosam summeque mirandam structuram ejusque usum nobilem

benè

benè perspiciant explorentque. Hinc etiam *Fr. Sylvius*, Medicus & Professor inter Batavos celebratissimus *Disputat. Medic. 5. de Lien. & Glandul. usu*. Prae-
dicos Medicos hortatur, & obtestatur ad unum omnes, quò secum eximii hu-
us visceris præstantiã expiscentur, atque illam ubi agnoverint, in suorum ægro-
rum commodum praxin Medicam in quibusdam emendent, aut saltem refor-
ment, ac errare desinant.

Nemo certè, ut aliàs cuivis Medico notum est, unquam ex arte faciet Medicinam, qui functionum quarumvis læsa-
rum causas proximas & remotiores non cognoverit. Cognoscat illas nemo, qui partes, in quibus, & causas omnes, à quibus secundum naturam singulæ functiones fiunt, nō præcognoverit. Hæc omnia præcognoscat nemo, qui anatomes imperitus, ac proinde contemptor, ex sui alteriusve quantivis etiam hominis cerebri figmentis corporis humani fabricam molitur & nugatur.

Morborum igitur cognitio, anatome,
duce.

duce & luce acquisita magni est momenti, neque parvi à nobis ducenda. Nam qui optimè cognoscit sanitatis vel morbi in partibus causas, ille optatò etiam earum integritatem vel errorem curabit. Facile in statu naturali corpus conservabit, vel in præternaturali, quantum possibile est, ad perfectionem pristinam revocabit, gemino suo officio satisfactorus Medicus. Efficientes enim utriusque causæ pro diversitate partium diversimodè sæpè operantur, adeoque vel accidentia naturalia vel præternaturalia omnis generis pro ipsarum dispositione variant.

Hinc non mirum, quòd anatomes contemptores, ignorantia partium corporis tenebris stipati, in curando nesciant, quid agant, quo ve se vertant, quòd nunc pleuriticum censeant, qui inflammatione hepatis laborat: quod nunc calculosum, qui quoad mesenterium præcipuè obstructus: quod nunc synopticam, quæ hysterica, judicent.

Sic refert *Galenus l. 5. de loc. affect. c. 7.*

Me-

Medicum Siculum hepatis inflammatione laborantem, cum punctiones ad costas nothas tussimque & difficultatem expirationis advertisset, indeque pleuritico tentari morbo, falsò credidisset, euasse. Perspectis etenim omnibus hepatis inflammatione eum laborare adsevit. Indeque curâ feliciter peractâ, magnam & sibi & arti Medicæ gloriam conciliavit peperitque. Non dissimilem ecchinorosi pro pleuritico curati historiam habent *Petrus Forestus lib. 19. observat. Medic. 3. & Anton Benivenius lib. de abdit. morb. caus. c. 76.*

Hujus farinæ Medici persimiles sunt is cœcis, qui cum baculo iter faciunt; in locis tutis timidi sunt, in periculosis securi: Insuper, quomodo pars primariò & per consensum sit affecta, discernere nesciunt. Cum præsertim omnibus Medicis sanioribus illud diligenter in morborum curatione notandum veniat, partem scilicet læsam sæpè partes alias in consensum trahere, imò satis frequenter actionem læsam non tam in parte

parte affecta, quàm illâ, quæ per consensum afficitur, manifestè conspici. Ideoque videndum illis est, ne in loco affecto per actionem læsam cognoscendo, errent, atque eam, quæ per consensum affecta est, partem pro primariò affecta habeant & Empiricorum errorem errent, qui semper eo in loco, ubi symptomata vident, ad affectum curandum censent. Ne autem in hunc errorem incidant, imprimis eis corporis humani anatomia & functiones notissimæ sint oportet, ut sciant, qui nervorum & muscularum ductus, situs & officium sit, & quæ partes, per quas mutuum consensum habeant. Sæpe enim accidit, ut morbus uno in loco sit, eo scilicet, è quo nervi vel musculi exordium ducunt, actio verò læsa in alia parte appareat, eadem nimirum, in quam inseruntur. Id quod ex historia à Galeno *de loc. affect. c. 6.* annotata videre est. Occurrit enim Galeno quidam, qui medicamentum aliàs satis conveniens, triginta diebus, digitis tribus, qui sensum amiserant, fruat

strat

trā adhibuerat. Cū verò Gale-
us comperisset, neque inflamma-
tionem, neque refrigerationem, neque
etiam præcessisse, sed ipsum paulatim
sensum amisisse: è vehiculo verò deci-
disse, & dorsi initium fuisse affectum:
inde conjecturam fecit, in primo exortu
nervi, post septimam vertebra prode-
ntis, partem quampiam obiectum fuisse
inflammata, ac nunc scirrhosam habere
dispositionem: & propterea idem
medicamentum illi spinæ parti, quæ af-
fecta erat, adaptavit, sequutaque est res
adspicientibus videbatur, & admira-
bilis & inopinata, quòd digiti manûs, ad-
hibitis spinæ medicamentis, essent cura-
ta. Talia quotidie in corpore humano
evenire possunt. Itaque si in mem-
bro aliquo sensus vel motus lædatur,
non solum ad illam ipsam partem respi-
ciendum, sed si illa nihil mali passa sit, vi-
tendum, qui nervi in eam inferantur,
musculi eam moveant, & unde nervos
musculi illi accipiant; inquirendumque,
in partes illæ, unde musculi & nervi o-
riun-

riuntur, aliquid mali passæ sint. Ita enim
rectissime in loci affecti cognitionem
pervenire potest, nec opus est, partem
in qua mali origo non hæret, frustra me-
dicamentis fatigare.

Hæc omnia, ut & opprobria, quæ
eræ medicinæ ob errorem prædictorum
innoxie adsparguntur, ut evitet Me
cus rationalis, audiat Hippocratem, ma
gnum illum omnium Medicorum pare
tem, lib. πει τῆς ἀρχαίας ιατρικῆς
ita differentem: οὐκ ἐστὶ δύνατον ἰατρ
κὴν εἰδέναι, ὅστις μὴ οἶδεν ὁπῶς ἐχέει
πρῶτον ὁ ἀνθρώπος, καὶ ὁπῶς συνεπάγ
Non est possibile Medicam artem scire, q
non novit, quomodo factus primū sit ho
mo, & quomodo sit constructus. Sequat
Avicennam, jubar illud Arabum sple
didissimum lib. I. fen. 2. tract. 5. c. 1.
ta scribingem: oportet illum, qui vult
gritudines cognoscere, qua in mem
sunt, anatomes cognitionem habere. I
gat Archangelum, Piccol hominum P
lect. Anat. lect. 2. ὥς ἐν συνόψει opus h

Ilustri explicantem commento: *Ut pa-*
us expediam, quasunque res ars medica
propositas habet, eas omnes (Anatome)
vel in corpore humano ejusque partibus o-
mnibus examinat, atque meditatatur, vel
et corpus humanum ejusque partes omnes
tanquam in propositum scopum refert, cum
vel unum assidue meditetur, in idq; unum
perpetuo incumbat, ut corpus humanum
partesque ejus omnes vel sanas conservet,
vel agras sanet & erigat. Quin etiam A-
natome inspectione & sensuum observatio-
ne comparata ad memoriam medicarum
rerum plurimum valet. Nam ex cor-
poris partibus, tanquam ex locis commu-
nibus, omnia eruuntur, & in corporis par-
tes tanquam loca communia omnia conji-
untur.

Imò æquè magno habeat Anatomem
in æstimo, ac nauclerus magnetem
aut acu nautica, miles gladium, archi-
ectus ulnam. Sic hoc ariadnæo filo du-
to per infinitos ac recurvos illos mor-
borum corporis nostri labyrinthos me-
are, permeare, ex omnibus tricus felici-
ter

ter se expedire, occulsa reserare, in eru-
pationum practicum se præstare, salvosque
& incolumes invalidos reddere valebo
hæc consilia animo securo sequutus.

Optimus itaque salutabitur Medicum
laudemque insignem ac gloriam consec-
quetur; nec fortunâ adversâ utetur, si
succes⁹ in praxi habebit insignes, si Lien-
is, visceris infimi ventris nobilissimi
præstantissimi structuram diligenter in-
dagaverit: cujus quidem legitimus usus
ad hæc usque tempora totus rixis & li-
dubiâ involutus jacuit; jam verò certi-
rem veritatis spem, singulari Neoterico
rum Anatomicorum industriâ scrutato-
ribus ostendit. Cùm autem tot ferè
usu Lienis sunt opiniones, quot sunt
scriptores Medici, ac Anatomici, à vet-
ribus hac in parte agitata dubia, laud-
bilesque modernorum Autorum con-
tus & labores breviter in hac Anatomia
Lienis ante oculos ponemus, & quæna
sententia veritati quàm maximè consen-
na sit, eruere conabimur.

Quibus præmissis, aggredimur nunc
ipsam

osam Lienis Anatomiam, quam, juxta
 methodum, nobis hactenus usitatam,
 succinctè ac breviter tractantes in qua-
 tuor dispescemus sectiones; quarum
 prima admirandam Lienis structuram,
 secundum ejus situm, connexionem, sub-
 stantiam, quantitatem & qualitatem, re-
 præsentabit. Altera verum Lienis u-
 tum certis ac validissimis rationibus, i-
 temque innumeris ferè autoritatibus
 demonstrabit; ubi plurimæ de Lienis
 sensu veterum recentiorumque sententiæ,
 ad accuratum visceris hujus nobilis exa-
 men Anatomicum, tanquam ad splen-
 didum solis fulgentis lumen sponte ac
 a disparebunt, ut confutatione haud
 videantur indigere ulteriori. Tertia
 defectus Lienis præter naturam certo
 ordine enumerabit. Et demum quarta
 quaestiones varias ad Lienem spectan-
 tes ventilabit. Et hæc omnia certis ca-
 pitulis ornare studebimus.

Spinosa sanè & abstrusa est materia,
 quam hic tractandam suscepimus; labo-
 res sunt ardui, quos hæc efflagitat; vires

autem sunt debiles. Ad Te ergò confite-
gimur, Summe DEUS, provide partium
corporis nostri conditor ac moderato-
r, adesto nobis divino Tuo auxilio; adju-
va nos, onus subleva, & benedictionis Tuae
radios in nos largiter effunde: Spiritus
Sanctum, qui nos in omni veritate
ducat, rectumque hunc cursum perage,
nobis cœlitus mitte, ut bonum, felix
& faustum fortunatumque nobis sit hoc
opus, atque omnia in Tuam gloriam
multorum hominum miserrimorum
Autem vergant, elementissimè con-
cede.

Ana




NATOMIÆ LIENIS

SECTIO I.

lien^{is} admirandam structuram, secundum ejus situm, connexionem, substantiam, quantitatem & qualitatem repræsentat.

CAPUT I.

Lienis definitionem nominalem examinat.

 Ub initium hujus capitis commode Lienis etymologia nobis deducenda venit; quæ vel propterea præmittenda videtur, quod Autore Galeno 1. Meth. med. c. 5. perturbatus nominum usus rerum quoque notitiâ perturbet, & quod teste Socrate: ἀρχὴ τῆς ποιητικῆς ἢ τῶν ὀνομάτων ἔστιν ἐξ ἧς, initium doctrinæ nominum consideratio sit. Lien ergo unde originem suam ducat, admodum incertum est, nec ab autoribus, conquerente Adriano Spigelio de fabric. corp. hum. l. 8. c. 14. hoc non traditur; quæcunque enim ejus notationes adferuntur, meræ sunt

conjecturæ. Antiquis hic Lienis dicebatur, tribus syllabis constans, in nominativo, ut sæpius apud *Hippocratem* legimus, & *Galeott. Mart. de homine inter c.* 1.2. pag. 103. etiam refert.

Quamvis autem de origine hujus vocis apud Autores alium sit silentium, variorum tamen variorum hinc inde inventiuntur derivationes. Excell. *Mæbius in fundam. Med. Physiolog. c. 16. §. 1.* *Λαῖος*, lævus seu sinister, cum in sinistro hypochondrio situs sit: seu à *Λαῖος*, læve, cum quasi lævigatus, mollis, lenis, & perbellè politus esse videatur, & asperitate careat, deduci posse cum *Matth. Martini* in *Lexico Philologic. Etymologic. vocum* *Lien* conjecturam facit, & quidem non absurdè. *Alstedius in Encycloped. 1.4.* à lingua vocis hujus originem sumit quia juxta *Hippocratem* lingua bubulæ secundum *Aristotelem* verò suis figuram representat; vel ut alii putant, quoniam sambêdo quasi malignos humores avidè ingurgitat, omnesque detergendo absorbit. Hinc etiam *Meletius 1.3. de natur. hom.*

om. *σπλῆνα* dicit, cum *τὸ σπῆλα* for-
 es seu feces sanguinis attrahere vulgò dī-
 tur. Sic dicitur etiā Liē esse quasi liber
 liberando, quoniam dicunt, dum homo
 us est, liberat eum ab omnibus affe-
 ctibus melancholicis. Vel quasi ligen, ā
 gando, eò quòd validè vicinis partibus
 c alligatus. Germani nostri die *Miltz*
 vocant; unde hoc veniat, ex dictis nunc
 eilè patet. Galli *Ratte*, *Rattelle*: An-
 i *Milt*: Itali *la milza*, il splene appel-
 nt. Splen quoque vocatur à Græco
σπλῆν; quam vocem Romani suā et-
 m civitate donârunt. Hînc *Persius Sa-*
r. l. v. 12. canit: *Quid faciam? sed sum*
ulanti splene; cachinno. *Σπλῆν* δὲ
σπᾶν, i.e. trahere nonnulli derivant,
 um impuram sanguinis illuviem tra-
 ere credatur; vel ut alii volunt, à
σπλῆδος cinis, cum ad ejus colorem in
 ultis plerumque abeat. Alii dici pu-
 nt splenem à *σπίλος* macula, vitiligo,
 ta, cum sanguinis *σπίλα* seu fraces
 alligere censeatur. Aliàs conjicitur
 dici

dici quasi spine, ἀπὸ τῆς σπινῆς, à in-
 cula, forse, quoniam quasi maculis ffo-
 didum est. *Cornelius Celsus lib. 4. de*
med. c. 1. ἀπὸ τῆς σπλάγχνης, h. e. visce-
re, quòd intus lateat, vocem illam
ducit. Cl. Hoffmannus libell. de usu U-
nis c. 1. ἀπὸ τῆς σπῆνός τινος accersere
licet conatur. Et Bauhinus lib. 1. Thea-
trici. c. 43. ἀπὸ τῆς εἰς ἐαυτὸν ὁρμητικῆς
τῆς φαντασίας τῶν ὕψεων, quòd in
ipsum attrahat malignos (ut putatur)
humores, dici mavult; cum quo eti-
am Alb. Kyperus Anthropolog. c. 9. §. 9. fa-
Fernelius & Riolanus malè à Latino
plendo splenem deducunt. Rectius
tem ab Isidoro l. II. origin. c. 1. supplem-
tum vocatur, cum hepatis è regione
positus locum istum expleat, ne vac-
existat. Matth. Martinus loc. cit.
σπῆνός τινος ἀχάρετον εἰδεχθῆσθαι
 menciaturam petit. Creditur enim
 morum ex hepate effluentium recep-
 culum, sterquilinum quasi & fimetum
 vel à σπῆνός & λείον, quòd σπῆνός λύμα

el δὲ τῶν Ἰππῶν, ut maximè ad
anc originem alludit *Aristoteles* l. 3. de
art. animal. c. 7.

In numero plurali vox *Lienes* apud
Cornel. Celsum variis in locis reperitur ;
imprimis verò l. 4. c. 9. ubi hæc leguntur
verba: *At Lienis ubi affectus est, intume-*
scit, simulque cum eo pars sinistra, eaque
dura est, & prementirenititur, venter in-
entus est, aliquis etiam cruribus tumor
est, &c. Sic quoque *Cato* c. 157. ut bene
Martinius notat in *Lexic.* scribit: *Sic*
Lienes turgent. Invenitur etiam scriptum
πλῆνες splenes; quo vocabulo *Galenus*
non rarò utitur, & plerumque morbi &
intumescentiæ *Lienis* metonymicè eo
designantur, teste *Hoffmanno* l. c. inter-
dum etiam splenia, hoc est, emplastra eo
apud *Galenum*, censente *Cæli Rhodigini*
l. 4. *Lev. Antiq.* c. 18. significantur.

A splene hoc denominatum est sple-
nium, item spleniatus, splenio obvolu-
tus. Est autem splenium genus aliquod
fasciæ, formatum ad formam splenis, fa-
ctum ex panno laneo, aut lineo, aut se-

rico, quod fronti, interdum etiam me-
ro, partibusque aliis imponi solet, sicut
emplastri modo ad affectus sedandum
dolorem; seu ad arcendam nimiam li-
cem, quasi oculorum operimentum
seu ut frons nitida liberaque servetur
solis adustione, quo fine id usurpare co-
sueverunt scemellæ curiosiores. Exem-
pla nobis suggerit *Martialis* l. 2. quan-
do ita canit.

*Et numerosa lenunt stellantem splenia
frontem;*

*Ignoras quis sit? splenia tolle, leges.
item:*

Talia lunata splenia fronte sedent.

Cornel. Vittelius Syllog. 3. in *Georg. Med.*
cul. c. 22. splenium hoc Martiale vocat
panniculum medicamentis perfusum
qui supra inustionem literæ impositus e-
rat ad medelam & confectionem ustio-
nis. *Martialis* alio loco hoc explicat
cūm singeos se agrotare, in splen-
tium adalligatum tulit, ne causam ha-
beret basiliandi *Philennin* fellatricem. Sic
enim ait: *Cur spleniata sepe pro leam men-*

10. *Plinius l. 29. histor. nat. c. 3.* etiam, cum remedium ad oculos cruore suffusos mentionem facit, quem *Georgius* nunc intellexisse fatebitur, splenium pro medicamento ipso accipit, cum dicit: superimponi oportet splenium è melle decoctum, lanamque succidam ex oleo & vino. Deinde à splene dicitur etiam aliquis spleneticus, hoc est, lienosus, qui tumorem ac duritiem aliquam adhuc paritur. Splenis etymologiam sequitur nunc

Homonymia. Splen diversas suas habet significationes. Sumitur enim aliquando pro eo, quod spleni est simile, ut flagula, pannus & pulvillus, qui fracturis splenis figurâ imponitur. Deinde eodem ac σπλένιον, teste *H. Stephan. thesaur. Græc. ling.* voce σπλένιον, significat. Ita *Galenus l. 6. Meth. Med.* ὁδὸν εἰς φρεσὶν Ἰπποκράτους αὐτοῖς ὁ ἱπποκράτης ἐξέδρε τὴν τῶν σπληνῶν Ἰπποκράτους. *ibidem.* Σπλήνα σκεπαρηνδόν, ὡς ἱπποκράτης ἐκέλευσε, πειβάλλειν.

Goraeus definit *Medic. L. 2.* voce *σπλήν*.
 Et *H. Steph. l. c.* voce *σπλήν*. Eo modo
Hippocrates etiam in suis scriptis
σπλήνα intelligit (1.) Lienis dolor
 & obstructionem: (2.) tumores &
 omnes jam dictas intumescencias.
 denique *Capreolus* lebeti subiectus,
 tante *Caelio Rhodigino l. c.* etiam splen
 citur. Homonymiam excipit *Sinon*
mia. Hâc ratione Lien ab *Aristotele*
3. de part. animal. c. 7. vocatur *νότον ἥπαρ*
 spurium hepar, propterea, quod id
 licet in parte ignobiliori sit, faciat
 hepar, ut *Cl. Hoffmannus lib.*
de usu Lien. c. 4. opinatur. Item ab
Aristotele l. 3. de part. animal. cap.
αὐτίζοντος τῆς ἥπατος, non tantum p
 pter locum, sed & propter officium
 pellatur. Ab *Hippocrate πηγὴ ὕδατος*
 fons aquæ: item hepar *ἀείστον*: à *Platone*
in Timæo expressum hepatis simi
 litarum: ab aliis hepar vicarium, seu
 substitutum, eo quod sa pius ejus officio fu
 gi videatur: à *Li. dano*, ex loco *Aris*
totice σπλάγχνον αἵματόςδε, visco

sanguineum, ex sanguine concreto factum: ab aliis viscus linguosum, à figura, quam instar linguæ bovis obtinuit: ab aliis risûs & lætitiæ domicilium, cujus magnitudo facit homines ad risum procliviores: *splen videre facit, cogit amare jecur.* Ab aliis in contumeliam saltem hujus visceris nobilissimi, sedes & receptaculum excrementi melancholici, humoris atrabilarii clôaca: ab *Aretao & Galeno* l. 4. de usu part. c. 7. *ἐμπαγεῖον αἷματος μέλανος* purgatorium sanguinis atrii: ab antiquitate *ἐμπαγεῖον τῆς ἥπατος* jecoris extersorium nominatur; ubi per *τὸ ἐμπαγεῖον* Autores varias exprimunt cogitationes. *Budæus* simulachrum sive imaginem hepatis per illud intellectum vult. *Calaber* per expurgatorium verit. Omnium optimè, ut in Scriptis suis solet, *Thom. Reinesius* l. 3. *variar. lect.* c. 5. pag. 433. peniculum, spongiam extergentem reddidit; nam *ἐμπαγεῖον* est abstergere, detergere à sanguine, & ad se rapere crudum fœculentioremve

lap.

sanguinem, mundareque, quemadmodum
 dum scopus naturæ membra nobilia
 fecibus & superfluitatibus, uti scopus
 domum, sicuti ex Arnol'do de Villa nova
 Georg. Balthas. Metzger. Dissert. de Lien
 §. 1. scribit. Et tandem viscus hoc
 τὸ ἡπᾶν εἰς τὴν τῆς τοφῆς γάλακτος
 ἐσώρροον, οὐδὲ πορον οἷον ἡπᾶρ, ἀεὶ εἰς πο
 οἷον νότον ἡπᾶρ, ἀντίζυγον ἐν τῇ ἀπὸ
 κεβωμέναις, jecori ad alimenti gene
 ratioem pariter conveniens, ejusdem
 throni & majestate dignum, ut fin
 strum, ut adulterinum, ut adversarium
 hepar in perfectis animalibus sanguinis
 officina & hospitium regale ab Aristote
 le & aliis habetur.

CAPUT II.

*Realem Lienis descriptionem, seu la
 tē dictam definitionem detegit.*

Lienis varix ab Anatomicis & Me
 dicis circumferuntur descriptiones
 quas omnes adducere instituti nostri ra
 tio non patitur. Duas saltem nos at
 tingimus, tertiamque ut nostram ad
 ducimus.

CL

Cl. Moebius in *Fundam. Med. Physio-
logia*. c. 16. §. 2. Lienem vocat partem or-
ganicam, in sinistro hypochondrio si-
tam, sanguinem fœculentiorē ulterius
elaborantem, & ita disponentem, ut
partes recrementosæ, tartareæ, salinæ
& serosæ in locis convenientibus sepa-
rari queant. Excell. *Laurentius Straus-
sus Conar. Anat. Specim.* 6. Lienem de-
scribit, quod sit pars organica, in sini-
stro hypochondrio sita, peculiari qua-
dam conditione, insitâque vi terrestrio-
rem atque fœculentiorē sanguinem ul-
terius elaborans atque perficiens.

Has descriptiones meritò suo hono-
re dignas judicamus; cùm verò veram
Lienis naturam ac nobilem & egregium
ejus usum non planè exprimant, nos ta-
lem proferimus, in qua habemus, quod
supimus; & quæ Lieni talem nobilita-
tem ac præstantiam attribuit, qualem
nunquam habuit. Lien est viscus cor-
poris humani organicum, latum, in ex-
remitatibus rotundiusculum, in sini-
stro hypochondrio infimi ventris natu-
rali.

raliter situm, cum vicinis variis partibus ob connexum ac vasorum communione consentiens, vi caloris insitæque constitutionis chylum tenuiorem ac aquasorem in sanguinem commutans, peculiare fermentum acidum appetitum excitandum, chylique ventriculo concoctionem promovendam. In se generans, ac singularem etiam tincturam spirituum animalium ac miniculo produciens, cujus ope chylus in sanguinem coquitur, universa sanguinis massa exaltatur & illustratur, spiritus animales in cerebro, vitales in corde, & semen in testibus ac aliis variis spermaticis melius generantur, atque omnium partes sanguinis feculentiores tartaro & salibus sylvestribus imbutæ sed sero copiosiore mixtæ ita disponuntur, ut postea in locis convenientibus, non unâ vice, crebriore tamen transitu beneficio circulationis, separari queant.

In descriptione hâc Lienem viscerum seu partem viscerosam diximus, ut scilicet à partibus glandulosis, carnosissimis, musculosis, ossibus, aliisque, quæ viscerum

naturam & essentiam non habent, distinguatur. Organica quoque est constitutionis hoc viscus, non similis naturæ, cum ex variis similibus primi ac secundæ ordinis partibus compositum constet. Reliqua contenta situm, connexionem ac consensum, usum & actionem illustrent, quæ in sequentibus capitulis & sectione secunda fusius à nobis dilucidabuntur.

CAPUT III.

Lienis Situm ostendit.

Absolute Lienis definitione nominis & reali, atcedimus ad ejus situm; qui est sub diaphragmate in sinistro hypochondrio in fini ventris, inter costas & ventriculum in regione hepatis dorsali parti vicinior, costisque spuris, quæ ipsi sunt tutelæ loco, innitens. In ventriculi latus sinistrum paulò posterius versus renem sinistrum incumbit. In sinistro hypochondrio, dextro adverso, unde Aristoteli l. 3. d. part. animal. c. 4. ἀντίζυγος τὸ ἥπαρ, Hippocrati ἀεργὸν ἥπαρ per pleonasmum: Platoni in

Τίμας τῶ ἡπατος ἐκπαραίτων salutaris
 positus reperitur, depressius tamē paul
 mon strante *Galeno 6. d. usu part. 6.* quod
 tamen, si is naturaliter se habet, omni
 ceu jecur hoc facit, non explet. Hic
 eum in sola parte sinistra hypochondri
 situm habere, adeo ut nullam sui partem
 extendat in latus dextrum, secus ac jecur
 facit, scribit *Cl. Blasius Comm. in Syn
 tag. Anat. Veslingii c. 4.* Et depressu
 quidem in hypochondrio sinistro infim
 ventris è regione hepatis situs est, nec
 tamen usque adeo, quin adhuc sub co
 stis spuris contineatur; quod propte
 rea notandum monet *Adrianns Spigel
 ius de Fabric. corp. human. l. 8. c. 14.* m
 erremus cum Medicis quibusdam, qui
 etiam in sanis Lienem tactu deprhe
 di, sibi aliisque temerè persuadent. Part
 te anteriori, ut refert *Vesalius Fabric
 corp. hum. l. 5. c. 9.* aut cavā ad ventricul
 superiora magisque posteriora: poster
 riori verò seu gibbā ad costarum super
 riorum cavitatem & spinam dorsi locat
 us est, cui ob id vicinior est, & quan

oquidem tam vertebris, tum costis
 sis inicitur. *Hoffmannus* à costis duabus
 ltrib' impressionis vestigia pati scribit.
 Non igitur Lien, uti vulgò creditur,
 no alioquin homini ad abdominis
 nasi medium anterioraque prominet,
 eque etiam tactu admodum deprehen-
 potest: occultatur enim sub costis
 puris, ceu tutissimis vallis ad amussim
 ptus, quarum ultimam sæpè haud at-
 ngit, ac nisi istis sublatis, non præbet
 spectandum; adeò ut nonnisi intume-
 ens, inflatus, aut alia de causa loco di-
 notus ad inania & vacua laterum de-
 cendat, cuius mentionem facit *Aretaeus*
b. de caus. & diutur. resect. c. 14. & 16. At
 erò dum præter naturæ leges intumuit,
 nihil tunc obstat, quo minus palpo ma-
 uum sentiri queat. Hoc non n scivit
Plautinus ille leno *πικρὸν πνεύμαλος*, con-
 uerens in *Curcul. act. 2.* se quasi zonâ
 tactam Liene ambulare; quem locum
 rudité explicat *Antonida van der Linde*
select. Medic. pag. 252.

Collocatum verò nonnullis videtur

viscus hoc in infimo ventre, ut (1.) in eodem cum cæteris partibus nutritioni catis resideat, ventriculusque (ut Meizgeri *Dissert. supra dict.* §. 4. ventriculi faciam mea) ceu lebes circumjectis partibus, inter hæc duo viscera, hepar & Lienem incalescat felicius, alterum à sinistris, alterum à dextris, & hoc quidem cum toti ventriculo tegendo non sit circa eius fundum, ubi major sedet digestorum moles, calorque vegetior inquiritur, adstare debuere. (2.) in hypochondrio sinistro collocatum videtur ut tanquam hepar sinistrum superius cedat.

Hoc tamen non ita intelligendum venit, quasi planè jecori è diametro Lien sit oppositus. In nonnullis enim, testatur Excell. *Thomâ Bartholino Anat. reformat. l. I. c. 16.* altiori, in aliis humiliori sede gaudet. Plerumque verò, ut jam diximus, hepate depressior est, quo proximissimum fonti suo, ut Cl. *Joh. Theod. Schenckius in Schol. part. sect. 3. p. 2. c. 1.* pag. 103, meminit, propior esset, artius

æ nimirum splenicæ, tùm ventriculi,
quando veluti carbo igneus esset vicinior.
Ita Collegium Amstelodam. privatum
anatomicum in lupo lúcio Lienem ad
finem ventriculi & initium duodeni ad
duodenum pylorum hærentem in inferiori abdo-
minis parte, ita ut non è directo hepa-
tis, sed potius in inferiori loco, hepar
verò in superiori hæreret, observavit,
ut testatur in *Observ. Anat. select.* pag. 42.
In omnibus tamen posticæ seu dorsali
parti vicinior est, uti monstrat Celeberr.
Jh. Bartholinus l. c. quando quidem ver-
tebris & costis spuriis, quæ ipsi tutelæ
loco sunt, gibbâ parte innititur, ut tactu
deprehendi nequeat, nisi tumidus ad ab-
domen appropinquet.

Falsum autem censemus, quod *Andr.
Laurentius lib. 1. Histor. Anat. c. 18.* sta-
tuit, ideo ex adverso hepatis naturam
construxisse Lienē, ut expurgato fecu-
entis sordibus hepate, & crassâ ac lutu-
lentâ succorum illuvie haustâ, purior il-
lustriorque reddatur sanguis. Quomo-
do verò hoc fieri potest, cum nulla de-

eur via, per quam ex hepate sordidii
 & feculenti humores ad Lienem duca-
 tur. Nec Lien etiam ullam in se cavi-
 tem habet, in qua crassa ac lutulenta in-
 succorū illuvies possit à sanguine sepp-
 rari, ut ille purior illustriorq; inde rec-
 datur. Nobiliori certè & præstantico
 officio incumbit Lien, quàm ut circum
 excrementorum & succorum lutules-
 torum expurganda sit occupatus. Immo
 quid dicam? In opprobrium etiam Li-
 eni affingitur, quòd sit alterum jecu-
 cum dissimile sit prorsus utriusque offi-
 cium, diversa substantia, diversa consti-
 tutio naturalis & contra naturam, quæ
 differentiam utriusque visceris satis de-
 clarat. Si de ejus officio saltem quæri-
 mus? Certè studex egregiis ac illustri-
 bus actionibus ita comparatum est, ut
 hepatis officium nobilitate, præstantia
 utilitate ac necessitate multum superet.
 Itaque si de dignitate utriusque visceris
 lis esset, Lien facilè palmam, quàm ei-
 dem jam ultro etiam decrevit, Petr. Io-
 han. Faber lib. 2. univers. sapient, c. 7. he-
 patil

ci planè præriperet, vel saltem dubiana,
Iulio Cl. Meezgeri *Dissert. cit. §. 4.* ad-
e faceret.

Hic situs autem naturalis vitiatur non-
quam. Sic interdum & versus an-
iora, & versus umbilicum Lienem
opulsum observarunt Anatomici, ut
tonida van der Linde in Med. Physio-
ic. & Adr. Spigelius Fabric. corp. hum.
c. 9. Consimilem Lienis situm in
uæstoris uxore triginta annorum de-
hendit Cl. *Iohan. Theod. Schenckius*
erc. Anat. lib. 1. sect. 2. c. 24. à quartana
juventute malè curata obortum, qui
vi ante mortem, præsentè gravissimâ
rrhæâ, evanuit. In muliere Parisi-
i ad hypogastria prolapsum, & supra
rum per biennium commoratum
ndem annotat *Riolanus in Anthropol-*
phic. qui specie ingravidationis Me-
is imposuit. In nobili Viro eodem
do prolapsum ad hypogastria notavit
Brolius.

Situm autem si immutat Lien, dupli-
er ipse, docente *Spigelio l. c.* observa-
tur,

cur, vel non naturalis, vel præter naturam
 lis. Non naturalis ille situs potissimum
 à causis naturæ nullam vim inferentem
 evenit, idque fit, quando scilicet sedemur
 aut decumbimus, quod tamen patet
 notatur. Præter naturalis autem ille
 situs est, qui præcipue, Eodem adfirmatur
 ab humorum affluxu, laxatis vel ruptis
 ligamentis, aut ab ingenti aliquo turba-
 re contingit.

Lienis etiam hic situs non raro
 mutatur, ut in dextro sit latere, & he-
 par in sinistro, uti multæ historiæ testantur.
 Ita Aristoteles l. 4. d. generat. animal. c. 1.
 Lienem ita locatum in dextro scilicet
 latere, hepar verò in sinistro in anim-
 bus observavit. Quod quidem co-
 iplo *πεγρωδης*, prodigiosum dicitur
 Plinius *Histor. Nat. l. 11. c. 37*. Quomodo
 addit Lindannus in *Physiolog.* non in
 mine? Videtur hoc posse ex Plauto pro-
 bari, qui in *Curcul. act. 2.* Cappadoc-
 lenonænosum inducit. Similiter Sp-
 gelius l. c. in cuniculo hepar in sinistro
 & Lienem in dextro latere reperit.

Quæ

quod in locum hepatis successerit ex
mma l. i. c. 5. Cosmocrit. probat
penckius in observat.

In cadavere sicarii cujusdam dicti R
ardi Franconer, uti scribunt Mentellus
Epistol libro Ioh. Pecqueti adjuncta, & I
c. Cattierius observ. Med. 17. Petra
ello communicat. Dn. Antonius Ber
nd. Chirurgus & Anatomicus Paris
ensis peritissimus, fundo ventriculi in
positam partem reclinato, Lienem in
pochondrio dextro collocatum adin
nit, ejus pars gibba costas nothas, si
verò ventriculum, prout solet, re
exit, cui per vas breve, quod drisidum
at, membranasque ordinarias, alliga
s est. Ex quo Lienis positu orta est
nam venæ splenicæ, proindeque totius
næ portæ, situ & distributione im
itatio & inversio; vena enim portæ,
æ naturalem situm in parte dextra ob
net, in sinistra parte fuit constituta,
splenica, quæ è sinistris esse debebat,
it è dextris partibus.

Sic etiam Penarolus, Anatomicus

Romanorum olim insignis *Pertecost.*
obsrv. 7. in quodam vulnerato & ip
 mortem dissecto vidit hepar in sinist
 parte, & Lienem in dextra: nec nomi
 nam observavit cordis ventriculos &
 nam azygos omnia mutata. Et Arn
 1650. in sicario Parisensi dissecto, re
 rentibus *Th. Bartholino*, *Centur.* 2. *h*
stor. Anat. 29. & *Leonb. Blasio Comm.*
Syntag. Veslingii c. 4. Lienem in dext
 hypochondrio, jecur contra in sin
 stro locum, ut & singula vasa ipsoru
 viscerum substantiam concomitant
 habuisse, vidit *Guido Patinus* Medic
 Parisiensis celeberrimus. Similem
 tum viscerum horum observatum *Rot*
 1643. *Cl. Henr. à Moinehen* apud *Th*
Bartholinum *centur.* 2. *epist.* 87. *pag.* 68
 Lienem inter hepar & ventriculum
 titantem observavit, nullis fibrulis ed
 phragmati aut ventriculo adhaerente
 Intorta ac simplici gyro circûvoluta
 sa splenica vidit, unde à tumente vent
 culo ed detrusum collegit. *Pissilani*
 quidam, referente *Ioh. Talentonio lib.*

cond. rer. c. 20. omnibus palam ariem monstravit, in quo permutatio hæc paruit.

Fesalius Fabric. p. hum. l. 5. c. 9. permutum hunc situm cum actione congere Lienis cum hepate excusare videretur, quoniam Anatomicorum non pauci Lienem hepatis officio perfungi, & ipsum quasi hepar esse crediderunt; quod nos tanquam falsum jam rejectimus.

Neque quidquam impedit, quod ad *Hippocratem 2. Epidem. 2. de Lycia. Epidem. 10. de quibusdam in constitutione Borcali, 4. Epidem. 87. de febrina in Bulgoræ villa, & 6. Epid. 6. de homine defatigato laboribus & itinere, alibi fortè dextrum & sinistrum Lienibus tribuatur. Pertinet enim id ad extras & sinistras Lienis partes, quam modò has, modò illas fuisse inflammatas, Hippocrates scribit.*

ANATOMIA

CAPUT IV.

*Lienis connexionem & consensum
cum vicinis partibus exponit.*

Conne&itur Lien diversis partibus, quibus, ne facillè decidat, firmissime adglutinatur. Alligatur praeferim membranis tenuibus à Peritonaeo, omento & reni sinistro, aliquando & septo transversali quod quidem negat *Fernelius*, qui idcirco à *Bartholino* l.c. taxatur, & excusari non potest, nisi quis eum centrum diaphragmatis intellexisse dicat; huic enim non annectitur. In cava parte superiori omenti membranae annectitur, utpote qua tunicam tenuem & simplicem accipit; aliis vicinis verò partibus, ut ventriculo intestinis ac pancreati interve&ntu vasorum.

Cl. *Antonida van der Linde* lib. *physiolog.* c. 5. art. 2. §. 31. et *Hoffmann* lib. de usu Lien. c. 1. pag. 9. connexionem fieri significat vel mediatè vel immediatè, mediatè interpositu omenti

ntericulo, immediatè in omento & in
 aaphragmate; quod tamen rariusculè
 cidere, intercedentibus quibusdam
 licet *Δε Φύορα*, pediculis, ex men-
Hippocratis lib. de octim. part. opina-
 r. Et si accidat, superficialiter id
 antaxat fiat, ut *Hoffmannus l. c.* scri-
 t, ne ejus motus impediatur.

Elatori aliàs parte, gibbâ seu apice
 homine per peritonæum diaphrag-
 ati, ne decadat, connectitur. In cani-
 is id nunquam vidit *Bauhinus Theat.*
nat. l. 1. c. 43. Fit illa connexio notan-
Veselio, Fabric. Corp. hum. l. 5. c. 9. in-
 rventu peritonæi quâ septum succin-
 t, idque fibris interdum numero im-
 uri. Unde accidit, quòd scirrhus Lienis
 borantes plerumque de spirandi dif-
 cultate conquerantur. idè, quoniam
 aaphragma Lienis mole & pondere
 remitur, & deorsum tendit. *Vesalio*
 alculum subjicit *Adr. Spigelius Fabric.*
corp. hum. l. 8. c. 14. ita differens: Conne-
 itur (Lien) elatiore quidè parte. dia-
 pragmati; inferiore, renis sinistri mem-
 bra-

branae externa, utrinque exiguis gracilibusque membranis. Sima parte primò superiori membrane omenti, deinde ope vasorum ventriculo: Convexâ verò dorso. Hinc est, ut scirrhus laborantes de respirationis difficultate conquerantur, quod diaphragma mole Lienis deorsum trahatur. Quin &, si vincula hac rumpantur, observatum à nonnullis est, hec niam natam fuisse. Et Cl. Nathan Higmore Disquisit. corp. hum. l. I. part. 3. ita loquitur: Diaphragmati (Lien) superiore parte, inferiori verò reni sinistro, utrinque gracilibus, exiguisque membranis: Simâ parte primò superiori membrane omenti, & ope vasorum ventriculo, convexâ verò dorso, connectitur. Hinc scirrhus aut tamore aliquo laborante, quia diaphragmati alligatus dyspnœa oritur à pondere illud deorsum detrahente. Exemplâ etiam talia curiosa obvia sunt & apud Pisonem Observ. l. I. cap. 43. Fabric. Hildanum. cent. I. observ. Chirurgic. 44. Thom. Bartholinum cent. I. Hister. Anat. 80. leguntur.

In plerisque, ait *Hoffmannus lib. de usu Lien. c. 1.* diaphragmati non alligatur, & in quibusdam, in quibus fit, superficialiter duntaxat, unde sicut hepar neque commissimè illi alligatur, quo moveri possit. *Petr. Laurembergius Colleg. Anat. Exerc. 7.* quòd septo adhærescat, id præter consuetam naturæ legem censet, quod verò rationi & autopsiæ Anatomica contrarium videtur.

Consimilibus membranosis filamentis alligatur Lien etiam costis spuris, quæ satis robustæ apparent. Convexâ parte dorso, simâ verò superiori omenti membranæ nectitur; deinde ope vasorum, inter quæ vas breve est celebratissimum, antè ventriculo, quamquam etque arteriæ sunt excludendæ, quæ revivâ, ut scribit *Riolanus Enchirid. nat. l. 2. c. 26.* vapores vel humores itiosos è Liene ad cor, intestina & renes transmittunt.

Si quæritur, quâ parte omenti Lien ventriculo adnectatur? Respondemus cum *Bauhino ex Theatro suo Anatomico,*

1. c. 43. superiore, quæ Lienis limbo
adnascitur. Aliàs ventriculus, Lien
hepar interventu membranarum & poi-
guedinis, testibus *Vesaliol. c. & Simonio*
Pauli apud *Th. Bartholinum* centur.
Histor. Anat. 6. coherent. *Helmonstus*
stomachum gallinæ à Liene amplexu
prodit, *Tractat. jns duumvirat.* Eidem
etiam sic incumbere, *Tractat. calor cog-
noscitur non digerit, sed excitativè* scribit
ut gallinæ Lienem circum stomachum
unitissimè congestum habeant, ideo
& potentius digerant. Et gallinas Li-
enem circa stomachum unitissimè
conjunctum habere vidit *Cl. Schenk-
ius Exercitat. Anatom. 6. l. 1. §. 1.*
2. c. 24. Excell. Mosbini in Fundam. Anat.
Med. Physiologic. c. 16. in capreolis Li-
enem observavit ventriculo per mem-
branam adnatum.

Reni quoque sinistro subjacenti ge-
ba Lienis pars, ne corruat, adhæret
brillis quibusdam, exteriori illius in-
lucro adiposo insertis, quod nobiscum
etiam ex autopsia comprobatur *Vesaliol.*

abric. corp. hum. l. 5. c. 9. ita scribens:
quando etiam Lienis gibbum exteriori
nis sinistri in volucro, quod multâ abun-
at adipe, fibrarum quarundam medio fir-
atur, potissimum si ren Lieni [ut non in-
equenter fit) magna ex parte succum-
at. Interdum tantum hoc fieri scri-
it Vidus Vidius Anat. l. 5. Tàm firmi-
er ei adnatum vidit Ioh. Dan. Horstius
serv. Anat. 10, ut sine sectione digi-
s avelli non potuerit.

Qui pancreas extremorum suorum
tero Lieni copulari contendunt, non
tam vasa quàm omentum respiciunt,
quòd enim Anatomicorum nonnulli
actum pancreaticum congrédi cum
liene malint, ut indè melancholicum
crementum ad intestina feratur, hoc
topsiæ Anatomicæ repugnat. Nos
pius experimentum in canibus &
vibus fecimus, nunquam autem du-
um patulum ex Liene in pancreas ab-
ntem deprehendimus. Figmentum
item à sanioribus habetur, quod ma-
s illorum de vindicanda veterum sen-

tentia circa Lienis actionem curæ, quæ
oculari solertia adscribitur. Præter
ruraliter tamen substantiam hujus
Lienis arctè conjunctam observasse, in-
per Cl. *Iohannem Arnoldum Fridericum*
Professorem in Alina Salana Celeberr-
mum in dissecto cadavere fœminico
gimus, ubi propè insertionem vasis
vis, Lien cum pancreatis portione vail-
dissimè conjunctus fuit.

Hepar non rarè adnecti Lienem, vi-
ria Historiæ nobis hoc suggerunt. Su-
ficient nobis saltem sequentes. *Ioan-*
Tanckius, Professor olim Lipsiensis
migeratissimus in cadavere cujusdam
suspensi tale quid vidit, ut ipse scri-
bit ad *Gregor. Horstium* in *Epist.* qua-
dam, quam insertam reperimus ejusd.
per. Tom. I. pag. 131. Cl. *Cæcilus Foli-*
apud *Thom. Bartholinum cent. I. Epi-*
Medic. 62. Hepar Lieni copulari ac in-
uniri vidit, ut unicum viscus appareret
propter coloris etiam uniformitatem
Antonius Bertrand. Chirurgus & Ana-
tomicus Parisiensis peritissimus apud

macum Cattierium observat. Medic. 17.
etro Borello communicat. hepar usque
Lienem protensum se in corporibus
flectis multoties observasse scribit;
que etiam observasse, aliquando hæc
uo viscera sibi invicem adhaerentia, &
gamento membranoso inter se conne-
a, tantamque hepatis magnitudinem
t hypochondrium utrumque occupa-
et. Et Ecell. *Henr. Eissonius in Exerc.*
Medic. de observat. rar. in cadavere ali-
no § 13. Lienem in cadavere aliquo un-
iquaque hepati & imprimis diaphrag-
mati adeò firmiter adnexum invenit, ut
bsque latione eximi non potuerit.

Lienem utero adnatum in Comitissa
e Boizeon observavit *Riolanus l. 2. an-*
propolog. c. 23. quod in statu ejus natura
haud accidit. Quemadmodum verò
lien variis corporis partibus vicinis
onnectitur, ita quoque non cum iis so-
um, sed cum remotissimis etiam con-
nsu habet insignem. Per vasa enim
ia communicat cum variis partibus, &
uide in primò per arterias cum corde, à
quo

quo reliquarum universi corporis partium more sanguinem accipit, non perfectum, sed in eo adhuc ulterius perfectum. Quod enim sanguinem à corde perfectum, (nempe solâ corruptione elaboratum) Lien accipit suspicio magis quàm opinio videtur. Deinde per nervos cum cerebro commercium insignè habet, à quo spiritus animales copiosos obtinet. hos quoque nervos à cerebro ad Lienem pertingere nequaquam quidam ignorârunt veteres; At longè major copiam illi attribuunt Anatomici recentiores, inter quos imprimis *Cl. G. sonius Anat. Hepatis c. 45.* qui exinde sum Lienis planè peculiarem confinxit diversissimum omninò ab usu, quem Lieni attribuimus: De quo usu *Glissonus*, nec non quid conferant copiosi animales spiritus ad Lienem confluentes, cum utique nec sensui nec motui serviant, in sequentibus sumus dicturi.

Per venas tertio consortium colit mundissimum Lien cum hepate. Et h

LIENIS.

lli etiam Medicorum vel Anatomico-
rum olim incognitum fuit. Ad hepar
im per ramum suum splenicum, hinc
nam portæ sanguinem deponit ac
ttit copiosum, Id namque per san-
guinis circulationem *Harvaanam* ad-
iffam constat; ac evidenter id ipsum à
1. *VValao* in *Epistol. 1. de motu sang.* ex-
ostum deprehendimus.

Per vasa lymphatica etiam quartò Li-
cum variis partibus, præcipuè autem
am conspicuis circa vasa sanguinea, hoc
iscus ingredientia truncis lymphaticis,
a quos suam exonerant lympham, com-
mercio singulari gaudet. Quare etiam
sic planè communem aliquem lymph-
cis vasis & lacteis truncū excludimus;
um enim vasa nonnulla lymphatica in
enas inseri deprehendantur (veluti a-
illares &c.) nec lactea truncum unum
liquem sibi communem obtineant;
ertè nonnulla eorum, ex variis qui-
busdam propaginibus coagmentata,
passim in glandulis mesenterii, ac im-
pris in ipso pancreate *Asellæ* obliteran-
tus,

tur, nequaquam in truncum unum
 communem concurrunt: de qua re
 deantur *Glissonius Anat. Hepat. c. 45.*
Thom. VVhartonus Adenograph. c. 8. 18
 glandulis verò ipsis, ubi priores evanui-
 runt, consimiles novi ductus lactei ce-
 oriuntur, qui secundi generis nonnu-
 lis dicuntur; hi denuò hinc indè con-
 currentes variis truncis in chyli rece-
 ptaculum desinunt. Hoc verò nequa-
 quam pro truncis quodam sive communi
 lymphaticorum vasorum sive lacteorum
 rectè potest haberi, cum sæpè glandu-
 losum sit; nec in omnibus, non dicam
 speciebus animalium, sed individuis
 eiusdemque spe ciei uno modo
 habeat, certè communis lymphaticorum
 vasorum ac lacteorum truncus ha-
 beri minimè potest: multoque minùs
 thoracicus ductus pro communi lacteo-
 rum ac lymphaticorum truncis cen-
 ri potest: utpote ad quem nec vasa lac-
 tea nec lymphatica *Bartholini* perti-
 gunt. Et demùm, cum venæ etiam
 in Lienem inferantur, communis

at etiam ipse cum variis partibus ven-
is inferioris, quæ ejusmodi vasorum
æteorum familiaritate gaudent.

Superfunt adhuc nonnulla de situ Li-
nis inquirenda, & quidem (1.) An Lien
in infimo ventre corporis humani nobi-
or ac præstantior hepate sit, & anne
ocus supremus ei debeatur? (2.) Cur
epar potius in dextro & Lien in sini-
tro hypochondrio locum habeat? (3.)
Cur in homine, & ad ejus normam in a-
nis quoque animantibus Lien semper in
sinistro hypochondrio situs sit? Et (4.)
utrum situs Lienis in sinistro latere plus
oboris, motuique expediendo prom-
ptitudinis huic lateri, quàm hepar dex-
tro conferat? De his omnibus paucis a-
gam & suo ordine.

CAPUT V.

*Queritur primò: an Lien in infimo
ventre corporis humani nobilior ac
præstantior hepate sit, & anne locus
supremus ei debeatur?*

Questionem hanc nonnulli super-
vacaneam censebunt; quod sicuti
im

in civili locorum assignatione prima sedes digniori conceditur, ita & hîc prae-rer nobilissimum, præstantissimum & supremum in abdomine locum Lienis (utpote viscerum nobilissimo & præstantissimo deberi arbitrentur.

Regula verò ista in naturalibus non perpetua semper apparet. Aliàs enim vesica fellea urinariae maximæque intestinorum parti præferenda esset; & omentum mesenterio anteponendum; renesque succenturiati ipsis renibus digniores æstimandi. Admittenda itaque solum hæc regula est, quando & alia simul commoda sese offerunt, quemadmodum in istoc Lienis situ evenit. Quippe non modò Lienis dignitas hanc prærogativam efflagitat, sed & alia causas graviores hîc inquirendæ, eandem necessariò requirunt.

Videamus nunc, in quonam posita videtur natura partis alicujus nobilis & præstantis, & an hepar, si alia commoda & causæ graviores ponderentur, hâc in infimo ventre prærogativâ dignum vi-

tatur. Nobilitas & præstantia nihil
 aliud est, quàm dignitas & præ cæteris
 eminentia. Eò verò unumquodque ju-
 dicatur nobilius, præstantius & excel-
 lentius, quò illustrioribus virtutibus
 præditum, & præclarioribus dotibus or-
 natum existit, id est, quò est opifex fun-
 ctionum nobiliorum, præstantiorum
 & excellentiorum, quarum fructus & ef-
 fectus in plures redundat. Hinc
 præstantia actionis arguitur particu-
 lariter nobilitas, præstantia & excellentia: quia
 partes sunt in gratiam actionum factæ.
 Pars ergò nobilis & præstans est, quæ
 nobilissimam & præstantissimam actio-
 nem edit.

Partes principes cunctis ferè Anato-
 micis, etiam ipsi Excell. Thoma Barthe-
 linus in *Proem. Anat. Reformat.* sunt he-
 par, cor & cerebrum. Cum cerebro &
 corde hæc nobis nihil est negotii, contra
 hepar saltem pugnamus, illudque culpa-
 mus, quod locus in infimo ventre supre-
 mus ei assignetur, hocque constitutur
 pars nobilissima ac præstantissima, Lien

contra infimum locum occupare cogatur, omnique contumeliâ blasphemiam & opprobrio ab Anatomiarum osoribus quibusdam afficiatur, dum dicere non erubescunt, quod humoris feculentum & excrementitium sit sedes & receptaculum quod atrabilarium humoris sit cloaca. Verum falsum eorum dogma, quo hepatis in cælum usque evehant, non est tantum roboris, ut non duce veritate & rationibus valeat prosterni. Hic loci binæ hæ pro clypeo nobis sufficiant. (1.) Quæ pars ignobilissimæ actionis effectoria est, ea non diei meretur nobilissima & præstantissima; hepatis actio est ignobilissima, sanguinem scilicet à bilibus defecatum reddere: seu percolare, cribrare, & sic partium biliosarum separationem à sanguine promoveri. (2.) Si hepar hanc ratione pars in infimo ventre est nobilissima ac præstantissima, Liver majorem sanè obtinebit dignitatem, eminentiam ac prærogativam, cum ejus actiones sint nobiliores, præstantiores & excellentiores, universæque æcon-

iz corporis humani majus commo-
am adferunt. Ex comparatione itaq;
tionum utriusq; visceris patebit, cui-
am parti hæc prærogativa debeatur.
Epatis usus illis est, uti diximus : san-
guinem à biliosis excrementis defeca-
um reddere ; Contra Lienis usus se-
andum nos est : Chylum tenuiorem ac
quosiorum vi caloris insitæque consti-
tationis in sanguinem commutare , pe-
culiare fermentum acidum ad coctio-
em chyli in ventriculo promovendam
se generare, ac singularem etiam tin-
turam spirituum animalium admini-
culo producere , cujus operâ chylus in
anguinem coquitur, universa sanguinis
massa exaltatur & illustratur, spiritus a-
nimales in cerebro vitales in corde, &
semen in testibus ac aliis vasis spermati-
tis melius generantur , atque demum
partes sanguinis feculentiores, tartaro
& salibus sylvestribus imbutæ, sed sero
copiosiore mixtæ ita disponuntur, ut
postea in locis convenientibus, si non u-
nâ vice, crebriore tamen transitu, bene-
ficio

ficio circulationis , separari quæ-
 Quis non igitur hîc majorem Lienis po-
 hepate dignitatem & prærogativam
 det ? Etiam cæcus de hoc judicare po-
 terit.

Nec Lienis dignitati & honori aliqu-
 derogat, quòd in sinistro hypochondrio
 sit positus , cùm etiam natura , ut pro-
 da rerum omnium mater , sinistrum co-
 dis ventriculum , arteriam magnam in
 aortam in sinistro corporis nostri late-
 collocaverit ; nec tamen indè præ hep-
 te & vena cava partes infimæ & quæ
 abjectissimæ censeantur. Majorem cer-
 dignitatem ac præstantiam possidet co-
 iam Lien, cùm tantâ arteriarum sobco-
 gaudeat, ad hepar contrà una solùm ex
 que per exigua à ramo cæliaco perti-
 gat. Illud sanè ob ulus nobiliores
 præstantiores contingit. Hînc etiam
 Cl. Grembsio *Arbor. integr. & ruinos. lib.*
c. 8. de usu part. Lien vocatur officin-
 arteriosi sanguinis, constans 400. arte-
 riiis, nec ullum viscus tantâ arteriarum
 propagine refertum, quàm splenem di-
 cit.

Cl. Francisc. Glissonii Anat. Hepar. c. 3.
gumenta, quibus hepatis in infimo
ntre supremum locum tueri conatur,
nt sequentis: (1.) Quia gibba hepatis
ars concavæ diaphragmatis superficiei
ntissimè respondet. Si verò alia visce-
ibidem locata fuissent, necessariò
iatus aliquis intercessisset, quem natu-
u agrè patitur. (2.) Hepar alibi posi-
um, minùs commodè ventriculū atq;
testina amplexu suo fovisset: neque
ciam aliis partibus æque cum hepatis
avo convenisset, atque istis, quæ nunc
li subjacent, quæ molles & ad ceden-
um aptæ cū sint, eidem instar pulvi-
aris, (in erecto præsertim homine)
ubsternuntur. (3.) Quòd tenera & fria-
bilis hepatis substantia collisus com-
pressusque duriorēs, non sine damno
maximo patiatur: Ideoque ut ea effuge-
ret incommoda, æquū erat, loco eu-
issimo poni; nempe proximè sub dia-
phragmate, ubi costarum notharū
muro defenderetur; & à prædictis ma-
is libera esset. Estque hæc ratio cæteris
præ-

preferenda. Verùm argumenta Ili
Gliſſonii parùm ad hepatis dignitate
 atque eminentiam in infimo ventre
 biliendam faciunt; nec tantùm robore
 habent, ut noſtra de lienis nobilitate
 præſtantia prolata tollere queant.

CAPUT VI.

*Quæritur ſecundò: Cur hepar potius
 in dextro & Lien in ſiniſtro hypocho
 drio locum habeat?*

UT ſecunda hæc quæſtio eò clari
 intelligatur, concedendum
 mùm exiſtimamus, non potuiſſe an
 riam magnam, quam etiam aortam ve
 camus, ſimul & venam cavam, commu
 dè in eodem corporis latere locari;
 enim de pulchritudine & ſymmetria
 (quæ in utriusque lateris proportion
 ſimilitudine magnè parè conſiſtit) plu
 mùm decederet; nec poſſet, ut par e
 calor è corde, profluens utrique corpe
 ris lateri pariter communicari. Plu
 ma quoque incommoda talem vaſorum
 ſuſum deorſumque diſtributionem m

ariò comitarentur; ut cuilibet percum esse potest.

His itaque, aliisque similibus malis, natura utrumque vas, alterum dextro, alterum sinistro lateri attribuit, sed, ut ambo latera sibi invicem æquivalent, mutuaque inter ea (quantum partium harum diversa natura concedit) similitudo accidat. Aorta quoque vicinitate & calore suo cavam movet: & utramque commodissimè spiritibus dorsi utatur; quæ cum sit uti ceteram motus animalis, ipsa minimùm movetur, optimèque cavet, ne vasa ista nimium extendantur, aut subito contrahantur, aut breviora fiant; quas motuum vicissitudines vasa illa ægrè tulissent, nec uspiam alibi ab earum injuria æque salva fuissent. Quippe ea minimum moventur, quæ motus centro vicina sunt. Concludimus itaque, venam cavam & arteriam magnam non potuisse commode in uno eodemque corporis latere constitui, nec uspiam rectius collocari, quàm ubi nunc sitæ sunt.

Uc

Ut res hæc loculentius ab omnibus percipiatur, adfirmamus porro, debuisse arteriam magnam in sinistro vertebri- rum latere, venam cavam autem in dextro ferri. Quamvis enim cor præcisè in medio thoracis situm videatur, (quod aliquomodo verum est,) ventriculus tamen ejus sinister manifestè sinisterorsum vergit, dexterque in latus oppositum ex- porrigitur. Oportebat itaque necessariam arteriâ è sinistro ejus sinu oriundâ ideè latus servare, venamq; cavâ, dextro cor- dis ventriculo continuam, dextrorsum descendere. Naturæ enim (quæ omnia sapienter instituit) haud congruum erat vasa hæc decussatim è latere in latus frons- trâ transferre, eorundemque distribu- tionem hoc modo difficiliorem ma- gisque incommodam efficere.

Præsuppositis iis, quæ jam attulimus debuisse nempe arteriam magnam in si- nistro latere locari, & venam cavam in dextro; adserimus tertio, factum esse necessariò, ut hepatis in dextro latere, & Lien in sinistro situm suum obtineant. Quippe primùm hepatis præ cæteris co-

libus partibus minima cum arteriis
cedit familiaritas ; quarum una
tùm eaque per exigua à ramo cœliaco
ipsum pertingit. Lien contrà mag-
n cum arteriis commercium habet,
arum numerum non exiguum ab aor-
n sinistro latere suscipit. Incongruum
em foret tam grande viscus arteriæ
gnæ vicinum constituere , cum qua
nen exigua admodum habiturum
et affinitatem : Lienemque longius a-
vere, qui ramos ampliores à dicta ar-
ia magna mutuatur, majoreque cum
lé necessitudine gaudet. Deinde me-
ndum, ne arteria magna violenta sua
satione noxam aliquam teneræ fria-
que hepatis constitutioni inferret, si
bo in eodem latere ponerentur ; he-
enim præ magnitudine sui necessario
eræ eâ ratione jungeretur, quâ nunc
æ cavæ adhæret ; quippe hypochon-
um sinistrum, nullo relicto spatio in-
prorsus impleret. Porro pluri-
m est Lien cum aorta commercii ;
c minimum hepatis cum vena cava in-
ter.

tercedit conforti, ramique hujus pri-
 grandes in illud disseminantur. Si sa-
 tem in diverso latere sita essent, ramu-
 li planè incommode, imò verò inepti
 quoniam propius iter est, per anfractu-
 sam illam semitam ad hepar perting-
 rent. Denique haud parvum est Lite-
 rum sanguine arterioso commercium
 nec minor hepaticum sanguine veno-
 accidit familiaritas; & verisimile est,
 se se mutuò fovere ac refocillare.
 Quemadmodum igitur arteria magis
 in dextrum latus exporrigebatur,
 Lien idem latus possidebat, ita etiam
 vena cava per dextrum latus erat de-
 randa, ac debebat certè quoque hep-
 idem latus occupare.

Objiciet forsitan hic quispiam, situm
 hepatis haud deducendum esse à ven-
 cava, sed debere potius hujus situm illi
 posituram sequi: siquidem ex senten-
 communi vena cava ex hepate oriun-
 est, ideoque determinatus hujus loci
 requiritur, antequam illa efformata fu-
 rit. Respondemus, venæ cavæ nece-
 riam insignemque cum dextro cor-
 y

atriculo affinitatem intercedere; par-
 scilicet hepate longè nobiliori: de-
 it itaque illa sic collocari, ut cordi
 am aptissimè inserviret. Equum
 ippe est, ut hepar potius cordi, quàm
 illi sese accommodet. Et licèt ve-
 m sit, hepar dignitate venæ cavæ præ-
 llere, necesse tamen est, ut ambo de
 o jure concedant, ubi cordis res agi-
 r, cujus utilitati utrumque obsequi-
 r. Ad primatum autem hepatis quod
 tinet, asserimus, venas ratione
 véarum hepati saltem coartaneas esse,
 que hujus formationem prærequiri,
 illarum ab eodem oriantur. Quin et-
 m, licet id concedatur, congruum
 men erat, ut vena cava situm cordi
 conformem obtineret, utpote quod in-
 turæ saltem intentione utrique præ-
 ferret. Quippe non modò situs, sed &
 istentiarum eorum haud alia ratio fuit,
 nam ut cordi adminicularentur: ideo-
 ne hepar & vena cava situm suum &
 orde potius accipiunt, quàm ut huic
 gem aliquam statuunt. Debet itaque,

D

cui

cui situs harum partium veram rationem reddere est animus, hepatis positura ad illam cordis; non autem hujus legem ad illius normam exigere.

Si quis porrò quærat, cur præcipue cordis ventriculus in sinistro latere, quior autem in dextro locetur? Nihil hic statim ad hepar recurrendum est, circulusque in causarum assignatione instituendus; sed penitiùs potius inquirendum, an etiam aliæ laterum corporis differentia reperiri possint, quarum tum cordis diveris modè respiciant, tum demque huic, quam nunc obtinet, positura præfiniant? Debent tamen illa differentia esse ejusmodi, quæ non potest à præsentis cordis situ dependere, aliàs enim positio eorum potius à comparanda esset, quàm cordis situs ab eorum positura definiendus. Propter hoc si quis fixerit, sinistrum cordis ventriculum in latus dextrum, pariterque eundem in lævum latus transferri, cogitandum ipsi necessariò est, arteriam, venam, cavam, hepar, Lienem

ntriculum pancreas, omentum, simul
loco in locum transiisse. Quod ubi
erit, nulla ratio ab iis deduci pote-
, cur ventriculi cordis in primo ho-
ne ad eum modum efformari non
tuerint. Quippe partes hoc modo
nspositæ haud minus bellè commo-
que manus suam, quo nunc fungun-
, obiissent. Cum enim reliquæ cor-
ris partes geminæ sint, in quocunque
ere ventriculum cordis alterutrum
nstituerit, eodem proflus modo eas-
m respiceret. Concludimus itaque,
nil fuisse in protoplasto discriminis,
o minus cor, dictæque partes in utro-
et latere collocari potuerint, nihilque
animali extitisse, cujus gratia Creator
ntriculum cordis præcipuum sinistro
tius lateri quàm dextro attribueret,
eter ipsius beneplacitum, volunta-
nque liberam, quâ sic fieri voluit.

Si quis hanc sitûs cordis in protopla-
determinationem casui, fortunæve
tius, quàm Creatoris voluntati ad-
ipserit; is secum cogitet, cunctis o-

minimò animalibus, quorum corda bil-
riam excavata sunt, ventriculos istos ce-
dem modo, quo in homine reperit-
tur, obtigisse: critque id planè con-
rariæ sententiæ stabilimentum. Fieri
nim nequit, ut incertus casus tot tam-
diversorum animalium corda ad e-
dem normam fabricaverit. Fortis-
igitur ab hoc negotio excludenda,
struendaque est unica summi Creatoris
voluntas. Non equidem nobis in re
re est, neque etiam æquum arbitrari
quemquam in rerum naturalium in-
gine, ubi secundæ causæ in prom-
sunt, ad primam statim confugere.
rùm in quæstione proposita, ubi de p-
toplasto agitur, in quo nulla ratio in-
miri potuit, quæ Creatorem ad h-
potius ventriculorū cordis situm, qu-
ad illum fabricandum impelleret, in
ra ipsius voluntas assignanda
erat.

CAPUT VII.

paritur tertio : Cur in homine, & ejus normam in aliis quoque animalibus Lien semper in sinistro hypochondrio situs sit?

Quod Lien semper naturaliter in sinistro corporis latere, (quemadmodum hepar, vena cava, dexterque viscus ventriculus in dextro situm habent) reperiatur, resque similiter in animalibus sese habeat, mirum factum est. Quæret forsitan aliquis, utrum mutabilitatis similitudinisque hujusmodi aliqua reddi queat? Licet enim, ut meminimus, causa nulla esset, cur dispartes in protoplasto situm hujusmodi obtinerent; possit tamen forte ratio qua inveniri, quare hoc in posteris perpetuo contingat, ceteraque animales omnes eandem normam sequantur.

Primum itaque, postquam genus omne humanum similitudine quadam ablerivatum est, qui prior exiit; ne-

esse est, tam expressa hæc prototypi vi-
figia à patre in filium continuè trans-
ferri; nisi fortè vis plastica casu aliquo
ave ab impedimento externo, in situ
partium constituendo turbetur: Quod
si partes à communi naturæ regula de-
sciscere contigerit, anomalæ saltem ac
que imperfectæ, si non & monstruæ, æ-
stimandæ sunt. Petitur quidem hæc
ratio à causa efficiente, suntque etiam
aliæ à finali deductæ, haud negligenda
tamen, siquidem sapientiam & provi-
dentiam Creatoris in hac rerum guberna-
tione demonstrant.

Secundo: Partes istæ situm suum un-
perpetuoque tenore servant, ut tam
vivas quàm demortuis, factâ corporum
dissectione, de partium omnium situ in-
dubitata constet. Si enim istæ fortè
tò modò in dextro, modò in sinistro
tere collocarentur, situs earum hæc
adeò certè cognosceretur, ac artis mi-
dicæ interest, ipsaque Anatomia de pa-
tium harum situ in viventibus & nec
dum discitis, nihil explorati nobis

queret. Et hæc ratio maximè à fine
titur.

Tertia ratio: Situs partium in brutis
in homine analogiam præcipuè respi-
cit. Quamprimum Creator partium
rum positionem in homine præfinio-
rit, æquum erat, ut earundem situs in
utrisque quoque ad consimilem normam
aptaretur; quantum saltem ipsarum
partium natura permetteret. Licet enim
partes ante hominem creata fuerint, na-
turæ tamen intentione homo prior ex-
istit, eidemque illa famulantur: ac pro-
pterea quantò propius ad domini sui i-
maginem accedunt, ejusque usui infer-
unt, tantò quoque nobiliora & perfe-
ctiora æstimanda sunt. Inter alia verò
conveniens, quæ situs partium in brutis
in homine conformitas secum appor-
tet, haud leve habendum est, quòd arti
anatomicæ plurimum conferat. Quippe
in cadavera humana nec omni tempo-
re, nec ubique locorum in promptu
sunt, potest hujus artis cupidus ob eam,
quam diximus, partium animalium con-

formitatem inter se, ipsâ brutorum ed
sectione, ad imperfectam saltem a
quam sitûs partium in corpore human
cognitionem pertingere. Eoque var
dior hæc ratio est, quôd omni ferè æv
nonnulli superstitiosi adeò reperti s
ut cadavera humana discindere nefas
se crederent.

Quartò ; Ista sitûs partium immu
bilitas, veluti fundamentum à natu
constituitur, quo latus dextrum à sin
stro distinguatur. Quamvis enim
decreto humano latera illa satis disting
potuerint ; quoniam tamen discrim
hoc à solo hominum consensu, non a
tem ab aliqua ipsorum laterum differe
tia natum esset, potuisset idem temp
ris tractu, & in distitis longè regio
bus, prorsus aboleri, aut immutari, a
eò, ut latus dextrum fortè sinistri nom
ne loco aliquo aut tempore veniret,
termini illi, dextrum, sinistrum ea
nus incertæ significationis reddere
tun. Ideoque certam hanc & definit
partium in homine pariter atque a

animalibus positionem dictæ laterum
nomenclaturæ inservire censemus. Et
in Lien, præ cæteris partibus, latus
eum ab alio discriminet, idem qua-
estio- nis hujus, de situ nimirum Lienis,
testam præbuit. Quia autem situs il-
lus in quibuslibet animalibus semper
sinistro latere reperitur; oritur inde
sequens dubium.

CAPUT VIII.

*Quæritur quartò: Vtrum situs Lienis
sinistro latere plus roboris, motuiq;
expediendo promptitudinis huic late-
ri quàm hepar dextro conse-
rat?*

IT quæstionem hanc nonnulli re-
ctius exponant, comparisonem
faciunt inter influentiam hepatis in la-
tus dextrum, cum influxu illo, qui à Li-
ene ventriculo, omento & pancreate si-
nistro lateri communicatur: quippe
arteres istæ hepatis sunt ἀρτηριαι. Nec
dubitant, quin hepar in dextrum, quàm
sinistrum latus potentius influat; &
simi-

similiter Lien, ventriculus, pancreas & omentum sinistro lateri influxus suus majorem in modum impertiant; cum etiam porrò lateri sinistro calor ille, qui à magna arteria, sinistroque cordis ventriculo profluit, accensendus veniat.

Quemadmodum cerebrum & eo magnos suos influxus in universum exercens corpus, illudque ipsum spiritibus animalibus & vitalibus maximè illustrant; ita Lienem & hepar in ventre inferiore in partes vicinas etiam illustrant influentiam habere non dubitamus. Virtus autem sive influentia utriusque hujus visceris consistit vel in temperie vel in vapore sive exhalationibus. Temperies hepatis videtur moderatè calida & sicca, leniter adstringens, fovens, firmansque partes vicinas, nihilque prave noxiæque qualitatis in se continens. Similiter & vapor illius temperiei affinis est & quamdiu sanitate fruitur, nil nisi bonum atque utile, firmitudinem ac vigorem partibus vicinis afficit. Ut verum hoc sit proverbium illud; *Aliquid boni*

vicinum bonum : nempe toti lateri extro , ob hepatis viciniam, bene est. Lieni olim probro à quibusdam datum est, quasi ipsi cum spurco & cœnoso antaxat sanguine res esset , & sedes melancholiæ existeret , acidoque humori ventriculum effundendo per vas breve venosum inserviret. Nos Lienem scus ventris inferioris nobilissimum præstantissimum, ejusque influentiam in partes circumsitæ , hepatis influxui non congenerem, verum illo, ob articularum copiam, ac sanguinis arteriosi abundantiam , majorem ac potentioris esse censemus. Et licet in corporibus his hepar quadruplo & forsitan sextuplo Lienem magnitudine exsuperet; Lienis tamen virtus hepatis efficaciam tantundem antecellit. Ideoque reliquæ artes in sinistro latere sitæ in subsidium advocandæ haud sunt , ut hepatis huic præstantiæ æquipollegant.

Pancreatis namq; temperies videtur humida, laxa, flaccida, & moderatè calida; itq; vapor illi temperiei huic necessariò

con

conformis, nempe humidus & relaxans
 Humor quoque, quem de se emittit, videtur
 detur ejusdem naturæ esse, scilicet lenis
 & lubricus, minimumque adstringens
 ut ab illius effluviis parum admodum
 soliditatis, roboris & firmitudinis parti-
 bus vicinis expectandum sit.

Omentum item è pinguedine ferè
 compositum, emolliendis humectam-
 disque partibus præcipuè conducit, pa-
 rumq; stabilitatis iisdem attribuit. Ventr-
 iculus ipsemet, licet nervis fibrisque
 abundet, eoque nomine robur præ-
 ferat, longè tamen minus, quàm Lien
 & hepar, calidus habetur; siquidem
 calorem suum ferè omnem à Liene
 parte & partibus aliis proximis mutua-
 tor. Præterea vapores sive exhalatio-
 nes ab eodem elatæ, non prorsus ab il-
 lius substantia aut tunicis prodeunt, sed
 maximè à materia in iisdem contenta.
 Unde sæpè accidit, ut incommodæ &
 noxiæ potius, quàm beneficiæ evadant.
 Siquidem inanito ventriculo, sæpè su-
 persunt humores viscosi, pastusq; præ-

reliquæ, abductis jam partibus
prioribus in corporis alimentum; un-
locis vicinis plusquam afflatur in-
modi. Quin etiam eodem pleno
istente, cibisque probè saturo, cum
men hi minus adhuc coctione affimi-
ti sint, vapores inde elati aliquandiu
audi & heterogenei manent, partesque
proximas relaxant. Adeò ut utrobique
nefictum, quod iis à ventriculo acce-
t, damnum ab eodem illatum vix com-
miseret.

Ex iis, quæ hæcenus adduximus, in-
erre licet, majus longè commodum si-
nistro lateri à Liene advenire, quàm
extro ab hepate: ac propterea, plus et-
m roboris in illo latere quàm in hoc
periri, præsertim cum arteria magna
sinistro latere sita plus solatii virtu-
isque illi lateri tribuat, quàm dextro à
vena cava affertur.

Non adeò magni discriminis rem-
ontroversiam hanc judicant hepatis pa-
oni, ac cuius primò statim intuitu
videatur; quapropter argumenta pro-

ferunt non pauca, quibus cogitatione
suas explicare conantur, Primò dicunt
Rami arteriæ magnæ utroque versum
exporriguntur, artusque, in quibus re-
bur corporis potissimum consistit, hæc
& illuc pariter de hisdem participant
adeò ut differentia omnis in ipsius trun-
ci situ deprehendatur. Secundò: ipse
met truncus ejus parùm admodum à me-
dia spina recedit, ideoque haud multo
plus roboris uni quàm alteri lateri in-
affluit. Tertiò: Tunicæ illius multo
crassiores densioresque sunt, quàm
quibus vena cava induitur, adeoque
sanguinis in se contenti vaporem pre-
tentius coercent. Quare etiam cre-
dunt, influentiam horum valorum
partes vicinas per halitum aut vapo-
rem, utrobique ferè æqualem esse, præ-
cipuumque ejus discrimen constare
diverso caloris actualis gradu, quem in
partibus circumfritis impertiant. Quar-
tò: minor quoque hæc sit differentia, et
viciniam venæ cavæ cum arteria magnâ
quæ descendens, antequam bifurcetur

idem supergreditur, unde calor eava
alescit. Quintò : Sinistro cordis
atriculo dexter æquipollet; uterque
in corpus unicum constituit, quod
medio situm est, & à lateribus æqua-
ter distat. Neque etiam porrò alter-
ius ventriculi vapor capsulam cordis
inetrat, unde virtute pares redderent-
ur, etiam si aliàs discrimen aliquod inter
s intercederet. Præterea ut sinister
atriculus altero est calidior, ita etiam
rietibus crassioribus circumvallatur,
& manu impositâ, calor utrobique nul-
lo discrimine percipiatur, multò verò
minus circumpositâ capsulâ, quæ ut-
rumque ventriculum æqualiter respicit.
Subductis igitur utrinque calcu-
lis, facile constare dicunt, differentiam
illam, quæ ab arteria magna sinistroque
cordis ventriculo oritur, minoris mo-
menti esse, quàm ut discrimini, quod ab
hepatis in dextro latere positione nasci-
tur, sit æquiparabilis: ac propterea et-
iam plus roboris atque agilitatis mascu-
linis actionibus edendis, in dextri, quàm
sinistri lateris artubus reperiri. Id quæ

Idque inde porro clarius probatur, quod apud plerasque gentes, omni ævo, locoque validis & operosis actionibus expediendis dextra manus adhibeatur eidemque sinistra in subsidium duntaxat adveniat. Cum enim nec institutio, neque imitatione aliquâ mos iste innititur, maneatque in tam dissitis locis, variisque temporibus, firma omnium hac re consensus; intelligi necesse est, quod, cui actio tam uniformis innitatur. Nec videtur fundamentum aliud substrui posse, præter dictam lateris dextri aptitudinem, quæ ab hepatis eodem situ originem ducit.

Hic objicere possumus, reperiri nonnullos, qui non minus gnaviter & expedite lævâ manu utantur, quàm alii dextrâ solent, & ut hi sinistrâ minus valent, ita illis dextram manum imbecillioresse. Unde probabiliter saltem qui deduxerit, latera inter se usu duntaxat & consuetudine distingui. Inque ulteriorem hujus rei confirmationem, dici possit.

sunt, infantes sæpè & pueros, naturâ
ce suaque sponte lævâ manu crebrius
â dextrâ uti; usumque hunc, nisi â
tracibus tempestivè corrigatur, in
consuetudinem postea & veluti natu-
m abire: quod dextri lateris ad mo-
m promptitudini, magis quàm sinistri,
rum convenit.

Porro, quamvis brutis etiam, quæ u-
umque latus necessariò æqualiter ex-
ercent, hepar in dextro latere situm sit,
a tamen utrobique pari robore do-
antur. Judicio probabili, diversita-
tem hanc in hominibus, à disparili usu
tque exercitatione unius lateris præ-
altero originem trahere.

Ut clarius hepatis patroni objectioni-
bus hisce porro respondeant, duo pri-
mùm distinctionis ergò concedenda es-
se dicunt, quæ tamen prædictis neuti-
quam adversentur. Primò: Amborum
laterum naturale discrimen, rective præ-
sinistro robur, haud adeò insigne esse,
quin facilè â perpetua sinistri lateris ma-
gis quàm dextri exercitatione superari
queat.

queat. Quod ab objectione præmissæ
perspicuè evincitur. Secundò : Paternum
esse ajunt , sinistrum latus nonnullis
actionibus aptius quàm dextrum
convenire. Sunt enim actiones masculinæ
& fœminæ ; illæ ad soliditatem , firmitudinem
& robur partium spectantes hæ autem
potius molliorem , teneriorem , facilemque
eorundem sensuum respiciunt. Validi sibi
que constantes motus ad masculinas actiones
pertinent sensuum autem acumen , lassitudo & in-
stabilitas ad fœminæ referendæ sunt

Postquam igitur dextri lateris artus
ut dictum est , naturâ suâ solidiores fir-
mioresque sunt , quàm qui in latere ad-
verso situm suum obtinent , necesse est
eosdem quoque masculinis actionibus
obsequendis magis idoneos esse : debentque
ex altera parte sinistri artus esse teneriores ,
atque alterationibus magis obnoxii , & consequenter
acutiori sensu pol-
lere. Quippe sensuum agilitas & acumen
à facili in eos objectorum impres-
sione provenit, quæ à constitutione par-

tium

am tenera facileque alterabili depen-
t. Dictum vetus *Aurium mollior si-*
stra; & scilicet obteneritudinem, ad
diendum promptior, quàm dextra.
militer existimant, si qua inter oculos
diversitas, sinistram dextro perspicua-
orem esse, & fortè etiam certum ma-
s, si quando collimantes aciem no-
ram in rem aliquam defigimus. Refe-
ant sacræ paginæ, Benjaminitas tanta-
lim peritiz fuisse, ut vel capillum lapi-
e è funda projecto attingerent. Benja-
minus dextræ manûs filium significat.
li verò dicuntur sinistra manu usi. Cre-
iderunt certè, illorum in collimando
exteritatem partim à sinistri oculi per-
picacitate profectam, partim etiam di-
ligenti eorum consuetudini tribuendam
esse. Scævæ quoque cum dextra manu
utentibus prælio commissi plerumque
solus possunt. Id autem casu duntaxat e-
venit; quòd nempe illi cum talibus pu-
gnare soleant, hiverò rarissimè cum si-
nistra utentibus manus conferant.

His ita positis, licet fateantur, discrim-

men

crimen alterum inter se exiguum esse, robur dextri lateris facile à continua sinistri exercitatione superari, sinistrumque latus in scemineis quibusdam actionibus dextro præpollere: non concedendum tamen, utrumque latus in masculis actionibus perficiendis naturaliter æquale esse; siquidem dextrum latus quàm sinistrum in hujusmodi munere præstantius habent. Idque porro vix inde constare adserunt, quod et si amborum pedum in homine æqualis usus sit, dexter tamen sinistro plerumq; firmior, robustior, magisque masculus reperitur.

Quod ajunt, puerulos suâ sponte sæpè sinistrâ manu uti: sciendum, id ubi venerit, non propterea fieri, quòd aptius rem aliquam sinistra prehendant, verum perinde iis sit, quâ manu utantur, sed casu aliquo cogi, sinistrâ potius quàm dextrâ uti: nempe si res tractanda, ob incuriam sinistrae manus frequentius quàm dextræ offerantur, vel si infantes sæpius in dextrum latus decumbant;

ne, aut sinistram mammam sugant.
ibus sit, ut impeditâ dextrâ, lavâ manu
erius utantur; aut si nutrices pueru-
m frequenter brachio sinistro circum-
ant, ut solent, quò ipsis manus dex-
negotius obeundis parata sit. Eo c-
m pacto libera manûs dextræ exercita-
o à corpore nutricis contiguo prape-
tur. dum læva, prout iis libitum fuerit,
eruntur.

Ad ea, quæ de brutis allata sunt, hanc
sponsonem dant, artus scilicet eorum
lerumque in utroque latere æqualiter
xerceri; non concedent tamen eosdem
qualis utrobique roboris esse. Obser-
atum quippè ab agasonibus, malum si-
istro alicui pedi illatum, plus damni e-
uo adferre, quàm si idem adverso pedi
ontigisset: quia nempe leve incommo-
um dextro pedi inflatum, ab ejusdem
ateris præstantiore robore compensa-
ur; augetur verò à loci imbecillitate, si
ævo lateri incussum fuerit. Idemque
imiliter discrimen in aliis quoque ani-
malibus à pecorariis animadversum est.

Con-

Concludunt igitur, constitutam esse aliam
quam à natura laterum differentiam
dextrumque latus ob hepatis præferen-
tiam, sinistro viribus masculisque aë-
nibus exequendis præcellere.

Verum enim verò quamvis Lienis
hepatis suos in partes vicinas infirmi vern-
aris non denegemus influxus; quòd tra-
men utrique lateri tam dextro quam si-
nistro robur aliquod motuique expen-
diendo promptitudinem conferant, gra-
tis saltem dicitur; nec istud in eorum
facultate est. In dextro autem latere
nos majus robur, itemque manum dex-
tram agiliorem ut plurimum & ad mo-
tum promptiorem esse dicimus, non
causas, quas alii tam acutè citant, sed
quia in dextro latere homini est vena
ne pari, quæ fortè in amphidextris ge-
mina est. (2.) Quia ossa graviora in
scapulis, humero, & tota manu dextre
esse aliqui pro certo & comperto ha-
bent; quod fieri potest ab impressione
caloris uberioris in utero matris, cujus
pars dextra calidior. Hinc docet Ar-

eles , naturâ potiore esse manum
 extram sinistrâ: & alibi , primum im-
 pû vel principium motus esse in parte
 extra, ut homo progressurus pri^o move-
 bedê dextrum, avis volare volens prius
 moveat alam dextram. (3.) Quia trun-
 s arteriæ subclavius dexter amplior
 quàm sinister diligenter confide-
 ntibus contra *Riolanum* , quamquam
 non adeo magna sit differentia, nec esse
 debuerit. *Plato* omnes naturâ amphi-
 extros esse sentit, hominumque insci-
 â inertîâque fieri, ut dextri tantum aut
 vi fiant. At *Aristotelis* placet, ab or-
 is nostri primordiis dextram partem
 armè semper esse calidiorē, & lavam
 calidiorē, nisi ad eam consuetudine.
 exercitationeque multâ multum caloris
 spiritûsque quis traducat, ut amphidex-
 ter fiat.

CAPUT IX.

*Lienis substantiam & primûm ejus
 carnem exhibet.*

Lien è partium dissimilarium genere

est, cuius compagem absolvunt (1) Caro, (2) Membranae, & (3) Vasa.

Caro Lienis quia non dissimilis a parenchyma paret coagulato sanguini, vasis circumfuso, idcirco parenchyma appellari meruit. Cuius vocis autorem *Erasistratus* faciunt. *Lactantius Opus. Dei c. 11.* Quid splenem? Quid jecur? quae viscera quasi ex conturbato sanguine videntur concreta. Caro igitur huius est parenchymatica, sui generis, ad modum spongiae rara, laxa, mollis & subnigra: fibrae cum plurimis repleta, quare melius sanguinem copiosum depurationi jadicatum undiquaque imbibere, totique deinde alibilem reddere possit; quae tamen carnem *Excell. Thomas Bartholinus Diatrib. de pulm. f. 2. pag. 27.* dubitare facere videtur.

Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. c. 9. Lienis substantiam crasso nigroque admodum, sed solidioris spongiae, aut vioris pumicis instar, raro tamen concretaque sanguine constare fatetur.

Laurentius l. 1. Histor. Anatom. c. 1.

nem carnem vocat velut *παρὲνχον*
ἀραιὸν καὶ ἀσφύγιον rarum, fun-
 sum & solutum, instar solidioris
 spongiæ aut lævioris pumicis, haurien-
 excipiendisq; fecibus opportunum,
 mirum, uti *Glacano in Cursu Medic.*
 detur, ut innatâ vi & dispositione tra-
 ctat ad se sugatq; feculentum humo-
 rem. Non malè profectò, nostro qui-
 m judicio, spongiæ comparatur: Sic
 enim poros & foraminula plurima
 servare in spongia est, ita etiam in Li-
 ene tale quid dari, spatielaque ab illo fi-
 narum plexu, ut deinceps dicturi su-
 mus, efformari, nulli dubitamus.

Adr. Spigelius Fabric. corp. hum. l. 8.
 4. substantiam quoque ejus appellat
 renchyma, sed laxum & spongiosum
 Idè, innumeris venarum arteriarumq;
 opaginibus refertum.

Cl. Antonida van der Linde l. c. 9. 29.
 motus autoritate *Hippocratis l. d.*
n. 1. 9. quando de Lienis laxitate lo-
 quitur, inter carnem aliorum viscerum
 Lienis, seu Lienem potius ipsum di-

stinguit. Talis est, inquit, non caro, quod
 non potest non compacta esse: sed Lien ipse
 ob infinitatem quasi vasorum, quasi sicuti
 culis est insecto obvia, ita integro laxitate
 corpori conciliat. Celeberrimus *Franciscus de le Boë Sylvius Disput. Medic.*
de Lienis & glandul. usu substantia
 Lienis præ viscerum reliquorum om
 nium substantia, facit longè tenerri
 mam, solubilem & à vasis suis facilè dif
 fluentem, adeoque placenta uterinæ ex
 tenuis planè consimilem.

Hoffmannus in Lib. peculiar. de Lienis
usu c. 1. hanc carnis substantiam non mi
 nus *παρέγχυμα*, quasi tu dicas *ἐν*
ἐνχυμα esse, quàm in hepate ait. *De*
 versatamen est Lienis caro ab hepatis
 parenchymate duobus modis: (1) Quò
 laxior & mollior sit longè carne hep
 atis: (2.) Quòd non semper ut hepar co
 lorem habeat rubrum, sed in recens na
 tis tantùm; in proVectioribus enim a
 livorem tendit. Quòd etiam aliqui ex
 istimârunt, Lienem esse velut exiguum
 hepar, vel, ut *Aristoteles l. 2. de p.*

c. 7. ait : *διον νότον ἤνερ*, non alio
 damento innixum est, quàm quòd in
 tro latere situs, ceu Antagonista, he-
 in dextro latere locato respondeat.
 tera verò plurimùm à se invicem dis-
 pant. Nam (1) numerosæ & præ-
 ndes arteriæ Lienem ad eunt, multò
 atis arteriis majores; licèt hepar Li-
 m sextuplo magnitudine excedat.
 Nulli ramī venæ cavæ in Lienem
 tribuuntur; in hepar verò plurimi &
 igues ingrediuntur. (3) Lien nec
 culam felleam sibi annexam, nec
 um bilarium quoquo versum in se
 tributum habet. (4) Ramus sple-
 as è vena portæ in Lienem pertina-
 s, nihil illorsum defert; sed fluxio o-
 is à Liene horsum instituitur; sicut
 igaturis in vivorum dissectionibus,
 in defunctis, injectionibus lactis, li-
 dò apparet. Rami autem, qui è por-
 in hepar tendunt, humores, quos con-
 ent, illuc deducunt: quemadmodum
 aliter experientibus palam est. Con-
 endum igitur, hepar esse unicum;

& Lienem alterius hepatis vicem neminem
quam supplere, aut ejusdem cum
speciei esse, ut nonnulli opinati sunt.

Hic etiam quaerimus cum acutissimo
Thom. Whartono Adenograph. c.
An caro hæc Lienis sit parenchymatica
an verò glandulosa? Posterius voluerunt
nonnulli, similitudines quasdam
inter glandulas & Lienem admittentes
inter quas illa principatum tenet, quod
nimirum uterque eorum officia non
nulla nervoso generi præstet: Glandulæ
enim omnes, inquit, aliquo modo
nervis famulantur, partesque omnes
non secretoriæ sunt, quodque ab iis
cernitur, vel è nervis excipiunt, vel in
idem suggerunt; nisi fortè sit mater
planè inutilis, cujus excretioni peculi-
res nonnullæ glandulæ dicantur, habentque
vasa isti muneri appropriata. Lien
similiter nervis ministrat, estque
munus ejus secretorium: videtur autem
liquorem aqueum à sanguine mediastini
tribus suo parenchymate & fibris nec
tosis, proliscere. Vix autem fingi posset

t, in quem usum liquorem hunc elicit, nisi in nervorum. Desunt enim a omnia vasa, per quæ idem absponte, præter nervos. Nam lymphæ ductus li adhuc per hanc partem distributi servantur, neque factio accurato examine potuimus vel minimum vasis excretorii vestigium in eodem deprehendere. Probabile quoque est, Lienem se excretorio destitui, vel ex eo, quòd s hæc advitâ non admodum necessaria sit, ut patet, quia canes & feles fortèq; nonnulla alia animalia exsecto Liene, non admodum infelicitè vivunt. Nulla è pars excretoria à corpore separari potest sine magno animalis detrimento; nimirum, si pars excretoria ad vitam propriam, non ad speciei propagationem inserviat, ut testes vel mammae. Lienis verò usus individuo non tantum proli addicitur; & consequenter, non minimè sit necessarius ad vitam, sed esse est careat publico munere excretorio. Glandulæ similiter plurimæ præsentis vitæ periculo excindi

E;

pos

possunt, ut illæ in inguine, collo, axillis, &c.

Et si verò hucusque Lien & glandularum similitudines quasdam inter se habeant, istamen assentiri non possumus, ut ad glandularum classem Lienem transferunt. Neque enim respectu similitudinis constitutionis parenchymatum, nec respectu conformationis eorundem, nec respectu distributionis vasorum inatque se consentiunt.

Primò dicimus, non iis inter se convenire, ratione similis constitutionis parenchymatum, Lienis enim parenchyma mollius est, multoque friabilius illo glandularum. Imò Lienis adeò molle est & friabile, ut ferè ad fluiditatem accedat: Nam minimo negotio copiosè aquâ maceratum sæpiusque expressum in liquorem sanguineum dissolvitur: videretur parenchyma glandularum multo firmitus ac solidius est, nec ablutioni cedat, imò nec fricatione à vasis separari aut abstergi potest. Plurimum ergò hæc parenchymata ab invicem differunt.

terro. eadem parenchymata ratione
imperamenti & coloris non minùs
crepant. Lienis enim parenchyma
guineum planè est, & copioso ac qua-
tagnante sanguine perfusum, colore
in sanguineo saturo ad nigredinem
que vergente infectum; è contra glan-
dularum pituitosum ac pallidum est, san-
guineque parcè alluitur,

Secundò dicimus, conformationem
parenchymatis Lienis plurimùm differre
à illa glandularum. Parenchyma enim
Lienis unum quasi continuum corpus
est, vasorum tantùm & nervosarum fi-
larum distributione constans, quarum
artissimum ope, adminiculante unà in-
tiente tunicâ, firmitudinem obtinet,
à favore præservatur: foret enim alio-
quin quasi placenta sanguinis semicon-
creti, vel stercoreis bubuli recentis in-
ter. Glandularum verò parenchyma
non continuum est, sed in frustula quasi
divisum; quod vasis omnibus membra-
que separatis continuitatem suam
perderet, & vel difflueret, vel granula

vim comminutum ac divisum, eeu fir-
stulorum cumulus cerneretur.

Tertiò dicimus, distributionem v-
forum in Liene multum diversam esse
ab illa in glandulis. Lienis enim vae-
sanguinea multò majora sunt illis glan-
dularum, etiam habità justà ratione di-
ferentis magnitudinis utriusque parti-
ut patet ex ipsa sanguinis copia, quæ pro
hanc partem circulatur: Glandulæ verò
exiles habent arterias ac venas
se distributas, ut ubicunque corpusec-
rum dissectum fuerit, vix vestigium ul-
lum sanguinis appareat. Porro corpe-
ri Lienis datur quidam quasi plexus
ve rete nervosarum fibrarum, var-
se se mutuò decussantium & in quolibet
occurso firmiter inter se connexarum
excurrentium etiam quoquoersum sa-
tunicam ipsius, eidemque tenaciter affi-
xarum, indeque reflexarum. Cujusmo-
di rete fibrosum in nulla glandula
tius corporis invenitur. Denique ner-
vi Lienis videntur terminari in dicta
nervosas fibras, nec ompinò parenchyma

ti operam navant: verum in glandu-
 nervi in ipsum parenchyma sese in-
 quant, & cum eodem duntaxat nego-
 untur. Concludimus itaque Lienem
 numero glandularum eximendum ef-
 Confer. Cl. *Francisc. Glissonius* *An-*
t. Hepar. c. 45. pag. 534. & seqq. qui
 regie hac de rescripsit.

Marcell. Malpighius Med. Profess.
 non celeberrimus de *Viscer. structur.*
exerc. Anat. de Liene c. 4. non paren-
 ymatosam Lienis carnem, solâ laxita-
 & mollietie ab hepate dissimilem, ut
Offmannus, appellat; neque etiam Lie-
 nis substantiam concreto inter fibras
 sanguine excitari, cum *Highmore* pu-
 tat; verum longâ & laboriosâ indagine
 tandem obtinuit, quod totum Lienis
 corpus membranarum sit congeries, in
 cellulas & concamerationes efformata,
 u distincta; & licet dissecta splenis sub-
 stantia concretum sanguinem præ se fe-
 rat, & levi attritione in fluorem solva-
 tur, attamen non dispari ratione ac in
 almonibus: addit, specie carnis nobis

imponat, diluto scilicet colore & sub-
stantiæ laxitate. Et in propatulo re-
fiat, arteriæ ramus innodetur, deinde
aër syringe, vel ore ipso per ramum spli-
nicum copiosè intrudatur, totus ita tum-
geat Lien, ut excedentem adquirat ma-
gnitudinem; quod etiam, minori tu-
men incremento contingat, si per arte-
riam inflatio fiat, coercito prius veno-
so ductu; in vitulorum præcipuè, suorum
& caprarum turgido Liene illicò in ex-
tremis, & inductâ aliquali diapha-
nitate, sinus & membranosi parietes
emergant. Si autem jam tumefactus
siccefeat Lien, mox secetur, vel ejus frun-
stula gladiolo eximantur, totam ipsius
molem membranis sinus, & cellulas vec-
luti favos apum efformantibus coag-
mentatam deprehendamus; quod in om-
ni vis & suis Liene ob facilem exsiccationem
promptius succedat; in humano etiam
Liene, aëre turgido, & repenti loco
exsiccato evidenter eandem structuram
reperiemus, ita ut omnem eximat dubi-
tationem. vide plura pag. 114. & seqq.

Deinde Vir ille in arte Anatomica
maximè versatus ac subtilis miram por-
ut c. 5. scribit, naturæ industriam in-
imponendo Liene observavit, & quo-
am ejusdem ut plurimum una solet ef-
operandi norma, hæcque simplex,
valem à principio proposuit, idè in
Lienis structura alia addidit non diffi-
ilia cæteris viscerum parenchymati-
is, In Liene igitur glandularum, vel
avis vesicularum sive sacculorum ra-
mos copiosissimos observavit, per
tum Lienem dispersos, qui uvæ bo-
um graphice æmulantur. Minimæ hæ
glandulæ, inquit, figuram habent ova-
lem, & magnitudine parum distant à
num glandulis; colorem habent, ut
perpetuò observavi, album, & licet Lie-
is sanguinea vasa injecto atramento
ergeant, & circa ipsas ludant, hæc tam en-
andem servant colorem. Earum sub-
stantia quasi membranæ videtur, sed
mollis facileque friabilis; ejus cavitas
b exiguam oculorum aciem effu-
dit, conjecturâ autem attingitur, dum
teif-

Scissæ in se ipsas concidere videntur
 Numero copiosissima, & ferè innume-
 re sunt, & in descriptis universi Lienis
 cellulis, ubi vulgariter ejusdem paren-
 chyma statuitur, mirè locantur, per-
 dentque à propaginibus capsulæ, sive
 fibris ab ipsa ortis & consequenter ab
 extremis arteriarum, & nervorum fini-
 bus; quin & arteriarum fines, capreo-
 lorum instar, vel serpentis hederæ circa
 ipsas producuntur, quod in recenti ad-
 huc Liene denigratis arteriis observa-
 tur. Appenduntur ut plurimum race-
 matim, cum septem vel octo singulas
 quoque botrus conglobetur. Non æque
 facile sese produnt in quocunque ani-
 malium Liene: Imò solà Lienis lacerar-
 tione innotescunt, in bove, ove, ca-
 pra, &c. levifacit à cultro abrasione, vel
 longâ communi aquâ ablutione patent.
 In homine difficilius emergunt, si tamen
 ex morbo universum glandularum ge-
 nus turgescit, manifestiores redduntur,
 auctâ ipsarum magnitudine, ut in de-
 scripta pacha observavi; in qua Lienis

glo-

bulis conspicuis racematim dispersis
as scatebat. In piscibus autem, li-
ob substantiæ compactam molem,
illicò emergant, tamen eorundem
in longo tempore maceretur, vel
sim siccescat, tandem subalbida ma-
stantur hujusmodi glandulæ, velut
in cæteris animalibus.

An circa minimas enarratas Lienis
glandulas, præter cellularum membra-
, aliud circumlocetur corpus, diu a-
me dubitatum est, cum secto Liene
in omnibus statim occurrant glan-
dulae, sed post diligentem abrationem
sæ tenaciter subrubrae substantiæ.
picandi ansam ulterius faciebat eo-
Lienis inspectio, quæ infinitam penè
angustiam rotundorum, rubrorumque
corporum exhibebat, cum tamen albae
& insignes glandulae in crudo antea
servatae, ne minimum quidem sui ve-
gium relinquerent. Omne tandem
mi dubium, dum in elixato cujuscun-
que animalis sanguine, eandem configu-
rationem deprehendi; Concrevit enim

calore in globulos, pomorum figuram
redolentes, quare probabiliter deduxi
substantiam illam, quâ teguntur glandu-
lae, sanguineam esse, quæ in sinibus & cel-
lulis copiosè stagnat, cum immixta mu-
ta per longum tempus per arteriam
qua infecta sanguine exeat, secun. quæ
plurimum sanguinis extrahat. Cellu-
larum etiam collapsæ membranæ nobis
imponere valent, ut in pulmonibus
videtur, unde cum in Liene flatu turgida
nihil aliud pateat præter pelliculas,
bras, sanguinea vasa & exaratas glandu-
las, satius videtur hæc, quæ glandularum
speciem coctione inducunt, sanguinis
concreti particulas esse. Ex quibus
omnibus conjectari licet, glandulas hæc
locum & situm sibi nancisci in sinibus
& cellulis membranosis, quibus Lienis
substantia integratur, cum ad has addu-
cantur arteriæ, & in has hient; quicun-
que enim affusus humor vel flatus ab arte-
teriis in cellulas erumpendo ab his in rami-
bus splenicis patentem viam adinven-
it. Conjecturam firmat inspectio, l.

subobscura, semicxsiccati Lienis, in
 as cellulis extremi arteriarum fines
 appensis glandulis, quæ licèt sicci-
 quasi oblitterentur, attamen adhuc
 spiciuntur; quare in naturæ statu
 tassè in cellularum spatiis circumpo-
 arteriosis propaginibus pendeunt,
 saltem lateraliter cellularum parieti-
 hærebunt, quod nequaquam est in-
 ura novum, ut de mammis & confi-
 ribus aliàs fortè dicendis patebit.

Licèt ergò caro Lienis non sit ex opi-
 ne nostra glandulosa, verùm paren-
 matica, attamen æquè ac glandulosa
 statu p. n. omnis generis fordes spon-
 in morem in se imbibit, ac ita con-
 et; vel quando nimis induruit, maxi-
 nobis mala minatur. Hinc etiam, ut
Hippocrate 4. de morb. legimus, Lien
 et caput plurimis ægritudinibus sub-
 tur, & variorum morborum author
 stit.

Hæc Lienis caro multis in deliciis est;
 ant enim illum, præfertim vitulinum
 Tuillum, cepisque infarciunt, aut cli-

xum cum visceribus aliis pulteque p̄i-
ratâ conditum apponunt.

Brayerinus l. 12. de re cib. c. 17. r
tionis suæ populos Lienes vitulinoss
mento implicitos, assios mandere,
tanquam præsentaneum remedium sp̄i
nici doloris magnis laudibus efferre
dit. Bubulum quoque assum vel elixu
in cibo eidem succurrere dolori *idem*
c. meminit. *Galenus lib. de bon. & m*
Cib. succ. c. 4. cæteris omnibus suillu
præfert. Quicumque tamen sit, cū
non rarò sit succi pravi, parum alat, ag
in ventriculo concoquatur & pessim
nutriat, mensis deliratorum exulat. C
minus olim apud Romanos tutò mem
appositus est, si *Plinio l. 28. histor. nat.*
4. fides adhibenda sit.

Quamvis autem rarò & non nisi pa
pulis vulgaribus iste in ciborum num
ro sit, attamen ex variorum animalium
Lienibus varia ac egregia etiâ medic
menta, specifico & singulari modo
Lienis dolore non parum auxilii præ
bentia, parantur. Lien ergò canin

e Autore l. 2. d. diat. & l. de morb. intern.
iventi eximatur & assumatur, admo-
m Lienosis prodest. Erinacci assum-
s & hædi dolori impositus, præsen-
eum, ut scribit *Otto Brunfelsius l. 2.*
ron. medic. simpl. pag. 196. remedium
Apri recens capti Lienem assum-
comestum vertiginem ex templo tol-
e, experimento *VValtheri ab Hiru-*
m testatur *G. Hier. Velsch. cent. 3. obs.*
st, dicit in notis ad hunc locum, Lien
vόρον ἥπαρ, ex sententia *Aristotelis*
Histor. animal. c. 6. Unde & singulari
oprietate cerebro amicum esse, & vi
adam adstringendi, vapores ex ven-
elevatos reprimendo, vertigini pro-
Te potest. *Oswaldus Crollius in Basi-*
Chymica ex splene bovis extractum
rat, quod in omnibus Lienis obstu-
onibus singulare auxilium præstat. *Io-*
h. Quercetanus in pharmacop. dogmat.
Titul. l. 1. c. 1. item *Ioh. Schroderus in*
pharmacop. Medico-Chymic. pag. 170.
coctum splenis bovis contra Lienis
structionem ac scirrhum mirificè

commendant. Et si ex abjectissimis corporis nostri partibus, v.g. urina, po-
pharmaca conficiantur egregia, quid
ex Liene ejusdem quoq; medicamen-
præparari queant.

CAPUT X.

Lienis fibras proponit.

Fibrarum, quibus universus Lien
patur, tantus est proventus, & ra-
ra implicatio, ut abunde naturæ sole-
tia in custodiendis fulciendisq; pri-
priis machinis innotescat. Harum stru-
ctura ususque apud Anatomicos con-
trovertitur. Antiquiores enim pro san-
guineis vasculis habuerunt in innume-
ram ramorum sobolem diffusis, harum
que cavitatem experientia conati sunt
firmare nonnulli Viri Clarissimi, additis
insuper rationibus; Nam sicuti hepatis
vasorum implicatione sanguinem rece-
pit, continet, ab impuritatibus defæcat
ipsumque tandem cordi subministrat
materiam transvehendo per totum paren-
chyma; ita cum quid simile in Lienis
succedat, vasorum eadem implicatio re-
qui-

retur. An cavæ ergò hæ fibræ sint,
est, nil nisi extremitates vasorum,
minimas usque partes solutæ, an soli-
hoc est, stamina filosa & nervosa Lie-
substantiam πῆλον constituentia,
quiritur meritò. Scrupulum pepere-
nt hunc, tùm ex veteribus, qui cre-
derunt, vasa ipsum parenchyma non
vadere: tùm ex recentioribus *Highe-*
rus & *Vhartonus* verò arbitrati sunt,
ras has nervosas distinctum à vasis
rpose esse. *Andr. Vesalius Fabric. corp.*
m. l. 5. c. 9. idem statuere à nonnullis
idem dicitur, cujus tamen sententia
detur, venas & arterias saltem non eâ-
m ratione conformationeque simili
plexum facere, prout in hepate fa-
tum. Verba ejus ita leguntur: *Vicun-*
e enim multas venas ac arterias Lienis
seri certò cognoscimus, nulla tamen per-
de ac in jecoris & pulmonis corpore per-
stantiam ipsius dispersæ animadver-
ntur nisi perquam rara eademque ad-
modum graciles: non aliter, quàm si simul
que rectam Lienis lineam ingrediuntur
vasa

vasa in innumeram ramorum sobolem de
 funderentur, adeò tenuium, ut cavitas
 quodammodo carentes fibrae potius quam
 vasa nuncupandi essent. Hisce ramis seu
 bris undetunq; in se convolutis, crassus an-
 modum sanguis obducitur, quem Eras-
 stratus hic quoque, quòd vasis circumfun-
 ditur, $\mu\alpha\pi\epsilon\gamma\chi\upsilon\mu\alpha$, uti & in jecore, ap-
 pellavit. Neque profectò tenuis sanguis
 quo Lienem vulgò propter arteriarum
 frequentiam enutrirì damus, sola raritate
 substantia Lienis causa esse videtur, sed in
 numerus ille fibrarum (vix ausim enim
 arteriarum dicere & venarum) imple-
 tus. Talis igitur mihi Lienis in sanis ho-
 minibus apparuit substantia. Has fibras
 ex genere valorum emerxisse, & vascu-
 lum naturam retinere, cavas esse & sar-
 guinem vehere Cl. Joh. Theod. Scher-
 ckius Exerc. Anat. 6. l. 1. §. 2. c. 24. demon-
 strat primò experientià, si stylo immis-
 harum distributionem prosequamur
 in nulla enim alia corpora tandem dirigi
 mi deprehenduntur, quàm in anted. Et ad
 hasce fibras, quas venabula & venastru-

è, ut putat, appellavit subtilissimus
 liger; deinde ratione, quod idem ex-
 re officium debebant, atque minor
 plexus vasorum iste conspicuus in he-
 e; cujus officium est, sanguinem re-
 ere, continere, & segregatum ab im-
 itatibus suis cordi transmittere. Ast
 cum fieri non posset, priusquam u-
 ersum hepatis parenchyma pervade-
 t, quid lex quæso similium in Liene
 ad atque id ipsum promitteret. Addie-
 am, quod parenchymata sint propter
 a, non hæc propter illa iusto consilio
 Deo condita. Earum quoque duri-
 s dissentientem non moretur, &
 od nullam cavitatem habeant, & quod
 embranz superficiem contingant. Ni-
 enim apodictici inde sequi: ἀπόδεικτα
 e: ita melius consuli organo: ita ejus
 ficio: vasa eundem cum fibris strictè
 stis usum administrare: & demùm
 tia præter necessitatem non esse mul-
 alicanda, apertè fatetur.

Verùm si hujusmodi fibræ Lienis
 dictæ ex genere vasorum essent,

corumque naturam retinerent, etiam sanguinem veherent; at ne guttula quidem sanguinis per dissectionem earum deprehenditur; quod si interdum fanguine inficiantur, potius ex secta aliqua arteriola vel venula proxima provenit substantia earum nervis haud dissimilis est; & usus, quem habent, etiam diversus est. Nec nervis in succo vehementer sunt auxilio, ut *Franciscus Glissonius* *nat. Hepat. c. 45.* & *Thom. VVharton* *Adenograph. e. 4.* crediderunt, ac idem novo hoc assignato usu eas cavas fecerunt; quomodo enim liquorem nutritivum veherent, cum spirituum animalium distributioni in Liene inserviant.

Marcell. Malpighius de viscer. str. *Stur. Exerc. Anat. de Liene c. 3,* an iam singula quæque filamenta fibras constituentia cava sint, adhuc dubitat, quod dum fibras componunt, eandem implicationem & productionem servant, quales in fistulis arborum ramos componentibus observatur, & licet in membranam absumentur, adhuc tamen p

mod spatium determinatam inclina-
em retinent: Quoniam autem *Spi-*
s observavit, interiorum Lienis
membranam hujusmodi fibrarum effor-
am plexu, osseam fieri, & interdum
lagineam, quod ipse in bove semel
c; non videtur vasorum natura de
i his competere posse. Et oculatio-
rectio hujusmodi filamenta tantum
tenuia & valida, nullam cavitatem
entia, prout sensus attingere valet,
a venis vel arteriis orta demonstrat,
igenti indagine ipsarum exortus im-
atio, & structura examinetur.

los fibras has corpora solida, seu
ina filosa & nervosa, quæ tamen
is non carent, censemus. Et hæc ena-
tur ab interiori Lienis membrana,
er transversum producuntur in op-
tam dictæ membranæ partem, seu
apsulam quandam, sive commune
allucrum vasorum per medium Lie-
erreptans. Non idem servant pla-
, sed identidem sibi occurrentes
divisæ propriæ substantiæ, vel fibru-
larum

larum, seu capillarium partium dimidia
 tâ portione consimilibus inosculante
 ita ut mirus fiat nexus, & rete, & dicitur
 membranæ accedunt, bifurcantur; unde
 multiplicibus veluti ramis in ipsam
 feruntur. Componuntur hæ fibræ ex
 lamentis, seu minoribus aliis fibris
 longum ductis; etenim scissæ filame
 torum elegantem implicationem, ram
 rumque productionem exhibent; exten
 sis autem finibus per latum extensis
 membranam desinunt; unde satius
 detur credendum, fibras hasce pro
 ctiones esse membranæ propriæ Lienis
 ejusque capsulæ propriis staminibus
 consarcinatas, ut sanguinea vasa, me
 lisque Lienis structura conservetur
 eumque locum habere, qualem in æro
 ficiis ferrea illa vincula, quæ arcubuss
 robur subtenduntur.

Et huic nostræ opinioni multi fave
 Anatomici. *Nathan Highmorus Disq*
fr. Anat. l. 1. part. 3. c. 3. Nullo modo,
 quit, tam variis anfractibus venæ cu
 arteriis implicantur; nec ut in hepate

portæ & cavæ propagines disseminantur, & inoculantur; sed plexus illi, & oculationes, quæ in Liene conspiciuntur, à fibris invicem contextis oriuntur. Fibræ hæ ab Anatomicis proveniunt, quasi rami splenici essent propagines, sunt reverâ filamenta tenuia, valida, nullam cavitatem habentia, nec à ramo splenico, sive arteria originem ducunt, sed variè inter se complicatæ fiunt, quasi retia multa complicata, & innexa fuerint; utrinque tunicæ latebris firmiter adnectuntur; ex qua principium ducere videntur, circa quas filas parenchyma Lienis, carnosam quandam substantiam leviter undique circumvoluta, adhæret, interjectis divinis foraminibus plurimis, quæ cancellos, seu vacua illa spatia, quæ retium ordinis interjacent, referunt, seu foramina illa inania in spongia, aut pumice exprimunt: & fibræ parenchymate constitutæ, filis retium, seu partibus contiguis pumicis, aut spongiæ appositè se adassimilantur. Mirificè inter se con-

texuntur, adeò, ut hac in parte naturæ
artem suam maximè ostentare videatur
& opus tam mirandum ex industria co-
fecit, ut fabulosas illorum opinionum
convellat, qui membrum esse otiosum,
nullius usûs affirmant.

Et ut Cl. *Antonius Deusingius d.*
brie. corp. hum. part. 1. c. 6. scribit: Fibræ
frequentes ceu filamenta tenuia ac vi-
ta, nullam cavitatem habentia, per un-
versum Lienem sparsa, sibi quæ invicem
reticulum plurimorum in modum connec-
tunt, quibus intertextum est ipsum
enchyma; quæ pro venarum & ar-
teriarum anastomosibus perperam im-
bentur. Ex ad Lienis superficiem quæ
quæ versum pertingunt, ac sub præd-
tunica communi in peculiarem tunicam
circa Lienem expandi videntur.

Concludimus ergò, fibras hasce in
liquorem quendam per Lienis par-
enchyma delatum elicere, eumque in
vos capillares, quibus conjunctæ sunt
transferre, ut *Francisc. Glissonius A*
Hepat. 6. 45. pag. 523. credidit; ven-

ritus animales per ejusmodi nervos
 illares suscipere, à quorum in Lie-
 ni inflexu sanguis plusquam in eo per-
 tur, talique tincturâ donatur, atque
 disponitur, ut excrementa in singu-
 partibus à sanguine separari, & per
 ta sua emuntoria expelli possint, atq;
 guis ipse in nobiliores corporis hu-
 ni usus abeat. Et præter usum hunc
 marium laxum quoque ac spongio-
 n Lienis parenchyma stabiliunt, ne à
 guinis ex arteriis affluentis impetu
 tum diffiliat. Et Lien ipse, ut Cl.
Antonida van der Linde in Med. Phy-
gic. loquitur ob infinitatem quasi
 orum, quæ sicuti est oculis in secto
 wia, ita integro laxitatem conciliat.
 verò distinguit non suâ sed *Hippo-*
cratis autoritate l. d. carn. t. 19. Et in ea-
 metiam opinione fuit *Hoffmannus* li-
 d. a su Lien. c. 1.

An etiam ejusmodi fibræ in Liene ca-
 atem faciant, adhuc sub judice lis est.
Hoffmannus l. c. pag. 5. & 6. utrumque
 venam & arteriam, antequam Lie-

nem tangant, propagines aliquot demittere: sed postquam tetigerunt, in nea alba in minimas tantumque non numerabiles venulas & arteriolas diffusi, ut jam non vasa, sed fibræ videri possint; itaque per substantiam Lienis ordine nondum satis cognito, dispergi multâ intus relicta cavitare, scribitur quemadmodum quoque in hepate relinquitur à venæ cavæ & portæ ramulis. Item cavitatem hanc solùm vocat, quæ faciunt vasa, ea tamen adeò exilia, ut filum non admittant. Non degenerant autem in fibras, sed manere vasa hic comprobatur. Vasorum plexum cavitatem vocavit Hippocrates l. 4. d. *μοιροειδὲς καὶ ἐγκοιλὸν εὐρυχωρὸν πλείστην ἔχειν, φλέβας ὠρείας καὶ ταχείας, καὶ ἐλκυσθεῖς ἔχειν.* Hic locus errorum plurimorum de usu Lienis fons existit, favetque eorum opinionioni, qui atrabilem seu melancholicam attrahi à Liene & coqui adstipulantur.

Sed nemo haftenus Anatomicorum
 ut vacuum hoc ad oculum petentibus
 libere ; quique etiam hujus in scri-
 ptis suis mentionem fecerunt, perperam
 faciunt. *Vesalius Fabric. corp. hum.*
c. 9 cum membranas Lienis cavo-
 ri scribit, ejus partem simam seu ca-
 vum subinnuit. Cavitates veluti in he-
 re constitui à venis & arteriis, quæ in
 Lienem absumuntur, disertè pronun-
 tiat *Hoffmannus*, deque his explicandum
 præ citatum locum *Hippocratis* effe-
 cet. Penitus eandem negavit etiam
Franciscus Vlms Pictaviensis contra *Gale-*
num, & ejus affectas. Excell. *Thomas*
Artholins Anat. reformat. l. i. c. 16. nul-
 lam amplam cavitatem in Liene admit-
 tit, quemadmodum in folliculo felle &
 renum sinibus membranosis atque
 ica videmus. *Riolanus Anthropol.*
c. 13. ex *Arantio* & *Spigelio* solum me-
 nit arteriæ splenicæ, quæ ampla satis,
 fractuosa & sinuosa ad Lienem ac-
 cedit.

Nathan Highmorus Disquisit. Anat. l. i.

part. 3. c. 3. postquam ex tunica Lienis
 fibras originem ducere censuit, dicit
 tunc oriri foramina, darique plurima
 in Liene, quando circa fibras paren-
 chyma Lienis, carnosa quædam sub-
 stantia, leviter undique circumvolta
 adhæret, quæ cancellos seu vacua illa
 spatia, quæ retium chordis interjacent
 referunt, seu foraminula illa inaniam
 spongia aut pumice exprimunt, & fibra
 parenchymate vestitæ filis retium in
 partibus continuis pumicis aut spongiæ
 appositæ satis assimilantur. Et *Exercit.*
de Melanchol. Hypochondr. c. 4. Lien, ut
 scribit, præter cætera vasa propagine
 nervosam à sexto nervorum pari obor-
 nit ac innumera fibrarum filamenta
 tenuia, valida, variè inter se complicantur,
 quasi retia multa simul implicarentur,
 utrinque interiori faciei adnata, ex quo
 bus principium ducere videntur, & tunc
 tam penè Lienis constituunt molem
 circa hæc carnosa quædam substantia
 leviter undique circumvolta, Lienis
 parenchyma constituit porosum,

qua

a si spongiosum ; foraminula interje-
 , inania, sicut in pumice, quædam
 ajora, quædam parva habet. In qui-
 s arteriæ cum nervi ramusculis disper-
 sanguinem copiosè effundentes, to-
 n Lienis irrigant substantiam, & in-
 ia illa & spongiosa foraminula san-
 ine fervidiore replent, qui à vena rur-
 s lacunatur, & in portam effusus he-
 ti mandatur. Præter hæc nulla alia
 sa aut du&us novit Anatomia. Cl. *Ioh.*
Heod. Schenckio Exere. Anat. 6. c. 24 l. 1.
 . salvo omnium hac de quæstione ju-
 cio, placuit adfirmare, sinus dari ut in
 ongia ita & in Liene, similes poris &
 raminulis, plurimos, qui nihil aliud
 nt, quàm discontinuatæ & circumstan-
 s ipsius parenchymatis partes, fibro-
 istis & innumeris vasorum disparti-
 rum plexibus interstitæ & adjunctæ, quæ
 men, si substantia Lienis nimis humi-
 est, mollis & laxa, plurimo sanguine
 umoso, ut sæpius in dissecctis observa-
 r, scatent; quin si indurata est, sicca
 irrhosæque Lienis substantia exiles ad-

modum fiunt, ac sub ipsa sectione peritus dissolvuntur & pereunt.

Ab incauta etiam & festinante parenchymatis apertione, cum anastomosis & divaricationes vasorum inquiruntur sinus & cavernulae adulterinae pro veris se plures manifestant, cum scilicet utriusque à vasis parenchyma dividitur.

CAPUT XI.

Lienis membranas illustrat.

Membranarum generatio, proventus & usus adeò in natura familiaris est, ut non solum singula corporis membra, quoquo modo muneri alicui dicata circumducantur, sed quæ naturam ipsam oppugnant, eamque à recto operandi ratione deflectere cogunt, tam providè membranis ipsis donentur, quemadmodum in tumoribus præcipue accidit, ut suspicari possimus, aberrantem etiam naturam membranarum terruram eligere; unde nil mirum, si providè Lien, qui necessario firmitudine certosque propriæ compagis terminos

exigat

gebat, suis membranis circumam-
tur.

Galenus l. 4. de usu part. c. 16. tunica,
e ipsum ambit, meminit; & hæc non
dò est vinculum, sed & tunica, ut &
minatur, regens, vestiens omni ex
te viscus.

Tunicam ergò substantia Lienis ob-
uit tenuem, nonnunquam tenuissi-
m; si tamen cum illa hepatis confe-
tur, crassior apparebit, ut vim sangui-
arteriosi melius ac fortius sustinere
set. *Antonida van der Linde in Med.*
physiolog. crassitiem hanc à duplicatura
lorum & peritonæo provenire arbi-
tur. Vidit tamen eam *Cl. Schenckius* l.
in cadavere foemineo summe te-
nem.

Oritur à peritonæo, & lineæ rectæ
enis inseritur, totumque postea viscus
ceingit. Et hæc, testibus *Andernaco*,
Auhino, *Riolano*, *Bartholino*, *Conringio* &
Schenckio in senibus & morbofis apè
crassatur ac induratur, evaditque ser-
osa, ligamentosa ossea & cartilaginea.

Hanc ita crassam & condensatam in spleetico lecto observavit Excell. *Thomas Bartholinus cent. 1. Hystor. Anat. 80. cent. 4. Epist. Med. 14.* ut corium bubulum crassitie æquaret, & levi operâ manu à parenchymate separari posset & exsiccari. Exsiccata autem eam, quam in Museo suo adservat. gluten siccum præ se ferre scribit. Aliquando à nimio calore ac siccitate adeò exsuccus evadit, ut vitri in modum frangi posset. Sic in Spoletano podagrâ benè vexato atque extincto, teste *Joh. Schenckio l. 3. observ. Med.* Lien inventus fuit planè exsuccus, omnique pulpâ carens, marsupii in modum inanis, sinistris hypochondriis affixus. Nonnunquam pinguedine obducitur, quæ tamen propè lineam albam potius omento, quàm veræ Lienis membranz adhæret. Ejusmodi constitutionis fuit in viro quodam quinquagenario, ut *Cl. Joh. Theod. Schemskius l. c.* refert, qui capitis supplicio affectus publicæ dissectioni Jenæ expositus est. Dubitari autem posset de hanc

pinu

inguedine, num adnata huic membræ
fuiſſet, an verò portio omenti, à qua
aliena non eſt.

Alteram tunicam habet Lien ab o-
mento mutuata, quæ, notante *High-*
pro Diſquiſit. Anat. l. 1. part 3. c. 3 à li-
nea recta in ejus medio infixat totum po-
ſtea viscus ſuccingit, hæſtenus pro ſim-
plici habita, & à priori non diſtin-
ctam aſſertu difficilem judicat *Cl. Schen-*
nius. Pauci enim pinguedinem in gib-
ba oſtenderunt. Qua in ſima ad Li-
eam Lienis, quam credit conflata eſſe
& congressu omenti cum membranis
iſtorum parenchyma ingredientium,
proximat, ſæpius pinguedo apparet,
verò verò aut nunquam in dorſo & ſu-
perficie reliqua.

Acutiſſimus *Antonida van der Linde*
Med. Phyſiolog. lineam Lienis unicè
mento deberi dixit. Et *Casp. Bauhi-*
us Theatr. Anatom. l. 1. c. 43. ſimplicem
hanc tunicam eamque tenuem ab omen-
ti membrana, quæ Lienis lineæ rectæ in-
ſciſcitur, vocat. Hanc autem à perito-
neo

axo productam voluit; cum tamen res
 verâ rudimenta omenti sint, sub initio
 in foetu priora peritonæo. Hanc *Ris-
 lanus in Enchirid. Anat. l. 2. c. 26.* pro
 priam Lienis vocat, cum communem
 non habeat. Unde etiam eam facili
 dimoveri putat *Cl. Schenckius l. c. Petrus
 Laurembergius Colleg. Anat. Exerc. VII.*
 tunicam foris Lienem circumplecten-
 tem non unam, sed etiam duplicem faci-
 a alteram partem peritonæi, alteram
 ius in propriam. Quod similiter st-
 uit *Francisc. Osvald. Grembsius Arbor-
 integr. & ruinas. l. 1. c. 8. §. 6.* Quibus
 calculum etiam subjicit *Marcell. Mar-
 pighius de viscer. structur. Exerc. Anat.*
Liene. c. i. secundum cuius opinione
 exterior membrana satis valida est, ti-
 tum ita ambit Lienem, ut veluti marsu-
 pio contineat, quod in ove præcipue
 apparet; in aliquibus autem non totum
 involvitur Lien, sed exigua ejus quædam
 portio, quæ ventriculum tangit, non ob-
 velatur, ex quo emergit dilucidatio ser-
 tentiæ eorum, qui hanc tunicam aff-

expansionem omenti esse, vel mavis:
itonæi productionem Lienem obve-
tis; nam diaphragmati in bove hæ-
us communi ambitur involucro. Et
c membrana, ut porro *Autor* Clarissi-
s. docet, suos nervos, venas, arterias,
ras & vasa lymphatica habet. Detra-
hi autem hæc exteriori tunicâ, porro in-
it, quod facillimo succedit negotio,
currit altera lævis & firma, totum Li-
em ambiens, nullibique perforata,
preterquam ad vasorum ingressum &
ressum; non adeò tamen densa est,
quin per ipsam aëris portio non erum-
it, dum vi in vasa intruditur, quæ ta-
men ab altera superextensa membrana
erectur. Componitur hæc non va-
, & irregulari filamentorum contex-
, ut solenne est in cæteris pannicu-
, sed eleganti & mirâ fibrarum impli-
tione contextitur, quæ fortè describi
quit, sed solo intuitu attingi potest:
singulis enim suæ substantiæ particu-
is, ubi interiores fibræ transversim Lie-
em excurrentes nectuntur, tenuia quæ-
dam

dam stamina, hinc inde ab hoc puncto
 veluti à centro quodam diramificantur
 donec contiguas fibris à consimili exor-
 dio emanantibus occurrant, cum quibus
 implicatione factâ, totam hanc pan-
 niculi structuram efformant; hoc totum
 laceratione mediâ emergit, si per lon-
 gum in bovino Liene fiat; faciliior nam-
 que contingit fibrarum ibidem integra
 separatio, cum præcipuè versus superio-
 ra rectitudinem habeant. Membranam
 istam osseam fieri, à pluribus est obser-
 vatum, & *Boschius* ita induratum versum
 abdominis musculos vidit, ut scirrhum
 in ipso subesse suspicaretur. Non raro
 in ovibus præcipuè, concretos calculos
 ex gypsea materia, vel melicerides, ali-
 osque tumores observavi, ex varia for-
 tē eruſcata ab extremitate vasorum con-
 crescente materia. Arteriarum finibus
 irrigatur hæc membrana; nam si atra-
 mento, vel aëre turgeat splenica arteria
 interiora Lienis pervadens, extremi rami
 mi versus omnem peripheriam, breviter
 tamen producti, tribus vel quatuor rami

mut

his ulterius subdivisis assurgunt. Idem
m observatur tumefacto ex aëre, vel
mento, splenico ramo; etenim in
membrana investiente ampli rami hinc
e dispersi, infuso humore referti at-
untur, & secto etiam per medium
ne, insignes veluti arborum radices
prehenduntur rami, calore infusi hu-
ris aspersi, qui probabiliter ex con-
uata via, quam ater humor immissus
signat, splenici rami soboles sunt.

Usum harum membranarum nos esse
imus, ut scilicet materiam Lienis flui-
m colligant, contineant, ac à fluore
reservent; aliàs esset quasi placenta
guinis concreti; vel stercoris bubuli
mentis instar, ad mentem *Thom. Whar-*
ri Adenograph. c. 4. difflueret. Unde
tam densitas earum in his maximè con-
tere videtur, ut rectius tenuia & liqui-
la, ne excidant, & hydropem creent,
iis contineantur.

CAPUT XII.

Lienis vasa & primum ejus arterias disquirat.

Vasa vitæ fontes antiquitus habit singulas animalis partes affluent irrigant, & præcipuè viscera, in quibus novâ lege & in situ ita implicantur, ut ad peculiare opus quasi dammentur, ideo cùm in hujusmodi censum Lien referatur, vasorum copiâ necessariò ditatur. Sunt igitur ejus vasa 1. arteria 2. venæ. 3. vasa lactea. 4. lymphatica. & 5. nervi.

Arterias habet à ramo aortæ descendente supra cœliacam posito; & proprio nomine Splenicus vel Lienaris ab *Aranio*, primo ejus proditore, *Anat. observat. c. 38.* dicitur, quia solus ad Lienem progreditur. Quamvis enim à cœliaca ramo sinistro oriri has cum *Galeno Vesalio, Spigelius, Laurembergius, Veslingius, Bartholinus, Highmorus, Deussingius* & alii statuunt. accidatque ob naturam lusem & à cœliaca aliquando pronata

intervasse, frequentissimè tamen, ut re-
 dmonet *Riolanus* in *Enchirid. Anat.* &
Amadvers. in Bauhinum, non recipit
 verias à cœliaca, sed habet insignem si-
 peculiarem, quæ varicosa ambigiosè
 Lienem progreditur.

Hinc gloriatur etiam, quòd hanc ar-
 tiam in hoc situ sæpius publicè de-
 monstraverit; quòd oculari fide etiam
 testati sunt postea *Rolfincius*, *Lindanus*
alii. Imò etiam ipsi *Hippocrati* 4. de
verb. t. 13. cognita quædam de origine,
 progressu & insertione fuisse videntur.

Processum ejus nos ita delineamus :
 Initio quidem est indivisa, paulò post
 oducit furculos tot, quot conjun-
 enica vena. Ante divisionem ex su-
 riori parte gastricam sinistram, quæ
 medium partis posterioris ventriculi
 rrigitur, inde ascendens orificium si-
 strum coronæ instar cingit, & coro-
 riam arteriam constituit. Ex infe-
 ori parte mittit epiploides sinistras,
 in sinistram omenti regionem pro-
 ctæ ad colon varios etiam furculos
 mit-

mittunt. Deinde post divisionem sparsis de se his ramulis, Lienis adproximatur & dividitur in duos ramos. Superior inseritur in τὴν κεφαλὴν caput : inferior in τὴν πλευτὴν caudam Lienis. Hoc a sectore *Higmore* in homine accidit in brutis tota in partem ejus inferiorem implantatur.

Ex superiori producit vas brevius arteriosum, non unum & simplex, sed tribus, quatuor, quinque, nonnunquam sex surculis constans : Rarò emergit a splenica Lienis cavo jam immersa : fertur semper ante ingressum. Inseritur in sinistram fundi ventriculi latus superius Inferiorem arteriæ hujus ramum cum vena sua ἀνασώωσιν facere ex *Riolano Anthropolog.* notat *Spigelius*. Tandem uterque ramus in Lienem, ubi linea ejus seu sutura recta est, immergitur πολλοῖς καὶ μεγάλοις pluribus & magnis propaginibus, à *Galeno* l. 4. d. usu par. c. 15. adnotatis, quæ uniuntur, & una membranâ copulantur cum venis. Explorari id potest duobus stylis, altero per

etiam, altero per venam intromisso: contingunt se tandem in uno puncto. Divisiones autem hæ vasorum in ingressu sunt majores, deinde sensim & sensim attenuantur, adeò ut aranearum is similes conspiciantur, unde multi neminem non ingredi dixerunt. Longè tamen aliud experientia nos docet; martrato enim colliquefactoque Liene, arteriolarum venarumque quaquaversum per totam Lienis substantiam dispersam fruticationem cernimus, quod dextritati *Higmorei Disquisit. Anat. l. 1. part. 3.* adscribimus; cujus etiam experientum fecit *J. Jacob. Vesperus*, quemmodum apud *Thom. Bartholinum Diab. de pulmon. l. c.* videmus

Pancreas etiam obliquo & flexuoso ductu pererrat arteria hæc splenica. *Uln. Jul. Cas. Arantius observ. Anat. c. 35.* Quòd una ab aorta ad Lienem propagata arteria obliquo flexuosoque, anguis in modum, ductu per pancreas progrediar, ac sinubus hinc inde sit prædita, & quod oculatissimi Anatomici id non observaverint, miratur,

Cl.

Cl. Higmorus *Disquisit. Anat. l. i. part.*
 3. c. 3. hunc arteriarum processum singu-
 lari hoc modo nobis ita describit : Ar-
 teria ex coeliaca, satis magna, enata, trans-
 versim. per inferiorem omenti membra-
 nam se distendit. In medio itinere bifur-
 cata, aliter ramus ad Lienis partem elati-
 rem in homine & in cane, aliter ad demissi-
 rem profertur, qui in varios divisi surcu-
 los, in substantiam ejus inseruntur. In
 vaccis, ovibus & damis non est divisa, sed
 tota in partem ejus inferiorem implanta-
 tur, quia partibus superioribus fortitè
 ventriculo alligatur. Cùm verò utrinque
 substantiam ejus intrârunt, varîe per eam
 in plurimas ramorum soboles diffundun-
 tur, ut in bovis Liene videre licet. Vici-
 nas nullas habet in bove, damis, ovibus
 sed ramus splenicus, cùm ad Lienis sedem
 inferiorem pervenerit, quamprimum pen-
 tunicam ejus penetraverit, in porosam Li-
 nis substantiam statim desinit; quæ in sa-
 lam, variis foraminulis pertusam sangui-
 nem effundit, unde in portam reducitur.
 In humano verò Liene, paulò altius in sub-
 stantiam

eriam ejus unà cum arteria surculis perforant, nec tam manifestum perforantur, in bove, quibus foraminulis sanguinem substantia Lienis recipiunt. Nullo modo tam variis anfractibus cum arteriis imbricantur, nec ut in hepate vena porta & ea propagines disseminantur, & inoculantur: sed plexus illi & inoculationes, in Liene conspiciuntur, à fibris invicem contextis oriuntur.

Cl. Marcell. Malpighius de vi-
r. structur. Exercitat.. Anatom. de
lien. cap. 3. de arteria splenica ab a-
orta deductæ, ex ortu & productione
non multum disputat, verum ejus tan-
tum historiam, prout viscus hoc perva-
git, ex singulari autopsia ita delineat:
Hæc arteria diverso ritu animalium sple-
ni intrat, etenim in bove & ove unus
est ipse ramus, qui interius in multipli-
cis scinditur surculos. In homine autem
ne, equo & aliis, tribus vel quatuor;
quandoque pluribus subintrat ramis; hi
tenarum extensos tubulos, in Liene præ-
teris amplos, prosequentes, hinc inde pro-
dis-

ductis furculis, extremis tandem divaricatis
 tionibus ad nova quadam corpora, & ad
 Lienis spatia desinunt: reliqui autem
 exteriori tunica absumentur: hoc totum
 in bovino, suillo & ovino Liene facilius
 innotescit: in homine tam flaccida est Lienis
 substantia, & tantus est sanguinis coe-
 citi proventus, ut vasorum aliquo ex-
 tiam progressus de facili effugiat; patet
 autem vasa injecto aërimento, quo arteria
 denigratur, & scisso per longum vena de-
 scu, si hinc inde leviter abradatur Lienis
 substantia, multâ aquâ abluatur; sub venâ
 etenim à latere tam nervorum, quàm
 sub ipsis nervis exilis quedam arteria
 productio, si super extensa comparetur venâ
 na,prehenditur, qua nervorum & vena-
 rum subsequens diramationem, minimam
 hinc inde promit propagines, sicuti in aliis
 vasorum germinationibus contingit: Hi
 jus extremi fines multiplices sunt, & re-
 collecti equinam caudam efformant, quæ
 in equorum etiam Liene levi abrasione pro-
 ceteris observatur. Hi multiplices rami
 ram fines arctè amplexantur, exigua quæ-
 dam

corpora per Lienem dispersa, inferius
 monenda; aliis autem ulterius produ-
 propaginibus, in membranam desi-
 t, quâ Lienis spatia inferius lustranda
 antantur, ceteri arteria fines ad investi-
 em tunicam producuntur, ut patet in
 Eto Liene, cujus arteria aere vel atra-
 nato turgeant. contingit etiam, ut arte-
 rum rami ad peripheriam Lienis deo-
 ti reflectantur versus ejusdem superfi-
 em, & contiguas propaginibus impli-
 tur.

Arteriæ ergo numerosissimæ & insig-
 nis in Lienis substantiam sparguntur,
 arum usus apud varios Anatomicos
 Medicos multiplex est. Andr. Lu-
 tius l. 1. *Histor. Anat.* c. 18. & ex eo
 cutus Lusitania l. 6. *Histor. Med. prin-*
 .4. pag. m. 929. quatuor earum usus es-
 scribunt; quorum primus est, ut pul-
 mone suâ fœculentum expurgent atque
 entque sanguinem: ut enim pulmo
 hem enti refrigeratione, ita splen ex-
 purgatione insigni indiguit. Secundus
 teriarum usus est, ut crassum hunc
 sap-

sanguinem ex venis in substantiam Lienis excidere sollicitent. Tertius, ut Lienis calorem fœculento succo penè obrutum ventilent, ne languescat. Postremus, ut vitalem facultatem Lienis tribuant, *Adr. Spigelius Fabric. corp. hum. l. 8. c. 14.* Lienem quintuplo plures habere arterias à cœliacæ ramo sinistro, quàm venas scribit; hinc omninò credibile putat, in Lienis tumoribus aliisquæ affectibus scirrhis, materiam copiosiore in arteriis quàm venis contineri, & propterea per arterias quoque sæpius, quàm venas evacuari.

Petr. Laurembergius Colleg. Anat. Exerc. VII. arterias Lienis servire tradit (1) validiori sanguinis elaborationi, quam promovent motu suo. (2) calori e corde advehendo, quo maximè indiget Lien. (3) expurgationi serosi liquoris, quo Lien inter cætera abundat.

Excell. Hermannus Conringius l. d. Jang. generat. & motu nat. c. 21. unicum secundum naturam arteriarum Lienis usum facit; nempe sanguinem in Lienem

advehere, quo & coctio aliqua possit in viscere institui, & quod coctionem est passum in venas propelli.

Gothofred. Mæbius Med. Physiolog. c. 16. usum arteriarum Lienis statuit, sanguinem fœculentiozem à corde Lieni, partim pro nutritione, partim etiam pro usu publico adducere.

Et Excell. *Thom. Bartholinus Anat. reformat. l. 1. c. 16.* arterias Lienem habere magnas multasq; à cœliacæ ramo, secus quam hepar cred it. (1) ad vitam & calorem innatum fovendum. (2) ut fortius mutari possit sanguis. (3) ut ad nutritionem sui accipiat sanguinem, & præparet insuper acidum succum cum sanguine arterioso ad se delatum pro chyli & sanguinis totius fermentatione. Nos hanc *Bartholini* sententiam non rejicimus, verùm potius addimus, quòd tantus arteriarum numerus in Liene reperiat, ut eò melius chylus tenuior ac aquosior in ipso in sanguinem commutetur: peculiare fermentum acidum ad appetitum excitandum, chylique in ven-

G

tri:

triculo coctionem promovendam generetur, ac demum singularis tinctura spirituum animalium adminiculo producat, cujus ope chylus in sanguinem coquitur, universa sanguinis massa exaltatur & illustratur, spiritus animales in cerebro, vitales in corde, & semen in testibus ac aliis vasis spermaticis meliori ac feliciori modo generantur, atque demum partes sanguinis feculentiores, tartaro & salibus sylvestribus imbutæ, sed sero copiosiore mixtæ ita disponuntur, ut postea in locis convenientibus, si non unâ vice, crebriore tamen transitu, beneficio circulationis, separari possint. Ut autem melius Lien dicto officio nobili fungi possit, quintuplo plures in eo reperiuntur arteriæ quàm venæ, plures etiam quàm in hepate. Quare etiam à *Cl. Grembsio Arbor. integr. & raios. l. 1. c. 83. de usu part.* Lien vocatur officina arteriosi sanguinis, constans 400. arteriis, nec ullum viscus quàm splenem tantâ arteriarum propagine refertum vidit *Helmontius Tractat. de jure duumvirat. §. III.*

quam

quando viscus Lienis ejusque substantiam attendit, ejus parenchyma esse crurum noviter grumefactum, pelle obdutum, tam multiplici venarum & arteriarum contextu locupletatum censet, ut non sit aliud in toto corpore viscus, quod in subdecuplo totidem arteriis dives sit. Et *Tractat. passiv. decept. scholar. humorist. c. 1.* Lienem tot arteriis divitem facit, ut sibi non habeat viscus par tanta pulsum vitalitate. Et *leb. vate Horn §. 42. Microcosm.* vix alia quam arteriosa vasa Lienem intra se recipere tribuit; ideoque arteriosum viscus *Galenus l. 4. de usu part. c. 15.* & contra venosum *Hippocrates l. 4. de morb.* appellant.

Tanta quoque arteriarum frequentia admittenda videtur, ut magnam illam vasorum implicationem ad continentiam spongiosam visceris carnem faciat. Non attollitur autem à tanta arteriarum copia, tum quòd non in superficiem, sed totius visceris substantiam sint disseminatæ; tum etiam, quòd crasso & contumace sanguine in hoc viscere elaborando hic motus impediatur. Sple-

Splenicâ quoque arteriâ abutitur nonnunquam natura, ad colluviem vitiosorum humorum in canalem Wirsungianum deponendum, ut extra pomœrias nobiliora ad intestina relegetur.

CAPUT XIII.

Lienis venas perscrutatur.

Sequuntur nunc venæ, quas à sinistro venæ portæ ramo, qui splenicus aliàs dicitur, ad Lienem propagari, plerique ferè consentiunt, ipsaque autopsia confirmat. Pauciores tamen ex sunt; hinc etiam ex arteriis Lienis substantia ferè conflata videtur. Splenicus autem hic ramus ante divisionem ex superiori parte producit gastricam majorem, quæ plures furculos ad sinistram ventriculi latus mittit: ex inferiori parte mittit epiploicam dextram ad omentum pervadentem. Succedunt coronaria stomachica in ventriculum delata, & epiploica sinistra, in omentum tendens; pancreæ multis furculis per pancreas quoque disseminantur; postquam verò spleni-

cul

cus ramus hosce furculos disperfit, Lieniadproximatur, & vas breve producit.

Iste verò in bove, damis, ovibus, &c. ad ejus partem inferiorem, quam caudam nominant, quamprimùm tunicam penetravit, delatus, in porosum parenchyma pertusus definit: In homine, juxta effatum *Highmori l. c.* paulò altiùs in substantiam cum furculis arteriæ penetrat, minùs tamen manifestè foraminulentus, nec ita, ut in hepate per parenchyma ejus dispergitur. Et rami hujus insignis tunica, quod observavit *Glissonius Anat. Hepat. c. 45.* in Liene bubulo, quantò ulterius in Lienem progreditur, tantò etiam magis attenuatur, donec tandem vix minima illius vestigia compareant, totoque hoc tractu majoribus minoribusve foraminibus pertunditur, per quæ sanguinem è parenchymate refluxum exhaurit; eademque hæc foramina per parenchyma ad venarum modum ramificantur, etiamsi venæ alicujus tunica nuspiam appareat.

Marcell. Malpighius de viscer. stru.

Star. Exerc. Anat. de Lien. c. 3. longè accurate curatius istum venarum in Lienem ingressum describit ; Et quoniam nullus est Lien, qui minorem involvat suarum partium obscuritatem, quàm est boum, idè exemplo *Higmorei* ejusmodi venarum processum examinandum assumit.

Lienis, ait, vasa in bove membranæ quâdam portione circumducta, venæ scilicet & arteria, & bini nervorum rami unitim interiora Lienis intrant, ita ut antequam ipsum subeant, levi divulsione separentur ; ut autem jam ingressi manifestius pateant, immissis in venam per longum forficibus aperiatur oblongus, & amplius ille venosus sinus ; qui per totum excurrit Lienem ; in diducta hînc inde canali (si fiat sectio in parte graciliori, ubi inter hunc ductum, & anteriorem membranam parum substantiæ Lienis intercipitur) illicò emergit exigua quædam arteria, si præcipuè jam atramento repleta fuerit, quæ cum nervis à sinistris, vel hînc inde excurrentibus per longum exporrigitur, & licet

hæc primò oculos incurrat, & præ cateris proximior videatur, attamen super hanc tenuis quædam & diaphana extenditur venæ tunica, vel saltem ejus vicaria; etenim quamvis in ingressu foramina quædam, & quasi lacinias quasdam in splenici rami tunicis excitatas observemus, quibus ejusdem tunicæ uniri, vel terminari videantur cum Lienis substantia; attamen levi factâ laceratione, seu extremo cultro separatione, vel ipsi etiam unguibus, continuatio hujus membranæ, impensè tamen gracilis observatur per longum ductus, & facillimè etiam negotio à subjuncta arteria & nervis separatur. Unum tamen observatur, venâ hanc propè Lienis ingressum, exterius scilicet, duplici constare tunicâ, in ipso autem limine harum crassiores, & externam excipi ab interiori Lienis tunica, quæ vasorum involucrem efficit, cui arctè hæret, alteram autem ulterius produci. Membrana hæc venosi ductus non tantùm superextenditur in eam tubi parte, quæ excurrentis arteriæ, &

nervos fovet , sed in altera etiam parte opposita, quæ jam forficibus scissa est.

Multiplicia habet venosus hic amplius ductus foramina , dum arteriarum , & nervorum elongatas hinc inde propagines sequitur , ideò necessario ramorum hiatus in patenti trunco determinatis intervalliis observantur ex diametro sibi correspondentes, qui cum in geminatos ramos pateant venosi tubuli ulteriorem progressum exhibent , qui hinc inde utramque sanguineorum vasorum subdivisionibus iterum productis usque ad externam membranam eandem ferè servat proportionem , quam in filice observamus. Aliis ulterius foraminibus pervia est hæc venosa tunica ; nam inter patentia ramorum orificia , multiplicia quædam veluti stigmata observantur, non in ea parte , sub qua excurrunt arteria & nervi, sed in opposita ejusque lateribus. In his licet tunica venosi ductus hiet, & pateat , non tamen comites arteriæ, & nervi rami propaginibus concomitantur ; quod certe miro non caret artifi-

cio.

cio, cū ubique in cæteris animalis partibus ferè semper arteriarum & venarum, quin & nervorum hiatus, & productiones consociantur.

Antequam verò ad venarum splenicarum considerationem ulteriorem progrediamur, illæ cui usui sint, & an amicali etiam consortio inter se conspirent, explicabimus.

Ufus itaque venarum videtur sanguinem perfectius elaboratum é Liene recipere ad cavam, deinde ad hepar & cor iterum derivare. Quem usum etiam agnoscit Cl. *Highmorus Disquisit. de affect. hypochondriac. c. 4.* cum venam splenicam in animalibus quampluribus terminari asserit; quasi nihil aliud agere à natura destinata foret, quàm ut sanguinem à poroso parenchymate ad portas reciperet.

Egrege etiam anastomosisbus inter se coeunt venæ cum arteriis; antequam Lier i se immerferint. *Excell. Thom. Bartholinus Anat. reformat. l. 1. c. 16.* anastomoses has frequentes arteriarum

Lienis cum venis ejusdem, præsertim unam insignem ante ingressum vasorum in Lienem agnoscit: Reliquas in Liene ponit. *Antonida van der Linde in Med. Physiol.* insignem illam anastomosis vasorum in Lienem admittit, eam que excellenter conspicuam esse, quod & citra Lienem fiat, & in majoribus ramis, scribit, qui tamen de aliis anastomosis, quibus frequentissime Lienis vasa coire inter se tam affirmatè (uti loquitur) multi dicunt, ac si vidissent, non immeritò dubitat, cum nullus oculus tam perspicax sit, qui discernere hæc possit vasorum discrimen, ne dicam anastomosis. Interim insignem illam inter arteriam & venam splenicam anastomosis magis æstimat *Jacob. Backius Dissertat. de corde*, probaturus sanguinem à ventriculo advenientem non intrare Lienem, sed cum illo egrediente congregi, quod tamen oculi capere non satis possunt.

Concedit hanc anastomosis etiam *Wesell. Ralsincus l. 6. Dissert. Anat. c. 24.*
quando

quando communionem utriusque vasis duobus stylis explorare jubet, altero per arteriam, altero per venam intromisso, & inter se collidere tunc videbimus.

Peculiare & nobile officium huic assignat *Higlmorus Disquisit. Anat. l. r. part. 3. c. 3.* arbitrans, cum tot arteriæ tribuantur Lieni & multò plures quàm hepatis, necessum fuisse, talem anastomosis rami ejus superioris cum ramo venæ adesse, ut pars aliqua sanguinis, antequam Lienem ingreditur, venæ exhibeatur, ne Lien nimia ejus copiâ oppressus obruatur, & ab officio impediatur. Ad Lienis portas verò hanc inoculationem fieri debuisse scribit, ut solummodo melancholica pars sanguinis introduceretur, purior autem per anastomosis hanc venæ splenicæ, quæ ad portam hepatis defert, amanderetur.

Una ergò præ cæteris maximè videri potest, quæ ante ingressum in Lienem contingit, estque satis notabilis, cum dicta scilicet vena cum arteria comite conjungatur. De reliquis, quæ sunt

in

in Liene, nec veteres dubitaverunt. Quia
tamen elutriationem sanguinis, seu in
carnium poros effusionem seu deposi-
tionem cum Harueo, Pecqueto & Glissonio,
qui speciatim, quod huc confert,
adnotavit lib: de Anat. Hepat. c. 45. Stri-
ctè assumunt, ajunt, has pertulas majori-
bus minoribusve foraminibus, in om-
nes parenchymatis partes dissemina-
ri, ex quibus sanguinem hauriunt. Si-
mili prorsus ratione & arteria per to-
tum parenchyma disseminantur. Propa-
gines usque adeò gracilescunt tandem,
ut oculorum aciem effugiant.

Venis etiam ad Lienem tendentibus
valtulas inesse autopsia docet in variis a-
nimalibus, ut egregiè Cl. Highmorus de-
monstrat, delineationibus curiosissimis
rem maximè illustrans. Sic enim l. i.
Disquisit. Anat. part. 3. c. 3. pag. 65. scribit:
*Vene omnes, quæ à Liene ducuntur in por-
cis, damis, ovibus, canibus, equis aliisque a-
nimalibus conspicuas valvulas in illis ha-
bent à Liene spectantes, quæ rami splenici
ductum à porta ad Lienem penitus ob-*

Stru-

*Arunt. Rogatus verò, num & in homine
ita seseres habeas? Respondet: Non licuis-
se quidem sibi in humano Liene tam pla-
nam instituere demonstrationem, cum ob
membranarum tenuitatem, & in corporis
bus emortuis omnium decidentiam & con-
niventiam, illas à venatunicis discernere
haud potuerit, interim sanguinis fluxum
in omnibus eundem esse, vel hoc in ian vi-
vis brutorum dissectionibus, quam emor-
tuis hominum cadaveribus, sæpius repeti-
tum experimentum probare posse: aperito
ramo splenico in medio ejus inter Lienem
& portam ductu, si versus Lienem ramum
digito compresseris, ab inflictio vulnere pa-
rum & languidè à porta tam in vivis
quàm emortuis sanguis effluit. Si verò di-
gitum tollas, & ad alteram partem sectio-
nis rami splenici versus portam venam co-
arctes, violenter & affatim à Liene effluit;
imò per illud vulnus totam sanguinis mas-
sam in vivis brevi temporis spacio irrucere
videbis; in emortuis omnis qui in Liene &
aorta ad cor usque fluxui aptus est, per
vulnus hoc facile effluit.*

Et ita haecenus de venis splenicis diximus; de quibus nonnulla etiam notatu digna nobis occurrunt. In cadavere, quod Lutetiae dissecandum scribit *Laurentius*, in exiguum corpus glandosum ramus splenicus defuit. *Fabric. Bartolomaeus*, referente *Ioh. Rhodio* in *Manuss. Anat. observ.* 28. Mantuae ramum splenicum, priusquam in Lienem infereretur, ramulum in emulgentem sinistram transmississe observavit. Cujus beneficio melancholicos quandoque per urinas purgari credit. Et *Henr. à Moirichen* apud *Thom. Bartholinum* *centur.* 2. *Epist. Med.* 87. intorta ac simplici gyro circumvoluta vasa splenica vidit.

Ex numero autem venarum Lienis frummosiores ac conspectiores sunt 1. Vena Breve, & 2. Vena haemorrhoidalis. Vena Breve hoc à *Galeno* *σπληνικὴ φλεβὶς* Stomachus venosus appellatur. Hoc vas in rerum natura dari negat *Emil. Parisanus* l. 4. de *subtil. Microcosm. Exercit.* 2. sed ligamentum subtile esse docet. *Spergelius* hoc vas venosum etiam planè negat.

gat, arterioso quippè contentus. *Iacobi Backius Dissertat. de corde* contentus est venis gastricis,

Notum *Hippocrati* hoc fuisse persuadet l. 4. de morb. & 5. Epid. Ubi tamen ut plurimum in statu naturali adest: defuisse tamen aliquando, *Waleus*, *Fontanus* & *Bartholinus* observârunt,

Oritur ex ramo splenico, ubi Lienis parenchymati jam est immersus: sæpius à rami splenici furculo extra Lienis corpus ante vel circa ejus insertionem. Excell. *Thom. Bartholinus Anat. reformat. l. 1. c. 16.* item quandoque hoc fieri admittit. Sequutus tamen *Waleum* ramulum esse annuit venæ splenicæ, qui, ubi ad spatium inter ventriculum & Lienem medium ven. 3. in duos bifurcatur furculos, quorum unus Lienem, alt. ex ventriculum accedit.

Rarè unicum est hoc vas & solitarium, uti scribit *Ioh. Rhodius in Mantiss. Anat. observ. 29.* in corpore quodam va. breve valde amplum observatum est: idque unicum ex vena & arteria; quod plerumque

rumque ex pluribus constructum vena
gastro epiploica nonnunquam incur-
bit.

Utpurimum tres spectantur ; non-
nunquam plures ramuli. Sex à *Rolfincio*
sunt observati. *Veslingius* octo invenit,
& *Ioh. Arnoldus Friderici* Professor in A-
cademia Salana in quadam infanticida
numerosiores.

Resultant interdum à se invicem lon-
gè disjuncti, modò sibi vicini : laterales
ventriculi partes perreptant usque ad
os superius, inter duas membranas, in-
quit *Riolanus*, & interior notis quibus-
dam lividis seu poris est compuncta, la-
tusque sinistrum interioris ventriculi est
nigrius dextro.

Varolius l. 3. *Anat. c. 5.* inferi hos ramu-
los in ventriculi sinistram fedem, & ad
orificium superius pertingere statuit.
Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. c. 9. sin-
strum ejus latus nominat, in quod vasa
breve excurrit, non usque tamen ad su-
perius orificium. *Baehnius in Theatr.*
Anatom. ramum splenicum dividens in
duos

duos furculos, alterum horum sursum in sinistram partem ventriculi, nonnunquam verò versus ipsius sinistrum eructare humorem melancholicum statuit. *Laurentius l. I. Histor. Anat. c. 18.* evenire posse existimat, ut, obstructo hoc canali remeet in ramum splenicum humor ille, & ab hoc nunc in coronariam ventriculi, nunc in hæmorrhoidalem, nunc in mesentericas venas.

Verior via apparet *Vesalii*, cui *Riolana* succedit. Nam quamprimum ventriculo vas hoc breve approximatur, à tunicis hujus absconsum, hinc inde eodem in latere vario modo dispescitur, cumque reliquis à porta descendentibus gastricis confusum anastomosesque faciens progressus sui ulterioris vestigia occultat. Hoc tamen verum utique est, vas hoc magis elatiorem istius lateris ventriculi partem adscendere, sicque ipsum etiam orificium accedere, maxime cum rarius uno, frequentius triplici & sextriplici furculo exiens ventriculum coronet. Non nihil inæqualis sæpius est insertio
hæc;

hæc; & in brutis, ut canibus & ovibus non nihil variat.

Nos ergò vas hoc breve, cum à tunica est abscissum, plurimos emittens ramos, mox fundum, sapius orificium ventriculi sinistrum coronare, ipsam tamen Lienis substantiam in statu naturali non intrare, sed potius, ut ex diligenti autopsia patet, statim intra primam ventriculi tunicam desinere, dicimus. Unus est *Riolanus* ex Nostratibus, qui interior rem tunicam notis quibusdam lividis, tanquam poris compunctam, latusque sinistrum interioris ventriculi dextrum esse nigrius, apertè profitetur, omissi tamen, quæ fidem verbis addunt, observationum exemplis. Conceptus ergò in animo magis quàm verè pervia foramina videntur.

In statu autem præternaturali, aut certo quodam individuo, ventriculum intrare, illique aliquid infundere, nos libenter concedimus. Sic quæ *Ioh. Valverdal* l. 6. *Anat. c. 5.* de Cardinali Cibo, in cujus aperto post mortem abdomine

venæ

vena hæc insignis magnitudinis ad os ventriculi tendens repleta ventriculi cavum repleverat : Item quæ Laz. Rivierius observ. communicat. 6. de Henrico Ruffio laborante nephritide per quadriennium, tandem illâ cessante vomitu crebro & laborioso cum angore & cardialgia : Et quæ in aliquot personis observavit Ioh. Daniel Horstius Manna. ducl. ad Med. part. 1. c. 1. f. 3. pag. 93, adducuntur, sunt ægrotantis Lienis signa & effectus ; siquæ certi nihil, & quod alienum esset à vascis vasorum male affectorum consimilium, evincunt.

Rectè ergò Magnus Conringius l. de sang. generat. & mot. nat. c. 22. de hac re quando discribit, inter modum naturalem & violentum distinguit, & in hoc ex Liene per vas breve effluere aliquid posse concedit, in illo verò minimè. Et sic, quemadmodum ventriculo per vas breve sanguis communicari potest ex Liene ; ita rursus Lienì aliquid communicari potest ex ventriculo. Hoc significavit Hippocrates l. 4. d. morb. quando Lienem

nem sub ægrotantem de potu trahere ex ventriculo, hydropem suboriri, & scro- tum pellucidum evadere scribit. Sæpè aquâ impurâ copiosè bibitâ, Lien eam attrahit, tumidique suboriuntur Lien- nes.

Riolanus observavit communionem vasis brevis cum diaphragmatica sinistra, quæ cavæ soboles est. Et hanc viam esse censet, per quam sanguis melancholicus in Lienosis per nares evacuatur, ut passim legitur apud *Hippocratem*, imprimis 2. *Epidem.* s. 2. ubi *Bioni*, cum ex larga urina nihil subsideret, sanguis ex nare sinistra fluxit.

De vasis hujus usu materia est spinosa, eaque multis Autorum sententiis diversis agitur, de quibus in *Sectione secunda*, ac in peculiari *Traçtatu de Vase brevi Splenico*, Deo adspirante, prolixius sumus dicturi.

Galenus l. 4. d. usu part. c. 15. Item l. 5. d. usu part. c. 4. l. 3. facult. nat. c. 3. acidum succum sive melancholiam acidam per venotum hunc stomachum, vas scilicet
bre-

breve, ad coctionem juvandam in ventriculo eructari putat. *Avicenna can. 1. fen. 1. doct. 4. c. 1.* titillando Oesophagum famem excitare acidum hunc succum etiam fatetur. *Valens in Epist. de motu chyli & sang. itē Th. Barthol. Anat. Reform. l. 1. c. 16.* huic opinioni non repugnant, ratione & experientiâ, quod scilicet nulla pars in corpore magis acescat quàm ipse Lien, satis edocti; idque quod Lien porcinus ventriculi debilitatem ac imbecillitatem emendet, observationibus suis confirmant. Alii fermentum seu sanguinem acidum in ventriculo deponi duabus de causis asserunt, vel ut eum corroboret, vel ut appetitum in isto excitet. Acidum verò nihil generari in Liene acutissimus *Higginsonus Disquisit. de affect. hypochondr. c. 4.* multis argumentis evincit. Alii adscribunt huic, quasi chylum à ventriculo ad Lienem ducat, Quoniam verò vas breve ipsum Lienem rarò intrat, quomodo in illum aliquid devehere, vel ex illo in ventriculum, cum ille non reperiatur per-

pervius, ut manifestò jam liquet, sese ex-
onerare posset.

Macerant ergò se frustra & semper
dubii hærent, qui ventriculo aliquid
communicare Lienem, sive ex illo a-
liquid ex fugere censent. Et hoc non ig-
noravit Dominicus de Marchettis Anat.
c. 3. pag. 16. Sunt, inquit, qui dicunt, vas
breve ascendere ad excitandum appeti-
tum, & quòd ventriculum ipsum perforet;
ego tamen, pergit, in plurimis cadaveri-
bus à me dissectis hanc perforationem nul-
là diligentia observare potui; & licet mi-
hi notum sit, quòd, quando sanguis vomit-
ur per os, hoc proveniat ab aliqua vena,
quæ ventriculum perforat, sed tunc vas
non est in suo esse naturali.

II. Hæmorrhoidalis interna est, quæ,
notante Rossincio Dissertat. Anat. l. 6. c.
24. à ramo quidem mesenterico sive
portæ dextro nascitur, mutat tamen in-
terdum situm suum, & propè splenici i-
nitium oritur. Sic ante ingressum rami
Splenici in Lienem eam esse produ-
ctam scribit Highmorus l. 6. ex cauda ejus

Lin.

Lindannus. Et in cadavere juvenis robusti, uti narrat *Ioh. Rhodius Mantiss Anat. observ. 49. Fabricio Bartoleto* observante, circa rectum intestinum è ramo splenico hæmorrhoidalis interna originem duxit, quæ secus è mesenterio prodit. Idem *Patauii Ioh. Veslingius* in virili cadavere observavit.

Quando verò propè initium Splenici exoritur, tum internè secundum intestini recti longitudinem progreditur, tandemque in podicis membranofam substantiam propaginibus suis inseritur. Jungitur hoc loco immediatè hæmorrhoidali externæ, quæ à cavo hypogastrico ramo oritur. *Hoffmannus* in lib. d. u. su *Lienis* decidere venam hanc saltem ex substantia *Lienis* autumat, nequaquam verò à ramo splenico, antequam *Lienem* ingrediatur. Omnes enim pro bonis viris habet, qui scripserint quod viderint.

Per hanc venam autem hæmorrhoidalem internam nulla expurgatur materia spurca, tam crassa, qualis illa, quæ per
ex-

externam secedit; nihil enim alvo imm
mediatè per venas è Liene communicari
ri potest. Cumulatur verò & colligitur
sæpè hinc materia excrementitia ex unius
verso corpore, & si hinc stagnat ea, vici
tium contrahit, ac plurimorum morborum
mater frugifera evadit; quando
verò evacuatur, desinunt ferè omnia
symptomata, ut multi Viri excellentissimi,
mi, *Rolfincius in ord. & meth. febr. gene*
ral. c. 82. Suvalvius Disquisit. Therap
peut. f. 6. & Ioh. Valens Meth. med. ad
hamorrhoid. nobiscum testantur.

CAPUT XIV.

Lienis vasa lactea indagat.

DE vasis lacteis, an Lienem adeant?
Spinosa est quæstio ac variis diffi
cultatibus implicata. Quoniam verò
ita voluit natura, multa sanè circa Lie
nis usum sunt immutanda. Sed hinc ferè
omnes Anatomici, paucis exceptis, nega
tivam amplectuntur. Ipse lactearum
venarum inventor *Asellius*, qui sanè nul
li operi pepercit, ut quosvis earum ad
itus pervestigaret, nullam tamen, ne mi

nimam quidem de illis ad Lienem pertinere constanter asserit; Cui subscribit etiam Excell. *Thom. Bartholinus Defens. Lact. Thoracic. pag. 25.* Imò notissimum iudicat *Joh. Henr. Pauli Anat. Bilssan. c. 5. pag. 50.* nullas alias vias, præter arterias inveniri, per quas aliquid in Lienem transferatur. Optavit etiam *Hoffmannus l. d. usu Lienis cap. 7.* vias chylum ed deducentes deprehendi; cum verò naturam hinc frustrà sollicitari videret, factum est, ut ad venæ splenicæ cum arteria splenica complicationem confugerit.

Verùm non omnibus contingit adire Corinthum. Nos non semel tantum in canibus, sed ovibus etiam ramulos chyliferos tum à ventriculo, tum à pancreate ad Lienem porrectos vidimus. Chylus, quem hæc vasa vehunt, modò aqueus & tenuis est, ut adeò ex huius distributione minus oculos incurrant. Madent quoque omnia vivi corporis tenui quodam & aqueo humido; itaque difficile quoque est ruptis fibris dignoscere hunc
H, chy

chylum ab alio sero. Tenue porrò per fibras ac venulas non ita transparet, ut lacteum quid aut sanguineum. Et hosce ductus lacteos ad Lienem tendentes ex autopsia nobiscum approbant varii Anatomici & Medici.

Ioh. Rhodius Mantiss. Anat. Observ.
31. Anno 1649. 23. Jan. in fœtu è ventriculo in pancreas plures poros lacteos tendere vidit cum *Veslingio*. Ejusdem Anni Januar. 18. quâ parte pancreas albæ Lienis lineæ inhæret, multa lacteorum ductuum vestigia comparuere; etiam quâ parte ventriculus Lieni incumbit, plures meatus lacteorum ramulorum.

Iohan. Veslingius ad Cl. *Mauritium Hoffmannum* scribit, se in humano cadavere, tum à ventriculo, tum à pancreate ad Lienem porrectos chyliferos meatus observasse, atque hoc etiam anno publicè Studiosis ostendisse. Vid. *Observat. Anat. & Epistol. Medic. à Thom. Bartholino edit.*

Cecilius Folius apud *Thom. Bartholi-*

nium

mem. cent. i. Epist. Med. 62. pancreas, glandulosum viscus, lactei humoris esse receptivum dicit, non ut ipsum hepatitantum impertiatur, sed & reliquis fortasse visceribus. De Liene non dubitat, quandoquidem id fieri per tenuem canaliculum venarum comitem à se sæpius in brutis fuit observatum.

Celeberrimus *Herm. Conringius l. de generat. sang. & motu natural.* de ductibus chyliiferis ad Lienem tendentibus pro more suo laudabili ita disserit: Sineque arteria neque vena faciunt ad illam chyli eductionem, manifestum est, dari aliquod vasorum genus ejus rei gratiâ quidem conditum, distinctum tamen à venis arteriisque hactenus notis. Nempe quemadmodum in mesenterio vena lactea tertium constituent vasorum genus ac novum, ita par est & hîc simile quid reperti. Erit autem valde difficile oculis illud subficere. Certè difficilius, quàm cernere venas lacteas. Quemadmodum enim illæ non videntur amplius, sed oculis sese subducunt, chylo destituta: ita certè & hæc non-

nisi fibrarum effigiem possunt pra se ferro à chylis suis vacuæ. Chylus porrò hic aquosus est & limpidus, cum alter sit lacteus. Ideoque longè minus quoque vasa sua reddere conspicua potest. In ea præsertim multitudine partium madentium, imò maxime, cum & aliæ fibræ pleræque, teste Aristotele l. 3. histor. animal. c. 6. contineantur ὡς τὸ τῆς τῆς ἰχθῆρος. Ad hoc venæ lacteæ per longum spatium eunt: ventriculus verò & Lien adeò nectuntur firmiter & propè, in homine pariter ac brutis, ut quod inter utrumque sit, non nisi rupturâ dignoscas. Factâ autem illâ, cum non possint non vacuari statim vasa, non quidem vivo in corpore, præ membranosarum fibrarum similitudine poterunt dignosci. Quod si cui tamen hæc vasa aliquando apparuerint, illius sanè & felicitas & industria magnam laudem merebuntur. Nec tamen crediderim fore nunquam conspicua, nisi in corpore quodam, in quo minor est ventriculi & Lienis cohesio, quodque non multò post acceptum potum vivens adhuc & spirans aperiat. CII.

Cl. *Laurentius Eichstadius Colleg. Anat. Quest.* 162. hanc Lienis esse actionem & usum censet, ut ex aquosa, partim etiam chyli portione, sanguinem conficiat & elaboret. Licet verò hæ chyli viæ ad Lienis officinam in Anatome valdè sint obscuræ, verissimillimum tamè putat, pancreas in suis meatibus lacteis affinis continere istum chylum, quem Lien attrahat, quique in substantia splenis præparatus per ramum splenicum jecori communicetur, ut in eo magis elaboretur.

Anton. Deusingius Id. Fabric. corp. hum. part. 1. c. 6. §. 12. vasa item lactea quædam à ventriculo immediatè ad Lienem pertingere vidit, aquosioris chyli portionem ad eundem devehentia; nec absolum credit, Lienem per similes lacteos poros ex ipso pancreate allicere aqueum chylum, quamvis ob coloris tenuitatem meatus istos haud manifestantem.

Hier Barbatius, Patavinus, Anatomicus insignis, Dissertat. de sang. & ejus sero

pag. 27. & 28. chyli aquosioris per centoss
ductus ad Lienem delati coctionem in
sanguinem etiam agnoscit, sententiam
suam sequentibus verbis proponens :
*Qua hic aliquis viam, ob diversam Au-
torum sententiam ? Non admitto Henr.
Regi opinionem lib. de fundam. Physic.
quoniam licet inter ligaturam, & ventri-
culum tumeat vas breve, non supra ver-
sus Lienem; hoc minimè ostendit, chylum
à ventriculo ad ipsam ferri Lienem, sed est
sanguis, qui circulaturus, si ligaturâ impe-
diatur, vas prædictum extendit. Conrin-
gio, etiam si non compareant vena la-
ctea, Lienis parenchyma attingentes, satis
est conjectura. Consentaneum rationi
existimat Veslingius Syntag. Anaton. c. 4.
Lienem aqueum chylum ex accubante sibi
ventriculo allicere; quæ sententia maxi-
mè nititur probabilitate; aliquam enim
sanguificationem Lieni non esse denegan-
dum, suadent raritas visceris, vasorum
amplitudo & copia, sic annuentibus Are-
teo lib. de caus. & sign. morb. chronic. A-
phrodisæo in problem.*

Tan-

Tandem non omnem chylum per lacteas solum ad cor, sed etiam ad hepar & Lienem ferri opinatur & urget ex recentioribus *Isaacus Cattierius in observat. Petro Borello communicat.* 18. Ac imprimis *Jacob. de Back Dissertat. de sord. sect. 1. c. 6.* lacteum omnem succum ad receptaculum non ferri, variis argumentis, quæ pag. 143. & 144. videri possunt, demonstrat.

Hujusmodi igitur vasorum lacteorum ad Lienem pertingentium usus erit, chyli tenuioris ac aquosioris portionem ad Lienem deferre, ut ibi vi caloris insitæ quæ constitutionis in sanguinem coquatur; qua de re in *Sect. II.* peculiariter tractabimus.

CAPUT XV.

Lienis vasa lymphatica per vestigat.

Non desunt inter Neotericos, quamvis in re Anatomica oculatissimos, qui Lienem vasis lymphaticis prorsus destitutum crediderunt, inter quos *Thom. Whartonus*, singularis ille

Anatomicus, pro merito colendus, in
Adenographia totius corporis descriptione
 pag. m. 13. Vix autem fingi potest, in quem
 usum liquorem hunc eliciat, nisi in nervos-
 rum. Desunt enim alia omnia vasa, per
 quæ idem absporetur, præter nervos. Nam
 Lympha ductus nulli adhuc per hanc par-
 tem (loquitur de Liene) distributi ob-
 servantur.

Franc. Glissonius in *Anat. Hep. c. 45. pag.*
 § 16. proficitur quoque sese hosce lymphæ
 ductus non vidisse, hisce verbis: Vasa habet
 (Lien) arterias, venas, nervos plurimos,
 et nervosas fibras innumerabiles, lymphæ
 ductus nullos videmus, eosque propterea
 (si qui adsuerint) aliorum oculis perspi-
 catoribus detegendos relinquimus.

Gualt. Charleton in *Oeconom. Animal.*
Exercitat. 9. de lymphæ duct. pag. 178 nul-
 los quoque in Liene admittit lymphæ-
 ductus. Lymphæ ductuum, inquit, duo
 genera constituuntur ab inveneoribus, quo-
 rum alterum eos omnes, qui in abdomine
 sunt, complectitur; ceteros, qui ex artu-
 bus seu exterioribus corporis partibus ex-

oriuntur, alterū. Priores ab hepate, omento, aliisque infimi ventris partibus (Liene unice exceptio, in quo nulli adhuc sunt reperi) ferè omnibus emergunt.

Plures Autores hanc opinionem foventes recitare facilè nobis foret, ne verò simus prolixi, eos missos faciemus, illudque tantùm dicimus, nos non semel vasa illa lymphatica in Liene canis & vaccæ vidisse nec nos tantum ea vidimus, sed alios etiam Anatomicos eminentissimos producere possumus, qui ejusmodi lymphæ ductus in splene oculati observârunt,

Celeberrimus *Frid. Ruysch* in *Tract. de valvul. in vasis lymphat. c. 3.* Lienem vasis lymphaticis scatere fatetur, ideoq; paucis, quo ritu illa investiganda sint, expedit. Aperiatur duabus horis à potu abdomen cujusdam animalis strangulati, aut mactati, ligenturque simul omnia vasa splenica, tam sanguinea quàm serosa (jamjam enim effluit lymphæ vasis) quo facto amputandus Lien sub ligatura (quemadmodum figura demonstrat)

& a.

& afferi seu mensæ imponendus, ut omnia luculenter conspici possint: tum demum trudadur digitis lymphæ ab extremo ligaturam versus, sic vasa in conspectum veniunt copiosissima, per quæ lymphæ nullo modo (nisi adhibitâ vi) reduci potest. Benè tamen observandum (1.) Vasa illa non solum in splenis superficie reperiri, verum etiam in parte interiori arteriam splenicam, nervosque concomitari. (2.) in omnibus animalibus ejusdem generis haud æque copiosa esse. (3.) Lienem humanum non tantâ gaudere lymphæ ductuum copiâ, quantum quidem vitulinus. (4.) Prospiciendum in ligandis vasibus splenicis, ne dilacerentur, aut rumpantur vasa illa serosa seu lymphatica.

Francisc. de le Bœ Sylvius Disp. Medicæ de Lien. & Glandul. usu hæc vasa lymphatica etiam Lienî adscribit, ut majorem cum arterioso sanguine affluentis sericopiam à venis negligenter absorbent & abducant.

Marcell. Malpighius de visib. structur.

Ex-

Exerc. An. de Lien. c. 1. pag. 99. & 100. va-
brū lymphaticorum copiam etiam aliis
Lienis vasis connectit, quæ, ut ait, multi-
lici propagine sub exarata Lienis mem-
brana excurrunt, suisq; conspicuis trun-
cis circa sanguinea vasa, hoc viscus in-
gredientia, ludunt. Mira est istorum
amplieudo & nexus; rete enim, cujus in-
æqualia sunt intercepta spatia, effor-
mant. Contentus humor flavo, & in-
terdum subrufo saturatus colore fluit, &
frequentibus valvulis fulcitur, postre-
moque conspicuis ductibus per omen-
tum deductis in receptaculum irrupit.

CAPUT XVI.

Lienis nervos perspicit.

Nervos habet Lien à sexti paris ra-
mo, nempe à superiore illius plexu
in abdomine propè glandulas renales:
qui ibidem saltem ante ingressum eo-
rum in Lienem arteriis conjunguntur,
quas nec deferunt postea, donec nervo-
sis fibrillis implexi fuerint. Exilem ef-
se hunc nervum voluit *Galenus l. 5. de u-*
su part. c. 10. quem sequitur *Aretæus lib. 1.*

de

de caus. acut. morb. c. 14. ne gravativus dolor, qui aliquando in hoc viscere sentiatur, non sit visceris ipsius, sitque hoc modo insensibile in sanitate viscus.

Hos Lienis nervos potius tunicæ inferi, in substantiam verò non penetrare cum *Vesalio* scribunt *Bauhinus*, *Spigelius*, *Laurembergius*, *Veslingius*, *Bartholinus*, & alii, eum scilicet exilem propaginem è sextæ conjugationis interno ramo, quæ sinistri lateris costarum radicibus exportatur, humiliori membranæ omenti imminuti perhibent, in Lienis potius tunicam quàm ipsius protinus substantiam spargendam. Verùm non in membranam, sed & substantiam spargi eos constanter asserit *Riolanus* argumento sensus exquisitissimi, quo excrucietur Lien. Et *Excell. Blasius* comm. in *Syntagm. Veslingii* c. 4. quando *Veslingius* nervos per exteriora tantum visceris dispergi vult, per exteriora non intelligit tunicam parenchyma tegentem, sed & ipsum parenchyma.

Primus Francisc. Giffonius lib. de Anat.

He.

Hepat. c. 45. aliam de nervorum in Lienem insertionem & usum sententiam proponit. Nimirum adfirmat is, nervos hosce reverâ Lienis parenchyma intrare, & arterias comitari: singulis, ait, arteriæ ramis plures nervorum rami adfuites sunt, ii que diversæ magnitudinis, quorum bini arteriæ trunco utrinque accumbentes, præ cæteris sunt conspicabiles. Nervi isti, quò Lieni propiores fiunt, eò etiam grandescunt magis; idque similiter spatio aliquo, postquam Lienem subiere, iisdem contingit. Adeest in Liene fibrarum nervolarum ingens fatellitium, adeò ut sextuplo minimum reliqua omnia vasa mole suâ superent: nec possunt faciliè distributiones earum in ordinem aliquem redigi. Ubique ferè per totum parenchymatis tractum variè inter se complicantur, ut retis imaginem planè repræsentent. Fibrarum harum fines exteriores Lienis tunicæ, qua gibbum ejus obvolvitur, & qua cavum ambit, interiores fines firmiter adalligantur, Arteræ quidem invicem coherant, digi-

digitorum operâ tamen sunt separabiles. Dictarum fibrarum aliquæ hîc illic manifestè cum ultimis nervorum ramulis uniantur : & licèt minimè verâ ramificatione ab hisce proficisci videantur, connexionum tamen harum ope, necesse est iisdem aliquo modo famulentur; præcipuè quoniam cum aliis vasis nihil intercedit negotiî.

Usam horum nervorum quod attinet, hoc facile creditu est, ait *Glissonius*, eos vel sensui vel motui inservire; est enim Lien sensus omninò hebes, & motus spontaneus planè nullos; ut neutrius horum causâ tot nervi illi tribuendi sint. Atque ideirè nulli insigni usui destinati videntur, nisi quippiam vel ad Lienem adferant, vel ab eodem auferant. Non autem existimandum est, quicquam eorum adminiculo ad Lienem apportari; quoniam neque id huic ex usu fuerit, nec vas excretorium ullum ad est, per quod ingestus humor egeratur foras. Ideoque oportet aliquid è Liene educant, quod deinde in superiorem ab-

omnis plexum transferat, unde potest data occasione, vel immediate per nervos sexto pari connexos, vel mediantibus cerebro, & medullâ spinali omnes totius corporis nervos distribuatur. Tot nervosa fibræ in Liene intertextæ sunt, statuit idem Autor, partim pro usu privato, ut laxum spongiosumque illius parenchyma stabiliant, ne à sanguinis ex arteriis affluentis impetu ruptum diffiliat; partim pro usu publico, quod colligendum exinde, quia nudæ sanguini (parenchyma illud perlambenti) exponuntur, forsan, ut liquorem aliquem ex amne illo ebibant. In quem finem autem, cum nec ipsis usui esse possit, nec vase separatorio donentur, per quod eundem efferant. An propterea necesse est, vasis cujuscumque alterius remaneant. Arteriis verò munifices esse nequeunt, quoniam illæ humori egerendo duntaxat, non autem excipiendo destinatæ sunt. Nec magis venis suam operam accommodant: siquidem istæ sanguinem illum abducunt, à quo fibræ jam dictæ liquorem suum exhauriunt;

Qui si in venas transferendus esset, non opus profectò erat, eundem à sanguine separari. Ideoque nervi soli super sunt, quibus ancillantur. Et profectò magna hinc inter fibras istas nervorumque similitudo intercedit; eoque nomine nervosæ fibræ appellantur. Quia etiam illæ (æ) è, si minus è nervorum extremitatibus oriundæ fuerint, iisdem saltem conjunguntur. Quæ nobis facile genuinum fibrarum harum usum indicaverint; esse nempe nervis auxiliatrices. Et cum actio illarum peculiaris sit, liquorem aliquem è sanguine proliferare, quoniam istum ablegent, præterquam ad fines nervorum capillares, quibus cum uniuntur? Concludit igitur *Autor*, fibras hæc liquorem quendam per Lienis parenchyma delatum elicere, eumque in nervos capillares (quibus conjunctæ sunt) transferre: huncque esse usum Lienis primarium. Quibus, si quid oculi nos docuerunt, addimus majores eos fieri nervos, cum ad Lienem propius accedunt. In homine hoc non ita observare datur, quàm diligentes etiam simus in inquirendo & perscrutando.

Marcell. Malpighius de Viscer. Structur. Exerc. Anat. de Liene c. 3. hunc
ervorum in Lienem ingressum co-
umque distributionē peculiari etiam ac
admirando quodam modo ita describit:
Nervi ut plurimum bini extra Lie-
nem mutuā fibrarum implicatione in-
osculati, mox subdivisi à latere arte-
ria, & quandoque supra ipsam (in hoc
enim est natura lusus) sub vena excur-
runt. In progressu ampli ductus sub-
dividuntur, & ad invicem inosculan-
tar, veluti accidit in thoracico ductu.
Divisiones postea & arteriarum bi-
furcationes sequuntur, ita ut totum
Lienis corpus pervadant. Investiu-
ntur involucro quodam membranoso,
nedum amplum venæ sinum excur-
rentes, sed etiam in reliquo Lienis cor-
pore, ita ut videantur veluti enses va-
ginā conditi, quin & fibrulas reticu-
lariter productas eidem involucro

communicant. Doctissimus Glissonus censet nervorum fines fibris reticulare opus in Liene effirmantibus, & pulsari, ita ut mutuum adsit commercium, ad determinatum revehendum succum à sanguine mediis fibris separatum. Difficillimum tamen censeo, sensuum testimonio hoc firmemus, licet laboriosâ utamur indagine, cum nervus unâ cum sociis arteriæ ramis subdivisus ita gracilescat, ut extrema productione nequeat attingi. Hoc unum observavi, nervum subdividi unum cum arteriis in minimos hinc inde ramos, & cum eadem comite arteria involucro ambiri, quod ut plurimum in portio capsula communis lacinata, & in fibras gracilescens; unde nervus & arteria minima, dum à capsula excidunt fibris involuta, & custoditæ tandem desinunt ad exigua & globosa quædam corpora, quorum accuratio

*storia inferius habebitur; an verò
 rvi ulterius in fibrarum fasciculo
 clusi unà cum fibris in exterius Lie-
 is involucrum elongentur, non sum
 Tecutus.*

Si horum usum perpendimus, variz
 e eo Autorum sunt sententiæ. *Francisc.
 lssonius in Anat. Hepat. c. 45. & cum eo
 Thom. Whartonus in Adenograph.* eos
 umori cuidam fluido nutritio exfugen-
 o & devehendo destinatos esse pro cer-
 o habent. Verum enim verò usus hu-
 asmodi nervorum verus ab hoc *Glisso-
 iano* multum discrepat, ut nobiscum e-
 am *Thom. Bartholinus Spicileg. 1. de
 asis lymphat. c. 3. Highmorus Disquisit.
 e affect. hypochondr. c. 4. Denfingius
 e succi nutrit. comm. nov.* consentiunt.
 ad Lienem enim spiritus animales in
 argiori copia non pro sensu & motu so-
 lum, sed pro singulari etiam tinctura in
 o præparanda ac elaboranda deferunt.
 Et ob hanc spirituum animalium præsen-
 iam Lien exquisitissimos sensus ac mor-
 tus

tus habet; indeque punctiones dolores
ficas maximè lani etiam persentiunt.

CAPUT XVII.

In vasorum Lienis Capsulam in-
quirit.

A Vulsis seu lustratis sanguineis L.
nis vasis & nervis, accuratioribus
ac diligentioribus Anatomicis occurrit
considerabilis quædam membrana,
nullo, quod sciamus, hucusque descrip-
pta, quæ suâ circumvolutione vasorum
ductum involvit, unde commune involu-
crum seu capsula dicitur.

Hæc, ut *Marcell. Malpighius, Anat.*
tomicus certè industrius ac insignis,
viscer. structur. Exerc. Anat. de Liene c.
tradit, exortum habet ab interiori
propria Lienis investiente membrana
quæ in vasorum ingressu reflexa subiun-
trat cavum Lienis, & in tubum effor-
mata concomitatur vasorum in fascicu-
lum intra se collectorum diramatio-
nem. Neque in bove tantum, sed in ho-
mine ipso, ove & simil. evidenter patet
factâ levi Lienosæ substantiæ abrasione

Etiam ejusdem continuatio cum exteriori tunica innotescit. Non ubique similis est suarum partium comparationem cum sub arteria, & nervis, ubi crassus & altius est subjectum Lienis corpus, valde densa, crassaque vigeat, ut tubulos etiam efformet; in parte autem opposita tubi, vel splenici ramus membranæ naturam & structuram ulteriori progressu amittere videtur, retisque similitudinem acquirit; taliter enim crassioribus & per longum sibi que occurrentibus fibris componitur, ut suborta oblonga spatia, & irregularia foramina naturam membranæ obscurant. Iisdem ramis pervia est, ac vena jam descripta, cum venosi sinus & arteriæ per Lienem diramationes sequatur; in hanc desinunt, seu ab hac exoriuntur alii implantati plurimi extremi fibrarum Lienis fines, qui per transversum Lienem excurrentes, altero quidem fine in exteriori tunica radicanter, opposito autem in hanc capsulam veluti in centrum ducti, non diversa ab ea implantatione, quam

quàm in circum volvente membrana
 ximus contingere, propriarum fibrarum
 expansione absumuntur, quin, & ut
 rum fatear, si abrasâ leviter Lienis su-
 stantiâ, capsulæ productionem rimalo-
 mur, vehementer dubitare poterimus
 fibras quàm plures ab ipsa capsula vel
 ramosâ trunco oriri, cum capsulæ finem
 in has fibras absumantur, ut in cæteris
 vasis contingit. Valido hoc involu-
 crum non tantum firmatur vasorum progre-
 ssus, sed arteriæ & nervi præcipuè cum
 cum ambiuntur, inducta veluti vagina
 non tantum in insigni illo ductu, per
 longum in Lienis excurrente. non eadem
 dem in tubum recolligitur, quo arteri-
 rum & nervorum extrema producantur
 & custodiuntur, donec desinant in ex-
 tra illa corpora, vel in membranam ap-
 pellant.

An hoc involucrium sit nervorum sco-
 boles, cò quia nervi, dum ipsius me-
 dium excurrunt, reticularem quendam
 plexum, qui capsulæ immiscetur, præ-
 sunt, dubitari posset; quoniam tamen

utrisque substantiæ modus diversus
detur, & capsulæ arctior est continua-
cum interiori Lienis substantia, idè
detur aliunde petendum exordium.

CAUT XVIII.

*Lienis materiam ac tempus genera-
tionis continet.*

Generationem Lienis nos cum Hip-
pocrate l. de carn. è sanguine consti-
mus. Lien, inquit, hunc in modum con-
stitutus est: cum calido & glutinoso, calidi
eodem plurimum, frigidi verò minimum
mansit, quantum scilicet ipsum glutino-
um cogat, quod fibræ ipsæ in Liene existen-
s constituunt, propter quas mollis & fi-
rosus ipse redditur.

Mollities ergò atque laxitas Lienis à
numero & multitudine fibrarum erit;
ut Vesalius l. c. ait, undecunque in se
convolvuntur: Et propter fibras has
mollis est Lien & fibrosus.

Heurnius in Comm. Zuvingerum se-
quitur addit: Splenis materia calida &
viscosa fuit; testes sunt fibræ, uberrimo ca-
lore

lore agente, minimoque frigore, tanto scit-
cet, quanto satis erat ad coagulationem
brarum, quarum beneficio splen mollescit
& fibrosus evadit. Rara & fungosa est
jus caro pumicis ferè more.

Formationis tempus non adeò cer-
tum nobis est; formatur tamen, ut *Hav-*
vaus in lib. de generat. animal. observa-
vit, cum reliquis infimi ventris visceri-
bus, cumque illis sensim ac sensim incre-
mentum sumit, sicuti etiam ex inspectio-
ne conceptuum innotescit

CAPUT. XIX.

Lienis quantitatem continuam ac dis-
cretam, & primò ejus magnitu-
dinem perlustrat.

Quantitas Lienis est vel continua vel
discreta; ad quantitatem conti-
nuam spectat ejus magnitudo; ad discre-
tam verò ejus numerus; illa Lienis mor-
lem atque proportionem inter se pon-
dere & mensurâ æstimat; hic autem ejus
integralitatem, redundantiam aut
defectum perpendit.

Magnitudo ejus pro subjectorum di-

versitate varia est. Homini, ait *Positivus*, Lienem, si cum aliis conferatur, satis magnum natura dedit, eò ut sanguis defecior fieret, quod non parùm ad sapientiam conferre creditur. Brutorum etiam, ut ovium, simiæ, quadrupedum Lienes ab humanis magnitudine discrepant, ipsius etiam hepatis intuitu. In fœtu exiguus est Lien, proportionem corporis observans.

Riolanus in Enchirid. Anat. nullum viscus in corpore nostro repetiri autumat, quod tam facilè crescat, vel decre-scat, ut Lien. Et celeberrimus *Francisc. de le Bœ Sylvius Disp. Medic. §. de Lien. & glandul. usu* multùm miratur, nullum viscus observari, quoad magnitudinem & figuram, magis variate eodem ipso Liene. Qui amplas habent venas, ut observavit *Spigelius Fabric. corp. hum. l. 8. c. 14.* majores obtinent Lienes, atq; ideo macilenti pinguioribus facilius Lientis tumoribus sunt obnoxii. Majorem etiam existimant iis à natura datum esse Lienem, qui melancholico abundante

succo, à quo copiosius affluente incrementum capere queat. Sæpius tamen etiam in aliis, licet melancholicus humor non peccet, p.n. augetur, quale exemplum habet *Vesalius Fabric. corp. humani l. 5. c. 9.* Qui *Montissellis*, ait, suspensus ad *Patavinas Scholas* in cadaverum peritioria adveetus fuit, adeò grandem exhibuit Lienem, ut modicè admodum jecoris mitteret, & anteriori jecoris parti adnatum anteriori quoque ventriculi sedi exporrigeretur. Lienis ejus substantia sanorum visceris substantia penitus respondebat. Adolescens hic erat candidissimâ & glabrâ cute, minimèque naturâ melancholicus, alioquin valetudinarius.

Variat etiam respectu gentis ac loci. Sic *Frisiorum* gentem ob quotidianum lactis ebutyrati usum magnos habere Lienes, *Antonida van der Linde in Phylolog.* adfirmat. *Spigelius l. c.* eos, qui humidis regiones incolunt, majores habere Lienes adserit, quàm qui siccas. Nonnunquam totum abdominis concavum implevit Lien, ut *Anatomici* ob-

sc

servarunt. Ita, notante *Spigelio*, sæpius fit, ut in summam molem abeat, mireque intumescat, sæpeque ad abdominis usque medium porrigatur, humorum affluxu, quos faciliè ob carnis laxitatem admittit, concitato. Et *Aëtius* Lienem in spleneticis adedò increlescere & distendi memorat, ut interdum longitudine suâ ad inguen perveniat, & latitudine hepar attingat.

Celeberrimus *Rolfincius* *Dissertat. de Hepate c. 2.* Lienem edò majorem, si hepar minus; minorem autem, si hepar majus sit, esse adstruit. Verùm si autopsiam ipsam intueamur, magnitudo Lienis non est tanta, quanta jecoris; homini tamen satis crassus est Lien & magnus, non tam ob humorem, quem frangere debuit, contumacem & ductu difficilem (ut cum *Excell. Thom. Bartholina Anatom. Reformat. l. I. c. 16.* loquamur) quàm ob arteriosum sanguinem fermentativum, quem continere debet: longitudine scilicet fere sex digitorum, latitudine trium, crassitie unius, quâ

magnitudine in nullo alio animali est. Diversatamen, ut jam diximus, est magnitudo pro subjectorum varietate & hominis constitutione. Majorem putant datum esse iis, qui melancholicum seu acidum succum naturâ copiosiore accepere, quo affluente, augeatur facile ob laxam ejus raritatem. Quibus augetur, iis minuitur corpus, & minus floret: Unde *Trajanus* Imperator fiscum appellavit Lienem, quia ut hoc ditiſcente, plebs depauperabatur. Sic Liene augetur, minuitur corpus. Causam hanc adferunt, qui elaborare chylum credunt, quod nimis per ramum splenicum trahat ex chylo hepaticum subtrahat. At cum ea via suspecta sit, alia inquirenda ratio. *Cl. Conringius l. de generat. sang. & motu nat. c. 6.* in magnitudine præternaturali id fieri concedit; alioquin si naturalis sit & legitima, floret corpus cum Liene.

In quocunque statu sit, existimamus, minui corpus, si Lien augeatur, quia acidum sanguinem fermentantem reliquo

ser.

corpori detrahit, & vel in sui nutritionem absumere, si naturaliter major sit, vel non posse præparare & expellere, si magnitudo sit vitiosa.

Habet ergò Lien præfinitam molem, quam si excefferit, patitur sanitatis labem. Crebrius tamen magnitudine quàm parvitate peccatur: minor verò Lien, nisi plus æquo sit parvitas, semper majori melior, sanior laudabiliorque est, ut habet *Aristoteles l. 3. histor. animal. c. 16.* Et *Hippocrates in lib. de loc. in homin.* Videtur magis parvum probare Lienem quàm magnum, cùm auctus ut plurimum sit morbosus. Unde laniones ex viscerum præcipuè hepatis & Lienis parvitate carnis bonitatem dijudicare solent.

Si ergò ad hepatis magnitudinem naturalem Lienem examinamus, sexduplò eo minorem deprehendimus. Multò majorem jecore contrà Anatomici sæpius conspexerunt. Sic *Fernelius l. 1. Physiolog. c. 7.* Lienem mole & magnitudine naturali jecur superâsse, ejusq; san-

guificationem promovisse visum esse
tradit. *Marcellus Donatus Histor. mi-
rabil. l. 6. c. 3.* in nobili foemina Lienem
universum abdominis spatium occu-
pantem invenit, quo tamen non ob-
stante, filios rectè peperit, exactè for-
matus, non sine admiratione omnium.
Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. c. 9. tam-
grandem vidit, ut ventriculum suppri-
meret, & ad hepar pertingens ipsi ad-
natus esset. Item in quodam elephan-
tiasi laborante, quæ nondum penitus
radices egerat, turgidiorem majoremq;
Lienem reperit, in reliquis autem sano-
similem. Et *Prosperum Martellam*,
cum multis annis regio morbo laborâ-
set, & subitò ex bilis in ventriculum mi-
ro confluxu Florentiæ expirâset, jecur
habuisse magnum & durum, & viride
cum molli ingentique Liene scribit.
Quomodo etiam Lienosi cujusdā homi-
nis, *Bello armati* scilicet, insignis juriscon-
sulti, meminit, quòd in corpore ejus post
mortem aperto mollem magnum que ad
modum Lienè, sanissimi jecoris instar co-
lores

ratum invenerit. *Gregor. Horstius tom. oper. med. observ. 4. pag. 442.* Lienem iplo solito majorem in scorbutico, uam secundum naturam esse solet, optimè sanum conspexit, parenchyma coris colore saturatè rubeo, nec non abstantiâ carnosâ referentem. Excessivæ magnitudinis Lien *Fabric. Hildano ent. 2. observ. chir. 47.* est visus. *Columbus l. 15. Anat.* vidit Lienem, exterius cartilagine obductum, viginti: *Georg. Garnerus in observat. propriis viginti tres: Casil. Folius apud Thom. Bartholinum cent. 3. Epist. Med. 63.* quatuor: *Petr. Pavvius Observ. Anatom. 13.* tres: *Schenckius l. 36. Observat.* viginti tres: *Leonhard. Blasius Comm. in Syntagm. Veslingij 1659. mense Jan. quatuor, & 1661.* tres libras ponderantem annotârunt. Vidit Lienem pilæ magnitudine *Bontius observat. 7.* Manûs magnitudine in quodam tabe extincto vidit *Hearnius.*

Excell. *Thom. Bartholinus cent. 1. Histor. Anat. 80.* in splenetici cujusdam anatomie Lienem insolitæ molis, longitu-

dine duarum spithamarum, supra renem
sinistram, ad os usque ischii ejusque ca-
vitatem extensum, & pondus quatuor
libras æquantem observavit. Item *cent.*
4. Epist. Medic. 14. Uxor sua suavissima
post quartanam, aliquot ab hinc annis
magnum Lienem recepit, quietiam tamen
deprehensus est sinistram abdomini
partem universam occupare. An-
tuit animo, & superveniente ictero, o-
mnia conclamata credidit. Sed præter
spem largis evacuationibus bilioferis per
vomitus, alvum & urinam succedenti-
bus, brevi convaluit, ut nec vomitus nec ve-
rigium Lienis exinde superfuerit, &
plurimorum liberorum elegantissimo-
rum mater fuerit.

Et Romæ in quodam vidit à com-
pressione tumidi Lienis constrixis inte-
stinis deglutiendi sublatam facultatem.
Item Cl. Olaus Borrichius apud Thom.
Bartholinum *cent. 4. Epist. Medic. 51.* in
corpore muliebri Lienem quovis bubu-
le majorem, solidiorem & rubicundio-
rem justo observavit, adeo ut colore

& pa-

& parenchymatis firmitate cum corde certaret.

Ipsa quoque parvitas, si nimia sit, peccaminosa habetur, meritòque inde ab Aristotele 3. *histor. animal.* 16. accusatur. Sic in Ferdinando III. sacratissimæ memoriæ; referente *Wolffgango Hoesero in Hercule Med.* 1.3.c.3.p.162. melancholiâ hypochondriacâ mortuo parvus admodum & exiguus fuit Lien. *Salmuthus cent.* 1. *observ.* 21. foeminam Lipsiensem in partu extinctam secuit, quæ, licet aliàs optimâ sanitate in vita frueretur, hepar tamen habuit maximum, & Lienem tam parvum, ut vix pollicem majorem adæquaret. *Riolanus* l.2. *anthropolog.* c.16. *Jacobi Augusti Thuani* celeberrimi istius Viri Lienem vix unicam pondere æquasse dicit. In *Luxemburgica* Principe, quod habet *Conringius* l. *de generat. sang. & motu nat.* c.6. nonnisi vestigium reperi-
tum fuit Lienis, unguis latitudine ventriculo quasi appressum. *Petrus Pavvius observ. anat.* 29. in muliere hydropica aperta. Lienis ne vestigium quidem vidit.

pit. Et observat. 31. in fœmina hydro-
pica post mortem dissecta Liene plam
consumptum observavit. *Vidus Vidui*
Lienem ovi columbacei magnitudinem
superantem vidit. *Andr. Vesalius Fac-
bric. corp. hum. l. 5. c. 9.* in cive Patavino
qui annis tribus carcere detentus, &
tandem nigro arquato in maximis mor-
roribus defunctus, publicæ sectioni ad-
hibitus fuit, Lienem præter cætera mi-
nus crassum latumque & exiguum om-
ninò reperit, & gibbæ ejus parti adi-
pem adnatum, instar candidissimi duris-
simique lapidis concretum. *Galli Sac-
cerdotis Bononiæ in Xenodochio aqua
subter cutem mortui lienem similiter al-
bidum sed exiguum adinvenit. Et Ex-
cell. Thom. Bartholinus cent. 3. epist. Med.
30. in balsamatione cadaveris uxoris
Generalis Sporckii Lienem valde par-
vum & contractum observavit. Simiæ,
teste Fernelio l. 1. physiolog. c. 7. perexi-
guus admodum est Lien, imò ferè nul-
lus. Et Collegium Anatomicum Privatum
Amstel. damense in columbo, Belgis*

een Pagadette, Lienem exiguum inter
hepar & ventriculum collocatum ob-
servavit. Annotat. Anat. pag. 39.

Rationem reddit Aristoteles l. 3. de part.
animal. c. 7. διότι ἐν τοῖς ἐκλείπει
τὸ μέγεθος, οἷς ὀλίγη πείσῃσι γίνε-
ται, πᾶμικρος ὥστε σημεῖς χεῖν.
Id est; Idcirco in nonnullis deficit à ma-
gnitudine, quibus parum excrementi
gignitur, perexiguus est, quasi notæ gra-
tiâ, causamque sic in excrementa vel ab-
undantia vel deficientia rejicit. Verum
enim verò sententia hæc in nimia ma-
gnitudine, ubi copiosior humorum af-
fluxus in culpa est, quemadmodum ex
supra allegatis quibusdam exemplis vi-
dimus, locum habere potest; ast contrâ,
quando vel à primo ortu, vel naturæ
quasi vitio major aut minor evadit, ut
de Thuani & Principis Luxemburgicæ
splenibus Conringius suspicatur, mini-
mè, quem tamen defectum natura in aliis
relarcire conatur; quod egregie in foe-
mina illa Salmuthi, optimâ per totam

vitam sanitate gavisa, nobis ante oculos
ponitur.

CAPUT XX.

Lienis numerum comprehendit.

Titulus iste ad Lienis quantitatem
discretam quoque spectat. Numero
autem non nisi unus in esse Lien solus
naturaliter constitutis: quemadmodum
etiam hepar in homine est unicum; nec
in eo solum, sed & in aliis omnibus ani-
malibus, quibus hæc pars distinctè for-
mata contigit. *Aristoteles tamen l. 4.
de generat. animal. c. 4. Posthinc in anno-
tat. ad R. Columbum jul. Casserius placen-
tinus ap. lob. Schenckium in observ. C.
Bauhinus apud Hoffmannum de usu Lie-
nis c. 10. v. 5. Cabrolus observ. 15. Domi-
nic. de Marchettis Anat. c. 4. C. Gemma
in Cosmocrit. Petr. Sphærius in observ. a-
pud Schenckium geminum invenerunt.
Et Panarolus pentecost. 1. observat. 2. in
juvene mortuo duos Lienes vidit, alte-
rum majorem, minorem alterum. Major
constitutus in superiori hypochondrii
sinistri regione, totaliter à minori sejun-*
ctus

Itus fuit, ut unusquisque suos splenicos habuerit ramos. Quâ ratione id factum, nescit, nisi fortè quis dicat, minorem Lienem majori supplementum fuisse, ut humor melancholicus ab hepate in Lienem pulsus ob angustiam ipsius alteri Lieni minori deferretur, ne fecdans in retrocessione melancholia feculentia suâ sanguinem viventi maximam noxam esset allatura. Similiter *Pentecost. l. observ. II. Presius* inter Romanæ Medicinæ proceres, diligentia & prudentia insignis, nempe se in anatomica sectione Lienem quasi vinculo quodam ita cinctum vidisse, ut geminum repræsenteret, *Panarolo* retulit. Triplicem, alterum alteri superimpositum, propriisque vasis ornatum, magnitudine verò sibi invicem non respondentem *Fallopins l. 4. observat. 8.* conspexit. Et *Cacil. Folius* apud *Thom. Bartholinum cent. I. Epist. 62.* duos, tres, aut etiam quatuor, quod tamen rarissimè accidit, observavit.

Cl. Casp. Hoffmannus l. c. iudicium suum

suum hac de pluralitate ferens: *Cum unus Lien*, inquit, *non sufficit operi, nec necessario sunt plures*. Verum minus rectè iudicat; Unus enim si non esset sufficiens, naturaliter semper plures fierent; jam verò unus operi illi benè peragendo sufficit, nec ope alterius ad hoc indiget; ideò hoc non pro necessario, sed saltem pro lusu naturæ admittimus.

Nonnullis in lobos divisus est notatus. Sic tres viderunt *Bartholinus* & *Joh. Daniel Horstius*. Lobos quoque observavit in scemina *Higmorens*; & *Riolano* bipartitus est visus.

Maurit. Hoffmannus, Anatomicus ille insignis, in cadavere masculino Anno 1667. circa Lienis regionem nigrescentes aliquot glandulas magnitudines aliàs nucis juglandis, aliàs pisi majoris deprehendit. Tam artificiosæ fuerunt, prout in *observat. programmati in Anatomien dicti cadaveris scripto annexis* scribit, ut quis has glandulas spurios esse Lienes sanctè jurasset.

*Antonida van der Linde Med. Phisio-
log.*

Coloq. l. 1. c. 5. art. 2. §. 22. præter omnem
 experientiam & rationes anatomicas
 planè nullum splenem neminem un-
 quam in homine observasse affirmare
 audent; cum tamen omnem Lienem
 prorsus abfuisse Phisici, Medici & Ana-
 tomici observarint. Cadaver, in quo
 Lien desiderabatur, visum est *Aristoteli*
l. 4. de generat. animal. c. 4. Abfuit in pu-
 ella illa *Hollerii observat. rar. §.* Lute-
 ciæ pariter, teste *Laurentio l. 6. Histor. A-*
natom. Quæst. 25. dissectum fuit cada-
 ver juvenis benè habitî & sine Lie-
 ne inventum. Et *Matthia Orie-*
lio Mercatori Antverpiensi, referen-
 te *Schenkio lib. 3. observ. Med. c. de jecore*
pag. 446. & hepar & Lien defuit; at in-
 testina fuerunt carne prædita, solidita-
 te musculos ipsos superante. Sic etiam
Zacut. Lusitanus. l. 2. Histor. princ. Me-
dic. observ. 38. narrat, quòd in fœmina
 quadã tympanite extinctâ nullum hepar
 fuerit inventum, sed loco ejus massa
 carnea ab hepatis regione ad umbilicum
 extensa, quæ pondere suo libras 36. Me-
 dicas

dicas exæquavit. At in nullo homin
cor unquam abfuisse deprehensum ce
Theodor. Kerkringius, Anatomicus ex
ercitatissimus, observat. *Anat.* 11. 17. No
vembris anni 1667. & rursum 28. Apr
lis anni sequentis fœtus secuit, qui Lien
cartuerunt; quod inter septuaginta fœ
tē, quos secuit fœtus, his oblatum est
ni. Id ergò non rarò contingere præ
sumit. Celeberrimus *Conringius* l. de g
nerat. *Sang. & motu nat.* c. 6. monstrat
naturæ affectui hoc adscribit; quomodo
interdum & hepar, & alter pulmo
num lobus aut alter renum desideratur.
Et idem etiam *Cl. Joh. Dan. Majorani*
Chirurg. infus. Dub. 6. §. 18. pag. 167. ap
probat.

In defectu Lienis etiam nonnullis je
cur duplex fuisse notârunt *Cornel. Germ
ma & Fabric. ab Aquapend.* Quo et
tiam pertinet elegans illa *Aristotelis*
observatio: in animalibus, quibus Lien
est exiguus admodum, hepar quasi bifi
dum esse, alterâ ejus parte in dextram
alterâ in sinistram sese porrigente. Ver

ejus aurea sunt l. 3. de part. animal. c. 7.
 οἷς δὲ μὴ ἐξ ἀνάγκης ἔχουσιν τὸν
 πλῆνα, ἀλλὰ πᾶ μικρον ὥσπερ ση-
 κεία χάριν, ἐναργῶς διμερές ἐστὶ τὸ ἡ-
 παρ, καὶ τὸ μὲν εἰς τὰ δέξια τὸ δ' ἑ-
 κατατον εἰς τὰ ἀριστερά τὴν θέσιν βέ-
 βῆται ἔχειν. Subdit mox: eam divisi-
 onem, leporibus quibusdam adeò esse
 magnam, ut bina jecinora habere vide-
 antur. Procul dubio ergò, quando Li-
 en deficit, aut justo est minor naturæ or-
 tu, hepar simili modo magnum quasi &
 divisum est, quò simul & Lienis officio
 fungatur.

Rarissimè tamen planè deest, nec na-
 turaliter deficere potest, præsertim in
 homine, si quidem natura, ut Illustris
 Anatomicus Thom. Bartholinus l. 1. A-
 nat. reform. c. 16. habet, non abundat in
 superfluis, nec deficit in necessariis, lon-
 geque aliud nobilissima ac præstantissi-
 ma ejus actio nobis persuadet.

In brutis quibusdam naturâ sine noxa
 abesse potest, quod de Chamæleone nar-
 rant

rant *Panarolus* observ. *Anat.* pag. 202. & *Thom. Bartholinus* l.c. Reperiuntur præterea alia animalia, quæ vel propter imperfectam coctionem, quæ fermentatione non indiget, Liene carent, vel quibus propter alimenta assumpta Lien est absumptus.

Ita pecora in agro Cretensi propè Cortinam, quoddam copiosiori scolopendrio sive asplenio, quod magnâ copiâ ibi crescit, vescerentur, Lienem nullum habuisse: Illis verò, quæ propè Cnison pascerentur, saluum ac incolumem remansisse tradunt *Vitruvius* lib. 1. de *Architecton.* c. 4 *Plinius* *Histor. Nat.* l. 25. c. 5. *Alexander ab Alexandro* l. 5. *Dier. Genital.* c. 25.

An verum autem hoc sit asplenium, dubitant Botanici, quemadmodum apud *Guern. Rolincium* *Ordin. ac Method. Med. Special. commentat.* l. 9. f. 3. c. 1. & *Guilielmum Rovill.* l. 1. *histor. plant.* c. 4. & 5. (qui præ cæteris eruditè hoc explicat) legimus. Aquæ ferratæ, si assumuntur, idem præstare dicuntur; & ab his, *non*

planè absumuntur Lienēs, magno-
 è tamē iminuantur, dicit *Bonivinius*,
bidit. obs. 105. idq; exemplis animalium
 d fabros ferrarios educatorū demon-
 strat. Et *Cornel. Celsus l. 4. c. 9. de re me-*
 - potui post cibum Spleneticis a-
 am à fabro ferrario, in qua candens
 rum subinde extinctum sit, dari ju-
 t. Hæc enim, uti loquitur, vel præ-
 quē Lienem coercet, quod animadver-
 m est in his animalibus, quæ apud hos
 bros ferrarios educata, exiguos Lie-
 es habent.

CAPUT XXI.

Lienis continuitatem contemplatur.

DE Lienis continuitate non multa
 consideratione digna sese offe-
 unt. Quæ nobis occurrunt, ea paucis
 atingemus. Partes, quas diversimodè
 respicit, sunt ejus tunica, parenchyma
 & vasa.

Tunicæ Lienis continnitas minoris
 momenti est, quàm quæ ad parenchy-
 ma aut vasa illius pertinet. Pars enim
 ipsa minus nobilis est, actionesque & u-
 sus

su ejus indigni sunt, qui cum parenchymatis aut vasorum actionibus & usibus comparentur. Præterea, vasa in tunica tam distributa per exigua sunt; adeo, sanguis per illa nec magnoperè foràs fluere, neque ad partem ipsam affluere copiosè queat: à quorum alterutro periculum aliàs insurgeret.

Tunicæ hujus, continuïtas bifariâ lædi potest; nempe vel ipsarum tunicarum partium ab invicem separatione, vel adhesionis vulsione tunicæ à parenchymate: hoc præterea, tumorem autem malorum posterius plus deinde præparat, nisi fortè à mera inflatone processerit; quippe tunicæ hujus usus præcipuè in eo consistit, ut Lienem ab injuriis protegat.

Continuitas parenchymatis debilis admodum atque infirma est; siquidem substantia ejus friabilis valdè, minimèque tenax existit. Crediderim sanè, parenchyma hoc, si aliorum ope destitueretur, præ cæteris omnibus æqualis duritiei partibus, ægerrimè se tutaturum. Nisi enim membrana à peritoneo orta

sum ardè complecteretur, valaque
totam illius substantiam disseminata,
utrisque passim nexibus invicem co-
lata, eundem firmiter constringerent,
cile profectò, levi alicunde vi illatâ,
in modò renasceretur, sed & frustilla-
m dispergeretur.

Permagni quidem refert, ut paren-
chymatis hujus continuitas servetur in-
egra, quoniam sanguinis motus circula-
s in eo maximè celebratur, & actiones
mobiles instituuntur. Unde liquet, læsâ
quomodocunque parenchymatis hujus
continuitate, cessare illicò cum sangui-
nis motum naturalem, tum actiones e-
iusdem egregias, & sanguinem potissi-
mum ruptis vasis in partium hiatus de-
cubi, fierique illæ noxiam ejus stagnatio-
nem: quæ mala continuitatis parenchy-
matis hujus solutionem necessariò con-
sequuntur: Causæ hujus solutionis pos-
sunt esse vulnera, aut partium Lienis di-
rulliones qualescunque; item contusio-
nes, erosiones, obstructions cum ma-
terix affluxu; de quibus singulis in *sect.*
Usumus acturi.

CAPUT XXII.

Lienis qualitates explanat.

Qualitas Lienis in temperie, collo-
 figura & ejus superficie consis-
 Primas ergò qualitates quod a-
 met, Lien temperamentum habet co-
 dum ac non nihil ad siccitatem declin-
 ob sanguinis spirituosæ copiam; q-
 sententia jam olim Hippocratis l. d. con-
 fuit, cum in Lienis constitutione cal-
 plurimum, frigidi verò minimum
 mansisse scripsit. Et propter
 rituosæ hujus sanguinis copiam
 arteriarum frequentiam magnam co-
 hepate de caliditate contendit.
 Ioris enim sat multum hisce viis Lien
 ingreditur: contrà hepar minus sang-
 nis arteriosæ accipit.

Frigidum tamen statuit Macrobi-
 7. Saturnal. c. 4. Ait enim: Ut jecur
 Ioris, ita Lien frigoris est domicili-
 Causam arbitratus est cum antiquis
 quibus, quòd humores terreos, frigi-
 attrahat, iisque aut delectetur, aut

riatur; quam sententiam etiam ample-
xitur *Riolanus in Anthropograph.*

Mandinn. Anat. c. 15. controversiam
hanc componere hoc modo vult, quòd
cilicet Lien cuti comparatus sit consti-
tutionis calidæ & humidæ; in se verò
pectatus & reapse temperamenti sit
frigidi & sicci propter nutrimentum.

Talentionius verò melius esse autumat,
si dicamus, Lienem calefacere ventricu-
lum ratione fibrarum ex sententia *Ga-
leni*, non ex propria vi. Quod tamen no-
dum non solvit, si de fibris loquatur, par-
tibus exanguibus, quæ frigida corpora
sunt. Si verò fibras has pro ipsis vasis
venis & arteriis cum contento sanguine
spirituoso acceptet, tunc res clara est. Et
deò benè *Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5.
c. 9.* Lienem calefacere ventriculum sta-
tuit, coctionemque juvare suo tùm calo-
re innato, tùm frequentibus, quæ illum
intexunt, arteriis.

In secundis qualitatibus, si naturali-
ter se habet Lien, ex sententia *Hippecrati
l. de carn.* mollis & spongiosus est.

Ni-

Nimirum succosum deprehendit (Schenckius l. c. in quadam malefica, quod capite plectebatur. Interdum induratum scit una cum suo involuero, unde scirrhi exoriuntur. Sic induratum in viri quinquagenario mœcho capitis suppuratione affecto Vir idem Celeberrimus Schenckius l. c. observavit. Georgius Queccius Medicus Norimbergensis, consummatus, in Scriniario quodam iliaco morbo extincto, & post mortem aperto Lienem ex media sui partibus substantiâ quâdam cartilagineâ inchoatum invenit, quam, quoniam negotio à Liene separari potuit, adduxit.

CAPUT XXIII.

Lienis colorem intuetur.

Colore tingitur Lien vario ratione extatum & valetudinum. In fortiori rubeus est, ut hepatis, quia tunc sanguine laudabili & puro nutritur. Rubet quodammodo etiam in adultis. Sic teste Rhodio in Mantiss. Anat. Observ. 26. virculæ duodecim annorum Lien f.

ma

aximus, non minus rubens, quàm jecur. Ex quo colligit, viscus hoc nō semper sanguine melancholico turgere. Et item confirmant *Vesalius, Spigelius, Barolinus, Blasius & alii*. In sanis semper naturaliter rubere *Bauhinus, Conrinus & Spigelius* adserunt. In adultis plerumque spadiceus vel subnigricans est; quitamen color Lienis non est proprius. Rectè ergò *Spigelius Fabric. corp. hum. l. 8. c. 14.* ait; Color in embryone rubeus plerumque semper cernitur, si sana habeat viscera: in adultis ad nigredinem nonnihil declinat, Monstravimus tamen non semel in publico theatro Patavii, Lienem satis magnum jecori ru-
 dine non cessisse, ut propterea existemus, Lienem nigriorem multò hepatis parenchymate, non benè sani hominis esse, utcunque magnitudinem naturalem non valdè exsuperet. Quod si præter naturam se habeat, humoris, quem in se traxit, colorem reprimit, & vel lividus, plumbeus aut cinereus est. *Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. cap. 9.* ex propria observatione

viscus hoc in homine atro quodam
perquam obscuro colore nigricare,
milleque fieri elephantiasi affectis
fert. *Parisius*, ait, in *Divi Lazari* mor-
ferio, & in plerisque superioris *Germani-*
nia agris & alibi quoque elephantiasi mor-
bo affectos vidi nigricantem *Lienis* humi-
ni colorem superficiemque ita exquisitè
ferentes, ac si quis ex *Liene* eos confinx-
set. In morbo *lividus*, *niger*, *albica-*
est. Colorem autem hunc *lividum* *Cel-*
ringius l.c. vitio sæ diætæ, nimio scilicet
potui adscribit. *Thomas Bartholinus*
rò l.c. *Riolanum* sequutus temperame-
to cujusque & caloris varietati hic mor-
tum tribuit. Nos in corpore humore
dominanti multum adscribimus; quoniam
lem enim humorem, testibus *Hippocrate*,
Spigelio & *Highmore* *Lien* continet
sive talem à natura habeat, sive alium
contraxerit, talem colorem induit. *Cl.*
Schenckius Exerc. Anatom. 6. LI. §.
24. *Lienis* carnem præter magnitudinem
& latitudinem quampiam ex-
dentem, rubicundissimam, succoq;

guineo elegantissimo turgidam in pro-
 rectoris ætatis cadavere foemineo de-
 collato & publicè dissecto deprehen-
 dit. Albidum Lienem invenerunt *Ve-*
salius & Ioh. Frid. Träselman apud *Schen-*
kium in *observat. pag. 355.* Cœruleum
 observavit *Thom. Bartholinus* cent. 4.
Histor. Anatom. 10. & cent. 5. Hi-
stor. Anat. 4. In aliis animalibus, ut *Ex-*
cell. Conringius scribit, ne nigrescit qui-
 dem. In cane plerumque ipso jecore
 splendidius rubet, in suis verò & bo-
 bus magis albicat; in calidis brutis ma-
 gis nigricat.

CAPUT XXIV.

Lienis figuram delineat.

Quemadmodum hepatis ita nec Lie-
 ni propria est figura, quasi natura
 de hac, ut *Sebuzius* in *Examin. vulner.*
 loqui amat, parum esset sollicita. Quot
 enim homines sunt, ut verè *Riolanus* in
Anthropograph. scribit, tot sunt Lienis
 differentiæ, aliquando longæ, aliquando
 quadratæ, aliquando rotundæ *Vesalius*
 ergò l. c. Lienem non ex se habere figu-

ram, sed quandam sedis suæ effigiei congruentem, ac perinde ut hepatis à vicinis partibus ipsi impressam obtinere videtur.

Plerumque ejus figura oblonga est, instar linguæ hominis, unde linguosus viscus quibusdam dicitur; foris ad lat. sinistrum & diaphragma gibba non nihil: nonnunquam ob costas impressas habens; latere dextram respicientem concava, ob adjacentem ventriculorum. Ubi per longitudinem mediam, linea quædam alba prominentiis donata, venas & arterias cum omento admittere. Homini crassus magnus & latus, sed brevior, teste *Vesalio*, Lien est; porcis ventriculis ac bobus longior, sed arctior. Pars ejus superior caput, inferior cauda nominatur. Et quemadmodum figure Lienis varia est, ita etiam variaz deproferuntur opiniones. *Hippocrates* cum eo *Cl. Schenckius* Lienem linguæ bubulæ similem faciunt; quæ verò inconcinna videtur, linguam humanam potius refert; lingua enim bubula nimis

lingua & angusta est, sed si in eodem ho-
mine linguam cum Liene comparemus,
debemus similitudinem haud incon-
uenientiam. *Aristoteles l. 1. histor. animal. c. 17.*
Lieni suis comparat. *Riolanus l. 2. En-
cirid. Anat. c. 26. Hippocratem de A-
t. sequutus in homine plantam pedis
humani exprimere statuit. Hoffmannus
figuram ejus latam & triangularem ferè
addit. Et Cl. Marcell. Malpighius
viscer. structur. Exerc. Anat. de Liene
hujus figuram in homine ut pluri-
um oblongiorem & latiore circum-
scribit.*

In brutis diversissima quoque est fi-
gura; partium enim vicinitas mollisque
lienis natura varias impressiones & pro-
uberantias efficit, unde irregularis sub-
stituitur figura; nam aliquando globosa
est, interdum in lobos finditur, & in qui-
busdam piscibus subrotundis eminen-
tis, racemi ad instar assurgit: quod
sem in lacertorum Liene observatur.
excellentiss. *Bartholinus* in delphino
plenem multis globulis constantem vi-

dit. Et *Aristoteles* l. 3. de part. animal. c. 11. in cornigeris rotundum esse Lienem, in multifidis longum, in solipedibus medio ex dictis hisce modo se habere scribit. Interdum etiam rotundus fit Lien in morbis, ita observante *Ioh. Rhodio* Mantiss. Anat. obser. 27. in cadavere Vini ejusdam Lien planè rotundus fuit. Lienem cultri calcearii instar in equo descriphendit *Severinus* in Zootom. Demonstrat. in lupo lucio tricuspidalis figura fuit Lien, veluti *Collegium Anatomicum privatum Amstelodamense* in observ. 1. lect. pag. 42. notat. Interiore facie convexum reperit *Riolanus* l. 2. Enchirid. Anat. c. 26. Sinuosus quidem est interiore facie, verum leviter & pauxillum tantum partim quò commodius gibbositas ventriculi sese accommodet, partim etiam, ut ea regione commodius vasa sese recipiat, similiter ac renes habere convexitatem notamus, ubi vasa recipiunt. Exteriori gibbosus est, scilicet in circumferentia diaphragmatis, seu ad costas spurias, Rarò etiam lobis aliquod

tinguitur, ut *Veslingius*, *Thom. Bartho-*
us, *Ioh. Dan. Horstius*, & *Highmorus*
servârunt.

Cl. Ioach. Tanckius apud *Gregor. Hor-*
um Oper. Medic. pag. mibi 131. in sectio-
cadaveris suspensi invenit Lienem
andiozem, in medio bifidum, hepatis
star, per rimam suam vel fissuram. Ra-
os venarum tres admisit, sub fissura, &
suprema, & in infima parte. Non latior
it, nec tenuior, ut esse solet: sed in
argine vel extremitate circumcircâ ro-
ndior, cum crassitie singulari. Hu-
smodi Lienis figuram apud *Highmo-*
m Disquisit. Anatom. l. 1. part. 3. c. 3. &
iolan. in Anthropolog. depictam habeo-
us. Celeberrimus *Henning. Arnisaus*
ad eundem *Horstium pag. 132.* Lienem
cur repræsentantem & uno pondere
inorem observavit. Lienem tribus
pendicibus præditum in Principe
armstatino infante, hydropico obser-
vit *Ioh. Dan. Horstius in observat. Ana-*
mic.

Præter naturam autem, ac imprimis

laxatis structuræ suæ meatibus, ex copiosa affluente, nec derivata, humorum colluvie, varias sæpius accipit figurasse ex Archangelo (quem citat Thomas Bartholinus *Anat. reform. l. 1. c. 16.*) triangularem, exactè globosam, acuminatam, eminentiis exasperatam, bipartitè scissam: ex Riolo in *Anthropograph. c. 28.* Bauhino in *Theatr. Anat. l. 1. c. 43.* quadratam, cavam, senis septenisque digitationibus fissam: ex Conringio *l. c.* modò longam, modò quadratam, modò rotundam: & ex Mœbio *Med. Physiolog. c. 16.* modò triquetram, modò quadrilateram alterâ parte longiorem. Nec admodum mirum est, fungosam quasi laxamque substantiam, quæque organicæ seu animalis functioni exercendæ destinata non est, luxuriare quandoque, atque in molem fortè inusitatam excrecere; aut ubi fortè compactior existit, luxuriare minus: eandemque pro situ partium vicinarum, quibus ipsa terminatur, variasse figuram. Anserum hepata per scissationis artificium ita possunt dispo-

i, ut in amplam vastamq; magnitudinē
 xerescant. Atque ita Excell. *Thomas
 Bartholinus* *Histor. Anat. 80. centur. 1. in*
 plenetici cujusdam cadavere vidit Lie-
 nem duarum spithamarum supra renem
 iastrum ad os usque ischii ejusque ca-
 ritatem extensum, pondere quatuor li-
 brarum, ac colore vario. Et *Cl. Olaus
 Borrichius* apud *Thom. Bartholinum*
ent. 4. Epist. Med. §1. in fele Lienem lon-
 gum instar Camini observavit. Nullum
 anē viscus est, quod magis suam mutat
 figuram,

CAPUT XXV.

Lienis superficiem circumscribit.

Superficies Lienis, ut *Vesalius Fabric.*
Scorp. hum. l. 5. c. 9. habet non omni ex
 parte tam exactē, ut jecoris & renum læ-
 vis est, sed obscuris quibusdam leviterq;
 prominentibus tuberculis ad eam ferē
 formam, quā elephantiasi morbo insig-
 niter laborantium cutis variē extume-
 scere consuevit. Impressiones quasdam
 à costa habet: eminentiis exasperatur in

cava ejus parte ad securitatem vasorum ingredientium : inæqualitatem comitatur linea obvia ad vasorum ingressum directa. Et hæc superficies tantum , ut cum *Lindano* loquamur , à superficie hepatis differt , quantum sana cutis à cute elephantiasi laborantis.

Superficiem ergò habet Lien , ut egregiè *Adr. Spigelius Fabric. corp. hum. l. 8. c. 14.* scribit , unam exteriorem , quæ costas respicit , & gibba dicitur ; alteram interiorem , quæ spectat ventriculum , & concava vocatur. Utraque lævis est & æqualis , nisi ubi linea recta , prædicta , in sima consistit , quo loco splenica vasa Lienem ingrediuntur. *Ruffus & Hippocrates* aliam quoque divisionem habent ; summam enim partem , caput : infimam , caudam appellant. Quod si ab hac figura discedat , sit triangularis nonnunquam , quandoque globosa ; interdum variis extuberantiis exasperatur ; aliquando in capite est crassus , in eunda gracilis , interdum contra. Illum *Hippocrates* Lienem ac-

livem; hunc declivem appellat, & mentionem injicit 6, Epid. f. 3. 2. 33. Et ita de editione prima satis diximus.



ANATOMIÆ LIENIS

SECTIO II.

Terum Lienis usum in corpore humano certis ac validissimis rationibus itemque innumeris ferè auctoritatibus demonstrat.

CAPUT I.

Veterum & recentiorum Anatomicorum ac Medicorum de usu Lienis opiniones recenset.

Usus & actio Lienis inter Anatomicos & Medicos, maximè tamen recentiores, est pomum Eidos. Et si horum scripta evolvemus, tot opiniones circumferuntur, quot sunt.

The

*Thebarum porta, quot divitis or-
stem Nili.*

Genuinum namque Lienis usum per totius Medicinæ aetatem nondum satis investigatum esse, forsitan nemo est, qui cum Cl. Martino Kergero de Fermentarij. §. 3. c. 2. diffiteatur. Tantis hicce usus Lienis difficultatibus, quod dolendum irretitus est, ut ad eas bono consilio extricandas Parlamenti, seu Concilij Principum ac procuratorum populi Medici convocatione, ut ait Lindanus, opus sit. Veteres artis proceres valdè exercevit hoc viscus, magis tamen Neoterici eos; qui, licèt ab illorum decretis divortium fecerint, ipsimet tamen non satis consentiunt, diversi diversimodè sentientes.

Ordine autem tantorum virorum vota colligemus, nostrumque deinceps adjiciemus; veritatem, quantum fieri potest, in re dubia investigaturi.

Erasistratus, maximus aliàs sui seculi Plinii testimonio, Medicus, haustà duobus procul eadem ab alyis sententiâ, Lienem

rem

in inutile microcolmi pondus iu-
cavit, dum ait: *Naturam timentem*
cubi artis sua oblivisceretur, dum
tui vix concepto jecur in dextris
informaret, in sinistro quoque latere
aliquid molitum esse, & consistentem
eo Lienem jecori opposuisse.

Democritus Hippocratis coetaneus, i-
dem Lienem sine aliquo usu in anima-
um corporibus factum duxit. Splen,
ait, ex adverso (jecoris) jacet, nullum ne-
gotium exhibens.

Ruffus Ephesus l. ii. c. 7. anteceden-
tium gregem sequutus similiter Sple-
nem ἀσπικλον καὶ ἀνέρεον publico
testimonio declaravit.

Hippocrates l. d. nat. hom. t. 3. & l. 4. d.
morb. t. 1. 2. & 3. Item de morb. mulier. t.
37. de usu Lienis hanc sententiam fovet.
Sunt & alii ait, fontes quatuor, à qui-
bus unusquisque illorum scaturit in
corpus. Sanguinis enim scaturigo est
cor, Pituita caput, aqua Lien, bilis
verò, qua sub hepate locum habet.
Trahit namque corpus à cibis potibus-

que in ventrem assumptis versus fontes istos omnem humorem jam dictum simili ad similem per venas eunte. Inter fontes verò hos porosiores sunt caput & Lien. In hoc enim plurima est viarum commoditas. Nunc verò quod ad aquam ajo, si homo multum bibat, trahere ex ventre aquam ad solum corpus, tum Lienem, cujus pars ad vesicam iens emingitur, reliquam Lien accipit, quam ad se facile attrahit, quia rarus atque spongia similis situs est in ventre. Cum verò iterum trahiturus est Lien, omnino expedit aquam illud vetus residuum, quod in Liene mansit, secessisse ad vesicam prius, aut alvum, atque istac exiisse. Per superiora non expurgatur aqua è Liene, nisi quod in vasis est, quæ à bile procedunt; expurgatur verò per alvum aut vesicam. Si verò justo plus traxerit, neque exsada verit, neque venter laxetur, intumescit ex illo Lien.

Plato in Timæo haud dissimilem pro-
fuit sententiam : Præterea affinis ipse
(epati) structura atque sedes visce-
s à lava est, illius gratiâ, ut id mun-
um semper atque purum præstet, ve-
t. speculo parata promptaque semper
fixa spongia. Idcirco etiam, cum qua
puritates propter corporis morbum
cori imminet, cuncta Lienis expur-
ans illa excipit raritas, quippe qui
xturâ cavus est & sanguineus. Hinc
pletus purgamenti magnus & sani-
tus crescit. Rursus cum purgatum fue-
t corpus, diminuitur & in se residet.

Aristoteles l. 3. d. part. animal. c.
communein primò usum, quem o-
nibus tribuit visceribus, Lienì quoque
describit, videlicet, quò venæ, utpote
ensiles, copiâ viscerum sustineri & sta-
iliri ad corpus possint, quasi enim, in-
uit, anchora partibus appense, viscera ad
corpus iaciuntur. Deinde usum Lienis
trivatum docens subjungit. Hepar &
Lien.

Lien adjuvant coctionem alimenti : quia cum sanguinea sint , calidam naturam ob-
 tinent. Et hepar quidem omnibus anima-
 libus necessarium est coctionis gratiâ. Lien
 verò per accidens necessario inest iis , qui
 habent ut & excrementa tum ventriculi
 tum vesicæ. Lien enim divertit & au-
 trahit ex ventre humores superfluos , &
 potest concoquere , quia sanguineus est.
 Quod si superfluitas multa sit , aut pa-
 rum caloris habeat Lien , morbida fiunt
 omnia propter copiam alimenti : &
 confluant eò humores , multis Lienos
 ventres duri fiunt , quemadmodum pleu-
 ritum mingentibus propter subtractio-
 nem humorum.

Autor lib. de respirat. usu, quem
 nonnulli Galeno falsò tribuunt, Aristoteli
 patrocinator, ejus mentem clarius
 explicat, & præterquædam de venis, quæ
 Lienis gibbo inferi censet, nugamenta.
 Lienem ex ventriculo & intestinis con-
 fectum cremorem per venas ventriculi
 ac intestinorum assumere, ac sanguifi-
 cationis organum esse, contendit. E

huius

hic sententia nonnulli etiam Medicorum cum Hippocrate l. 4. d. morb. subscribunt, Lienē, jecore male affecto, nomine jecoris sanguinem elaborare asserentes.

Galenus l. 15. de usu part. c. 15. & l. 5. c. 4. sanguinem in hepate generatum recremento duplici abundare putat; nimirum spumoso, quod ad vesiculam felleam abeat; & fœculento terrestri, quod Liene ceu nutrimentum trahatur. Verba ejus ita leguntur. Lien instrumentum quoddam est, quod purgat in hepate genitos limosos & crassos ac melancholicos succos. Attrahit verò hos per eas venosum, tanquam canalem aliquam. Attrahens verò non rectè versus ventriculum secernit, verùm ipse prius conficit, & immutat cum magno studio, usus ad functionem hanc maxime à arteriis, quæ omnino multæ & magna sunt in toto viscere, & neque temerè, neque fortitute ipsi à natura tributa, sed ut assiduitate metus ac robore caloris nativi à cor-

de in ipsas influentis conficere, contrahere, immutare, atque alterare quædam crassitiem à jecore in Lienem transmissorum humorum. Quicquid autem in convenientem visceri succurrerit fuerit conversum, fit Lienti alimentum. Si quid verò effugerit actionem ipsius nec possit in sanguinem tenuem atque utilem elaborari, & omnino inutile nutriendo existit, id in ventriculum per quendam alium venosum ductum Lien eructat: quod ipsum utilitatem exhibet haud parvam, acuit ventriculum, & cogit in se ipsum, ut cibos exactè amplectatur, retineatque usque dum perfectè cotti sint.

Galenī sententiam sequuti sunt Orribasius, Alexander, Actuarius Theophilus, Meletius, & inter Arabes Avicenna item Fernelius, Reusnerus & Laurentius. Et quidem Reusnerus in lib. de Scorbuto copiosâ oratione probabile facere allaborat, Lienis actionem consistere in coactione serosi sanguinis: à jecore trahi

e Chylo partem crassiorem : à Lienem
 tenuiorem & serosam magis. Rationes
 profert non inelegantes: (1.) Quia ve-
 æ Splenis sunt exiles admodum & sub-
 liores quàm jecoris. (2.) Quia caro
 usdem laxior & rarior carne jecoris :
 roinde humorem appetit tenuiorem.
 (3.) Quia bibentibus aquas palustres ma-
 ni sunt Lienes. (4.) Quia Lienis
 morbis præscribuntur diuretica.

Laurentius verò *Histor. Anat.* l. 1. c. 18.
Quest. 36. Lienem humoris melancholi-
 esse receptaculum opinatur : ad
 quam sententiam magis stabiliendam
 adducit partim multa *Galen*i loca, partim
 etiam argumenta ; eaque hujusmo-
 di : (1.) Quia omne excrementum re-
 quirat receptaculum : at Melancholiae
 nullum aliud receptaculum dari potest,
 præter splenem. (2.) Quia Lieni co-
 lor inest niger, proprius succi melan-
 cholici. (3.) Quia Lien maxi-
 è obnoxius est scirrhis tumoribus,
 etis à melancholia. (4.) Quia splene
 obstructo, humor niger regurgitat in
 ceterum corpus. (5.) Quia succus

melancholicus à Liene mittitur ad ventricululum pro appetitu excitando.

Stetit illa opinio satis diu eruditorum animis tam firmiter radicata, ut non facile avelli potuerit. Consenserunt autem imprimis in eo, succum melancholicum è Liene in ventricululum eructari, alii quidem, per venam è Liene in ventricululum tendentem, alii per proprium quendam meatum, atque inde è ventriculo in intestina, & hinc unà cum fecibus e corpore expurgari. Porro venam illam, aut meatum nonnulli simpliciter in ventricululum à Liene duci scribunt; alii insertionis locum intrepidè exprimentes, illum in superius ventriculi orificium implantari docent.

Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. c. 9. hanc Galeni sententiam in dubium vocat, quando scribit: Nisi multorum metuerem calumnias, quas hætenus non mediocri meo malo expertus sunt nimium graves, hinc mihi argumenta non deficerent, quibus vulgatam omnibusque nunc persuasissimam de Lienis munere sententiam

sam interturbarem. Verum interim ne-
mini non concessum est, Lienem suo calo-
re innato, ac frequentibus, quæ illum in-
vertunt arteriis, ventriculi coctionem
overe.

A Galeni & Laurentii sententia mul-
tū deflectit *Adr. Spigelius* l. 8. c. 14. *Fabric.*
corp. hum. eorumq; opinionē ceu falsam
ejicit, qui statuunt, Lienē receptaculum
esse humoris melancholici, qui in hepa-
tis sanguificatione, tanquam crassum ex-
crementum separetur, (cū tēnue per
vesiculam bilis purgetur,) & ab hepate
ad Lienem demandetur. Quam sen-
tentiam ut omninō falsam demonstret
iste, singula verba accuratius conside-
rat. Et receptaculum quidem esse non
esse censet, cū nullam observet con-
ditionem eorum, quæ conceptaculis ex-
crementorum propria sunt. Nec enim
avitatem habet, inquit porrō, ut bilis
vesicula, intestina & cerebri ventriculi,
nec humorem continet hujusmodi, cu-
jus receptaculum esse dicitur, cū in sa-
lis Lien purissimo sanguine semper sca-
teat;

neat; nec propè est ad locum, à quo
crementum haurire dicitur, sed potius
è regione situm: nec tandem locus est
per quem commodè extra corpus excre-
mentum illud pellat, cum potius in di-
prema imi ventris regione, ubi nobiliss-
morum viscerum sedes est, sit locatus.
Quis autem humoris melancholici con-
ceptaculum sit, quòd nullam cum ipso
observet proportionem? Omnium
nim consensu melancholia in minima
quantitate gignitur, & tamen Lien ve-
culâ fellis, cæterisque excrementorum
receptaculis multò est major. Quod
melancholia illa in hepate generetur
sit, ut non pariter statim ex hepate tra-
hat, ut folliculus fellis, aut per quas vias
immediate ad Lienem ducitur. Quod
per splenicum ramum dicatur ferri
quàm absurdum id erit, naturam non sta-
tim ad intestina deduxisse, sed prius ad
Lienem, ut in ipso conservetur, cum ve-
utraque ejusdem sit brevitatis, & in eorundem
modum præterea inde futurum sit, ut
melancholicus hic humor omnem san-

in nem splenicorum valorum contami-
et. Quare *Spigelius* per arterias me-
raicas lutosam chyli portionem dedu-
ad Lienem potius statuit, ut ibi in san-
ninem coquatur.

Iosephus Quercetanus Medicus &
hymicus olim præstantissimus in *tetr.*
aviss. capit. affect. communem *Galen-*
rum sententiam manifestius relinquit,
sumque Lienem fermento satis affici
pressis docet verbis: In Liene quidem
si acetum sanguinis, natura liquida, non
riem terrestris (quod de melancholia na-
rali dictum velim) ingeneratur: nuspiam
men crassum & feculentum quid ali-
nam illius partem propriam occupat:
ia per totum ejus spongiosum corpus dif-
nditur, ut sic corpus ejus hoc humore aci-
& acri perfusum, tanquam fermento, in
ram & spongiosam naturam attolatur,
in pane videmus fieri, qui fermento ma-
ratus attenuatur, ac levior ac spongiosior
dditur, cum secus futurus esset gravis,
nsus & ponderosus, si eo destitueretur.

Franciscus Vlms, Pictaviensis Gallus

adacius à Galeno divortium facit, expressis
 que verbis in peculiari & pereleganti
Libello de Liene docet, recipere splenicum
 chylum ex intestinis, exinde sanguinem
 conficere, qui deinde cordi, (ut ex
 sanguis arteriosus, & spiritus vitalis re-
 boraretur) per arteriam splenicam & di-
 vortam communicetur.

Emilius Parisanus cum *Vlmo* consen-
 tit; in eo autem tantum differt, quod splenicum
 guinem aquosum in Liene paratum
 cor pro refrigerio & humectatione
 duci credat.

Carolus Piso verò in *præfat. oper. de E*
de morb. ex serosi. colluv. ort. profitemur
 sanguinem arteriosum omnem per
 prorsus in Liene, non autem præparatum
 in corde demum perficiendum; ex Liene
 enim pulsu deduci in omnes corporis
 partes. Per vas breve quoque & per
 nas gastricas & epiploicas serosum
 potulentum humorem ex ventriculo
 Liene statim exsugere existimat. Et
de la Chambre Tract. de Digest. Liene
 conficere spiritus in usum abdominis
 bitratur.

asp. Baubinus Theatr. Anat. l. i. c. 43
 andem Lienis sanguificationem defen-
 t, verum sanguini in eo confecto alium
 tribuit ulum. Statuit nimirum, san-
 guinem istum e crassiore & terrestriore
 chylo præparatum cedere in nutrimen-
 tum tum ipsius Lienis, tum ventriculi,
 coli, omenti & mesenterii per venam
 lienicam emissum; ejus etiam partem
 equam in proximas arterias rapi, in a-
 rteriam mitti, ut sanguis calidior tempe-
 retur & spiritus in eo nimis mobiles
 quod ad ingeniorum constantiam plu-
 mum faciat) remorentur, partemque
 crassiorem, quæ sit ineptior, ut in bonum
 nutrimentum mutetur, partim in ventri-
 culum (ut appetitum excitet) partim in
 venas hæmorrhoidales, interdum in
 portæ truncum, aut in arterias spleni-
 cas, ut ex iis ad renes abeat, effundi.

Baubinum hac in parte unanimiter i-
 tantur *Varolius*, *Platerus*, *Jessenius*,
Joffmannus, *Sennertus*, *Laurembergius*,
 & alii. Ac imprimis *Laurembergius*, qui
colleg. Anat. Exerc. VII. §. 13. & 14. ita

L scri-

scribit : Superest vera & genuina Lien
actio, quam Hippocrates, Plato, & post
Aristoteles scriptis professi sunt, scilicet
Lien confectioni sanguinis incumbit, no
minus quàm jecur (scilicet merito ven
ram, carne secundarias operæ illuc conf
rente,) quia utriq; huic visceri similis str
ctura: utrique, inquam, parenchyma, va
circumfusum: Utrique vena & arteri
plurima: ex utroque vena eunt ad intesti
na abducentia chylum: Virarumque v
narum eadem substantia, insertio, &c. U
traque eodem prorsus liquore scatent: Eas
ob causam Aristot. diximus paulo ante
Lienem appellasse νότον ήπαρ, sicuti Hi
ppocrates eundem dixit ήπαρ αείσπορον
Plato ήπατος εκμαρτέον. 2. Quia Lien
affectus τήν αίμαίνωσιν proximè & im
mediate ledunt. Dum verò tam Lien
quàm jecur sanguificationi incumbunt
non id polindiscriminatim faciunt & abs
stata lege: Sed Lien operam suam locat v
sceribus plerisque infimi ventris, ventricu
lo, intestinis, omento, mesenterio, pancreati
sibique demum ipsi. Jecur reliqua cohor
partium corporis.

Hermann. Conringius lib. de sang. generat. & mor. nat. existimat Lienem ex ventriculo interea, dum chylum ex solito cibo conficit, & antequam functâ operationi illius concoctione, pylorus aperiar ad chyli confecti in intestina protrusionem, attrahere ad se non nihil chyli operationis ejus, qualis solido è cibo præparatur, sed liquidioris & potulenti; non lactei, sed magis aquei ac limpidi; non per pylori viam, sed per peculiare vasorum genus ac novum, & quod ipse non redit, fore unquam conspicuum, nisi in corpore quodam, in quo minor est ventriculi & Lienis cohesio, quodque non multò post acceptum potum vivens adhuc ac spirans aperiat. Chylum istum potulentum, ait porrò, in Liene in venis lacteis per hepar dispersis respondentibus, tum in ramulis venæ splenicæ, cum quibus istæ fortassis uniantur, ab intero chyli calore, excitato & roborato à visceris calore à corde accepto, & sita partim in carne sanguinea, partim in ipso sanguine concoqui quâdam simplici mu-

tatione in sanguinem humidum & frigidum, & quia non separentur recrementa quædã scilicet in Lienis isthac coctione, impuriorem ineptumque nutritioni, nisi alibi perficiatur. Quam perfectionem ut consequatur, statuit rursus, emitti illum sanguinem omnem ex Liene, & per venam splenicam unã cum aliquo sanguinis arteriosi accepti per anastomosin illam ante Lienem, deferri primùm in venam portæ, atque inibi cum sanguine venoso, ab omento, pancreate, ventriculo & colo intestino regurgitante commisceri; qui tùm simul pergant ad hepatis, dubio procul uberius elaborationis gratiã.

Henr. Regius lib. de fundam. Physic. cap. 10 eandem cum *Conringio* opinionem fovet, sanguinemque è chylo crassiore in Liene coqui, & deinde ad hepatis amandari statuit: in eo solummodo differt, quòd chylo non cœcas è ventriculo ad splenem vias ponat; sed vas breve ad eum summum accommodatum existimet.

Joh. Veslingius Syntagm. Anat. c. 4. sanguis

nificationem quidem Lienī tribuit, a-
ueum chylum autem, nec per lacteas,
nec per venas arteriofasve, sed per po-
ros obscuros lacteis similes ē pancreas,
t & ex ipso ventriculo ad eum duci, i-
que coqui, alterari & in sanguinem
mutari putat.

Riolanus in Enchirid. Anat. existimas
plenem limosum sanguinem attrahere
ad sui nutritionem, inde serum quod-
dam peculiare fermentativum per arte-
as splenicās effundere in ventriculum,
cū bibulum sit ejus parenchyma, per
venas elicere & emungere superfluum
quorem ex ventriculo, ut melior fiat
actio.

Albertus Kyperus institut. physio. l. 8. c. 3.
lienem sanguinem à corde transmissum
quantulum immutatum aptum face-
re, ut fermenti ad instar mutationem
chylī in sanguinem promoveat; & ita
mutatum per ramos venę portę versus
hepar mandari statuit. Et *Institu. Med.*
l. 6. c. 19. Lienis officium esse putat, fer-
mentum aliquod elaborare, quod ad he-

par deductum ejus operationem facit
litet.

Cornel. ab Hogelande Histor. Oecon. Animal. peculiarem sanguinis nimis subtilis deorsum à corde missi fermentationem in Liene ponit, quod pluribus argumentis probat, & tandem concludit : ipsum Lienem sive ejusdem substantiam purum ac perfectum esse fermentum, cujus actione & functione sanguis in salutarem corporis nutritionem, spirituum generationem fermentetur ac præparatur.

Anatomicus illustris *Thom. Bartholinus cent. 4. Histor. Anat. 51.* Lienis usum esse sanguinem acidum depurare, & fermentum pro totius incolumitate præparare, autumat. Et *l. 1. Anat. Reformation. c. 16.* sententiam *I. Valai* ex antropologia certa ratione depromptam verissimam judicat. Is cum in vivis dissectionibus tantum humorum motum per venarum portum splenicum ad Lienem observaret, certò concludit, non esse vero simum vel melancholiam ex hepate, vel chylo

per ramum splenicum ad Lienem ferri,
quare nec Lienem melancholicum reci-
pere ab hepate excrementum, nec ex
melancholia chylove in Liene sangui-
nem fieri. Sed contrà animadvertit sem-
per, omnem sanguinem ex Liene & ce-
lenter satis, & satis validè continuè ad
hepar deferri, ut & illum ex vena hæ-
morrhoidali, vase brevi, & aliis venis,
quæ ramo splenico junguntur. Nullum
autem humorum motum esse ad Lie-
nem, nisi per arteriæ cœliacæ ramum
splenicum: quare Lienem aliunde natu-
raliter non accipere materiam quam im-
mutet, quàm ex arteria cœliaca: putat
autem verosimile esse, sanguinem ulte-
rius perficiendum à cordis calore dissol-
vi, & ubi is à corde adigeretur, per arte-
rias cœliacas in Lienem, non totam il-
lam sanguineâ massam retineri à Liene,
sed ut vesica fellis tantum bilem, ita Lie-
nem partem sanguinis acidam capere,
quam possimus melancholiâ appellare,
non aliter ac destillatione chymicâ se-
regari è rebus spiritum acidum vide-

mus : illum acidum humorem perfici à
Liene, à quo Lien nigricans & acidus sem-
titur. Hanc acidum humorē permisceri
postea sanguini in vasis & chylo in ven-
triculo, & eos reddere tenuiores; quare
obstructo Liene crassos in corpore hu-
mores coacervari, non quòd crassi à Lien-
e non trahantur, quos nec in eo natu-
raliter licet invenire; sed quòd Lien at-
tenuantem illum humorem acidum nec
queat sanguini chylove communicare.
Hujus acidum humoris, quicquid ad nu-
tritionem ineptum est, id cum sero per ur-
inam excerni; facile enim talia acida, ut
acetum, spiritus sulphuris aquæ miscen-
tur, qui & acidus humor possit destil-
lando ex urina iterum elici. Quatenus
ergò Lien acidam sanguinis partem ex
corde trahit & mittit præparatam ad
mesenterium, ut reliqua pars ab hep-
ate elaboranda fiat purior & illustrior, patet
est quodammodo locum habere ante
quorum opinio, statuens, Lienem esse
rursus sedem. Etenim animalia alacriora
ph

plus splenis habent; salaciora plus jecoris;
 placidiora minus fellis; timidiora plus cordis;
 magis vocalia plus pulmonis &c. Unde illud:

Cor ardet, pulmo loquitur, fel commovet iras,

Splen ridere facit, cogit amare jecur.

Antonida van der Linde in Med. Physiologic. de egregio ac nobili Lienis usu ita scribit: Lien accipit à corde per arteriam splenicam, unà cum sanguine ipsum nutrituro etiam sanguinis reliqui omnis excrementum crassum & terrestre, cum copia seri officio suo quatuor defuncti. Deinde ex utriusque partibus melioribus, in rete ejus verè mirabili exactissimè mixtis, & veluti circulatione quadam plusquam perfectis, efficacitate caloris, quem propter viscositatem suam substantia acerrimum retinet, quodammodo coquit atque elaborat melancholiam verè dictam. Ter-

tiō melancholiam hanc per venam splenicam à se emittit in truncum venę portę, inque eo affluentis ab intestinis chyli cum refluyente ab dominis & venę portę annexis visceribus crasso exatissimam mixtionem fermentationis quādam, seu digestionem procurat & efficit, ut longē breviori tempore eo operā faciliore chymus fieri ex utrisque illis ab & in hepate possit. Et *Method. Med. Physiolog.* l. 2. §. 27. Lienis officium facit ad limum ē sanguine accipiedum & reddendum sanguini convertendum in fermentum,

Jacob. de Back Dissertat. de corde sec. 2. c. 2. in hunc solum usum & finem Lienem existimat fabricatum, ut scilicet sanguinem, quem copiosē à ramo arteriæ celiacæ (& præter sanguinem nihil, neque ab alia quapiam parte quicquam) accipit, per raram & spongiosam suam substantiam percolatum, portam deponat, ut ibi, unā à reliquis viscerum nutritione revertente chy-

hymum paucum respectu affluentis sanguinis suâ copiam diluat. Cui tanta necessitas videtur, ut, cum, obstructio Lienis, sanguinisque motu inhibito, chylus non aptè diluatur, corpus extenuetur à depravato nutrimento, Lien verò, restagnante sanguine in maiorem & molestem increascit molem. Item c. 6. pag. 142. & 143. causam reddit, quòd præter tantam sanguinis diluviem, à viscerum nutritione refluui, & Lien animal non averit, quòd per spongiosum parenchyma filtratum, ab arteriis acceptum sanguinem tam liberaliter largitetur, in non alium finem, quàm diluendo chylum, ut à pancreate & mesenterii glandibus contaminatū, rubroque colore tinctum, in splenicis & mesentericos ramos effusum, probè diluat, & salutarem hepati deducat.

Excell. Thom. Willis Diatrib. de Fermentat. c. 5. pag. 28. & 29. Lienis officium egregiè admodum declarat, cum ita scribit: *Dum sanguis per arterias advenit, Lienem subit, ipsi detrahatur*

quiddam, scilicet particula limosa et
 terrestres, quae sunt cruoris veluti fe:
 & caput mortuum; ut hac ratione re:
 ra cruoris massa, à succo melancholico
 seu atra bile liberetur: quae in Liene
 non secus ac flavabilis in hepate secer:
 nitur: quare Lien plerumque est az:
 aut lividi coloris, propter faeculentia
 illic depositas. Cum verò hic succus
 in Liene repositus non sit omnino inu:
 xilis, sed ob copiam salis fixi sit valde
 fermentescibilis natura, non statim
 utibilis, in cloacam rejicitur, sed ulter:
 rius in Liene coquitur; & exaltatus
 in fermentum abit, quod denuò sangui:
 ni omnissum, ejus motum & volatili:
 sationem promovet. Quare ut sangui:
 guini per arterias Lienem ingresso, ali:
 quid detrahatur, scilicet crudus me:
 lancholicus succus: sic eidem per venas
 refluxo, aliquid continuò additur, scilicet
 per idem succus coctus, & in fermentum

ti naturam exaltatus. Non secus ac
chymici inter destillandum, ut liquor
optimus fiat, partes subriles & spirituo-
sas, à capite mortuo destillando segre-
gant, ac dein ipsi reaffundunt; atque
hoc opus toties repetunt, donec caput
mortuum crebrâ destillatione volatile-
setur, & liquor secundum omnes suas
particulas ritè exaltetur. Quod hu-
iusmodi sint Lienis usus, indicium est:
Quia viscere hoc malè affecto, sanguis
aut fermentescit nimis, uti in affecti-
bus scorbuticis & hypochondriacis:
aut si Lien sit obstructus, vel scirrho-
to tumore obsessus, sanguis idoneâ fer-
mentatione destituitur, atque hydrops
cachexia vel tympanites inducitur.

Highmorus Disquisit. Anat. l. I,
lib. 2. c. 3. existimat, sanguinem melan-
cholicum per arteriam cœliacam à cor-
de transmissum in Liene fermentari ac
separari, sanguinem q; separatum, quan-
tum

tum ad sui nutritionem inserviat, appo-
nere, & quod relinquatur sanguinis
purioris & ab excremento melancholi-
co defæcati, per substantiam ejus perco-
lari, & ramo splenico emandari: à quo
in portam & jecur, atque inde per venu-
larum anastomoses in cavam, inde ad
cor rursus deduci, ut calorem & spiritum
de novo acquirat, atque purus ab omni
excremento exinde ad aortam pro par-
tium nutritione impellatur. Succum au-
tem melancholicum, ait porro, in Lienis
substantia separationem inter fibras ejus
hoc modo fieri existimamus. Quum
sanguis Lienis porosam substantiam, un-
dique ab arteriis in illam effusus per-
transeat, facultate quâdam innata (quam
nulla alia pars habet) succus melanco-
licus, qui antea cum sanguine confun-
debatur, fermentatur, congregatur, parti-
culæque homogeneæ uniuntur: quæ
sic unitæ naturæ nullo modo, nec in nu-
trimentum illius domari aptæ, si multæ
non sint, unâ cum sanguine ulterius pro-
gredi potuerunt; sin verò in majore

con-

congregantur quantitate, ut natura modestiam afferant, eam ad expulsionem quoque loco & modo irritant. Ideoque insurgens natura ad proximam aut magis convenientem evacuationis viam & locum eas propellit; nunc ad menses, & per alvum, aut hæmorrhoides; &que à ramo splenico per venas minutas in pancreas; unde per ductum illius in duodenum effunditur; nunc ad renes, cum in aorta maximâ quantitate naturam facessunt, & per urinas: nunc per arterias minores ad habitum corporis & per sudores deponit. Atque hinc excrementorum separandorum modum naturalem æmulatur artificialis ille medicamentis purgantibus, &c.

Item *Disquisit. Med. de Melanchol. Hypochondr. c. 4.* Lienem ventriculi gratiâ formatum esse dicit, ut calore suo, quasi foco supposito, concoctionem promoveat; ut motu inter particulas ciborum inde oborto, facilius per fermentum stomachale partemque liquidam seu potulentam fiat salium solutio.

Et

Et præter hoc ejus officium , alium
quem gratiâ fibrarum nerviq; insignico-
ris adeptus est, usum assignat. Nempe ut
per nervum , mediantibus nervosis illis
fibris in Lienis parenchymate compli-
catis, sanguis à spiritibus animalibus ad
nutum passionum commoveatur & agi-
tetur. In sanguinem namque agere spi-
ritus animales, ruborem illum in faci-
verecundè erubescens ; priapismum
statim ad rerum Venerearum, vel ad spec-
tum, vel auditum, extremarum frigidi-
tatem , & sanguinis retractionem in ti-
more, abunde testari dicit.

Franciscus Glissonius Anat. Hepat.
c. 45. planè novam de Lienis usu fovet
opinionem, putatque fibras copiosiores
(quas nervorum propagines esse autu-
mat) in eo humorem aqueum imbibe-
re, & deinde humori alimentario in ner-
vis communicari, fluidior ut reddatur.
Verba ejus sunt : *Liquor hoc pacto*
(Lienis) nervis imbibitus, non vide-
tur esse ipsemet succus nutritivus, sed
humor

umor magis aqueus, quique succo illi
vehiculi loco inserviat. Quippe jam
antea à nobis dictum est, sanguinem
nutriendis partibus ineptum esse: ad-
eque minus verissimile est, alimen-
tum propriè dictum è sanguine prole-
fari. Quin etiam rationi magis con-
uum videtur, nutrimentum verum
organis mitioribus ac benigniori-
bus (quàm Lien deprehenditur) parti-
bus accedere, ut mox diceretur amplius.
Quare potius existimem, liquorem
hunc esse merum vehiculum, quod suc-
cum verè nutritium fluidum conser-
vet, & à coagulatione teneatur, quò fa-
cilius in corpus totum distribuatur.
Namque probabile admodum est, ali-
mentum verum facile concreescere &
coagulari, nisi ab admixto tenuiore ve-
hiculo in fluore perpetuo conservetur:
hæcque hanc coagulandi aptitudinem
partibus nutriendis promptius adha-
ret,

ret, easdemque vel adauget vel reficit.
Quamobrem credibile est, fibras ne-
vosas jam dictas, partem sanguinis
tenuissimam, mitissimam & aquosissimam
maximè elicere, ut vehiculi vice
præstet. Idque vel exinde porro con-
firmatur, quoniam sanguis è Liene
egrediens solito crassior conspicitur, ac
eoque verisimile est, eundem, dum per
enchyma illius perlaberetur, de tenui-
ore sua substantia nonnihil amisisse.
Quamprimum fibræ istæ (ut diximus)
partem aliquam tenuis mitisque illius
humoris è sanguine epotârunt, præ-
dam omnem in nervos capillares
conjunctos indeque in ramos eorum
maiores transferunt: qui cum arteriis
associantur, iisdemque quasi capsula
circumstruant, fit, ut caloris, pulsationis
que earum adminiculo liquor ille
nervorum plexum glandulis renali-
bus aditum facilius traducatur. Vbi n

Solum confluxus nervorum eidem expiando par in promptu adest, sed Organum, impuritatibus, è Liene foruitò affluxis aliò derivandis idoneum eidem adnectitur; nempe glandulae renales, quas renes suscenturiatos vulgò dicimus.

Paracelsus lib. de Mod. Pharma-
and. tr. 1. Lieni præ aliis visceribus propriam digestionem tribuit, emunctorium autem ejus, ut & cordis, obcurum esse ait: & nunquam quemquam fuisse, qui Lienis emunctorium purgaverit, alio in loco adfirmat.

Ioh. Baptista von Helmont, miras de Liene habet opiniones: 1. fermentum acidum in eo parari & ventriculo inspirari ait. In Tract. de jure duum vivat. Splen inspirat fermentum digestivum stomacho & est vegetationis exordium. Ibid. §. 13. Splenis proprius est stomachus, multiplici arteriarum tortuositate admirabilis, quo Li-

en sibi soli coquit; sub qua digestionem minimus error si irruat, splen digerendo cessat, debitaque stomacho exteriori fermenta denegat. Tract. de Seat. anim. §. 26. Reperi solenem in ser viri pro fermento stomachi, ejusque solo coctore & directore: idcirco amborum viscerum conspirationem decrevi vocare duum viratum. De Sextupla Digest. §. 20. Splen namque in stomachum, vas amplum sui fermentum inspirat; neque enim Splen cibos immediate attingit.

II. Imaginationem in eo locat. Tract. de Concept. §. 1. 2. Quamobrem in Liene imaginativa primorum conceptuum, eaque inde ad stomachum duum viratus socium, etiam & hinc facile ac primordialiter in altero sexu ad uterum distenditur. Splen ergo tam focus est idearum conceptarum in imaginativa hominis, quam ipsius

chei. Ibid. § 52. est itaque dis-
 rsum conceptusque à Liene, tan-
 quam viscere omnium maximè san-
 ineo, plurimisque arteriis opulento
 aët. de duum virat. Concludam igitur,
 etiam in vitis scholis, imaginatio-
 nem quandam sanam atque integram
 habere Spleni, si Vitata, atque præ-
 cordialis melancholia inde promana-
 re.

III. Coctionem sanguinis in eo ad-
 titit l. de Iure duum virat. §. 49.
 externo Liene scilicet, tanquam cu-
 na cruor, sanguis matris recoquitur
 vihi suspensionem facit exactioris san-
 ificationis, quam hepatis Lien hac
 parte concitat, ut scilicet recoctus
 eodem cruor, tantuplici arteriarum
 rtuositate, velut stomacho, ad eor re-
 pcedat.

IV. Somnum & insomnia à Spleno
 ducit. In Tractat. Duum virat. §.

42. sic ait : Somnus est affectus splenis, huicque à deliciis. §. 38. Splen ergo suis per intervalla intentus reflexibus, deliciis, & lassatorum remediis, tertiam vitam parsem nobis per somnum furatur.

V. Venerem in eodem viscere quærit, ipsumque sperma in testibus quærit, sed beneficio Splenis coqui credit. De dum virat : §. 42. Ut sanguinis purificatio incipit in venis mesenterii tanquam in gecoris stomacho, sic spermatis coctio fit in testibus à Splene. Tract. de asthm. & tuss. §. 58. Lien Veneris nidus.

VI. Asthmatis causam radicalem Lien ponit, sic tamen, ut pulmo non prorsus culpâ careat. Tract. de asthm. & tuss. §. 58. & 59. observavit Lienarescentes, dum præ senio Lien defungi incipit, anhelare ; itemque digitos stupore subinde à Splenis in commodis.

Franc. Osuvald. Grembsius, perseverantissimus ille Helmontii Imitator, Liber. integr. & ruinos. l. 1. c. 8. de usu pan-

eandem demirando Lienis usu cum
montio, fovet lententiam. N. 13. ita
more suo Helmontiano differit :
Lienis usus est; ut vitale fermentum
ricet, ex insito spiritu salino balsa-
mo; hoc si in debita dosi in stoma-
m inspiratur, fiunt appetentia, si
exorbitat, tunc morbi. N. 14.
en insuper spiritum inebriantem è
macho suscipit, & hic spiritus omni-
etabili innascitur, & per artem
fermenti vi è concreto disligatur.
Splen regulariter se habet, statim in-
na proditur; in ea quippe nubecula
tinetur. Splen insuper propriam
et digestionem, quâ vitiatâ, conge-
tur producta, ex quibus fiunt tu-
res. N. 15. Splen est fons idearum
ceptarum in imaginativa hominis
ipsius archei, & hic archeus suas
et peculiare imagines, quas anti-
thias vel sympathias nominasse
inde est. Quamobrem Helmon-

eius ponit originem imaginativa et
 primorum motuum in splene, in qua
 omnium perturbationum energia pos-
 sita est. Et tandem N. 30. Somnus in
 splene fit, qui floret suis conceptibus
 quoties sopit alterius alimenti delicias
 suos conceptus, tunc dat ab opere in-
 ducias, & fit somnium, quae induci-
 si minus perfecta fuerint vel nimis
 sollicitudine perturbata, tunc profusa
 somnia confusa. In somno tamen non
 semper anima discretrix vis sopita est
 quia aliquando somniamus in angustia
 nos mingere.

Illustris Germaniae Anator-
 cus & Medicus Guernerus Rolfin-
 d. 8. consult. Medic. 3. p. 713. Quod
 sanguis purior & Spiritibus generan-
 aptior conficiatur, Lienis hoc officium
 esse, ait, Chylum in venis axillaribus
 teratum, in dextro cordis sinu ferme-
 taliter solutum, In pulmonibus & fin-
 stro cordis ventriculo in novam

antiam redactum, & coctionis vim
 quo modo expertum, cum ad ejus re-
 ionem mediante circulatione perve-
 erit, feculentiores & terrestriores par-
 es extrahere, amplius coquere, & quæ
 abundant, per arterias & ductum pan-
 creaticum ad intestina & renes dedu-
 ere.

Cl. Ioh. Theod. Schenckius Exerc. A-
 at. 6. l. 1. sect. 2 c. 24. Lienem sanguifica-
 e scribit de secundâ ratione eatenus,
 natenus à corde, quod principium san-
 uinis est, *ὡς λεύμα* super fluitatem
 & *ὡς ἑλέ* & prioris, id est, ejus quod è
 hylo in sanguinem ab ipso essentialiter
 transmutatū erat, terrestriorem & cras-
 iorem, quæ melancholiæ nomine indi-
 citatur, unâ atque cum absolutè dicto u-
 li *μέλλοντι τροφῇ*, tum igneis, terreis
 & aqueis tenuioribus *πείλωμασι*
 liis per *τὰ οἰκεία ὄργανα*, arteriæ de-
 cendentis ramum videlicet splenicum
 recipit, transmissam dissolvit, attenuat,
 nit, iterumque per venas ejusdem co-

M

gno-

gnominis dimittit, ubi postquam cum
 reliquo in ventriculo & intestinis re-
 fluo adveniente venoso fuit mixta he-
 parque ingressa, tanquam ἀντιπαρα-
 κή ἐπαμφοτερίζων illius, edomitis se-
 paratisque inibi iterum biliosis serosiss-
 que obviis, cavam ascendit, inque cor-
 τῆς δὲ ὁλῆς τεύχεως ἐνεργᾷ revertitur.

Celeberr. Gothofred. *Mæbius Medic.*
Physiologic. c. 16. totam massam sangui-
 nis, crebriore circulatione à natura im-
 stitutâ, tandem Lienem transire dicit
 vel partem quandam sanguinis in Lien-
 ritè coctam & fermento isto specifico
 imbutam in regressu ad cor, juvare to-
 tius massæ sanguineæ fermentationem
 ut recrementosa partes ad separatio-
 nem disponi queant. Et quicquid *K.*
perus de usu Lienis dixit, quod sangui-
 nem à corde transmissum immutet, &
 aptum faciat, ut deinde fermenti insti-
 chyli in sanguinem mutationem pro-
 movere queat: istud potius adfirmat
 eo, quòd nimirum sanguis in Liene
 peculiari modo coquatur, fermentetur

leinde tota massa sanguinea eo fermento infecta conceptum fermentum conuuet, quo excrementa ita disponi queant, ut in locis convenientibus segregari possint.

Anton. Deusingius Id. Fabric. corp. um. part. 1. c. 6. Nequaquam Lienem melancholicum succum ab hepate recipere, ut neque chyli portionem, quam laboret, à trunco portæ admittere tractat: sed proprietate substantiæ suæ ac vi inflamenti inter plexus residui fermenti imbuere massam sanguineam per arterias advectam, sicque præparare eandem ad spirituum vitalium faciliorem egressum in corde futuram: quamvis per præparandum ac venam cavam ad cor detrahatur.

Francisc. de le Bœ Sylvius Anatomist. & Medicus longè exercitatissimus, Disp. Med. 5. de Lien. & Gland. usu arbitrat. sanguinem à corde per arterias Lienem delatum ibidem spiritibus animalibus continuo eodem confluentibus commixtum, magis magisque cum

M 2.

ip[s]is

ipsis permisceri & digeri, atque sic in-
tincturæ aut fermenti sanguinei essen-
tiam exaltari & plusquam perfici.

Excell. Leonhard. Blasius Comm. in
Syntagm. Anat. Vesling. c. 4. humorem
mercurialem à massa sanguinea in Lien-
e segregari censet, qui dein eidem suo
modo iterum commixtus, beneficio
venæ splenicæ, portæ & cavæ cordi red-
ditus, ex eo ad ventriculum aliasq; par-
tes cum sanguine per arterias deduci-
tur, ut fermenti naturam habens co-
ctionibus, segregationibus, alterationi-
bus humorum variis in partibus cele-
brandis inserviat. Accipere autem Lienem
suam materiam à corde per arte-
riam splenicam; nihil omnino ipsi ac-
cedere per ejusdem nominis venam, et
quòd contrarium humorum motum
à Liene nempe ad hepar, per hanc fieri
notaverit. Nec venæ brevis h'c aliquam
utilitatem esse, utpote quæ Lienem non
attingit, sed sanguinem à ventriculo
splenicam venam reducit, quò sic con-
stituatur.

Mi

Marcell. Malpighius de viscer. stru-
ctur. Exerc. Anat. de Liene c. 6. relictis
varius de Lienis usu cogitatis, tandem
peculiarem succum in Liene generari,
novamque ex hujus mixtura in sanguine
subsequi constitutionem verisimile pu-
tat, quâ bilis facilius exalteretur, & in je-
core separetur. Hanc energiam in san-
guine adhuc conservari opinatur, ita ut
illum cor cavam & pulmones subit, totâ
massæ chylo lymphâ & aliis peculiaribus
fermentis ditatæ, eandem vim im-
primat, unde virtute etiam hujus celebratâ
fermentatione, & nobili illâ in pulmo-
ribus & præcordiis miscellâ, singula
tribus sanguis ipse instruitur pro nutri-
tione, sensu motu & fermentorum pe-
culiarium reparatione, exaltata, & li-
beriora ita conserventur, ut occurrenti-
bus consimilibus structuris excepta faci-
le separentur sub debita, v.gr. saliva, su-
coris, succi pancreatici, nervei, & simi-
um formâ & hac ratione necessaria
anguinis compages principaliter spleni-
bus hoc succo foveatur.

Gualt. Charleton, Medicus & Anatomist
cus celeb. in lib. suo singulari de Scorbuto
c. 6, art. 13. haud improbabile judicat, san-
 guinem, dum per diffuxile ac bibulum
 visceris hujus parenchyma trajicitur, at-
 tenuari, in rivulos propè innumeros
 quin & minutiores moleculas diffingi
 (aquarum more per manicam *Hippocra-*
tis transmissarum) adeoque præservari
 à coagulatione, cui naturâ suâ pronus
 est, maximè post emensum tam longum
 à corde iter. Hoc enim auguratur par-
 tim ex immensa multitudine, mira quæ
 implicatione fibrarum, quibus univer-
 sus splen stipatur; partim ex ingenti nu-
 mero arteriolarum, in quas arteria splen-
 nica mox ab ingressu suo dispergitur
 quasque pariter in minimos hinc inde ra-
 mulos subdivisus nervus comitatur: ut
 utrisque adjunctas, & per totum Lienem
 dispersas glandulas, ab accuratissimis
Malpighio luculenter descriptas, tacite
 prætermittat. Quippe vix fieri posset
 sibi videtur, ut tot, tantasque viarum
 angustias sanguis periret, quin sim-

in minutissimas guttulas comminuatur.
 Quæ omnes rursus coeunt in rami
 plenici venosi alveum, conceptamque
 enuò fluxilitatem retinentes, quod iti-
 eris reliquum est, facilius & citra coa-
 ulandi discrimen conficiunt.

Atque ita præcipuas præcipuorum
 utorum de usu Lienis sententias addu-
 imus, quas omnes ordine examinare
 obis & tædiosum esset, & Lecturis mo-
 stum. Consultum tamen erit quod-
 am de hoc negotio brevium, quæ in
 plurimi consentiant, & quâ differant,
 exhibere, ac incertos ordines data vota
 edigere.

In primo quidem ordine habentur
*Democritus, Erasistratus & Ruffus Ephe-
 us*, Lienem nulli negotio à natura desti-
 atum, sed turpi otio deditum esse de-
 rnenes,

In altero ordine offenduntur ii, qui
 de viscus quidem alicui usui mancipâ-
 nt, diversis tamen modis. *Hippocra-
 tes & Plato* ipsi humoris aquosi; *Aristo-
 tes* alimenti & humorum superfluo.

rum; *Galenus* & *Laurentius* succi melancholici coctionem; *Quercetanus* humoris acidi fermentationem; *Vesalius* fomentum pro ventriculi coctione; *Villanius*, *de la Chambre*, *Bauhinus*, *Varolius*, *Platerus*, *Hoffmannus*, *Iessenius*, *Spigelius*, *Sennertus*, *Parisanus*, *Reusnerus*, *Carolus*, *Piso*, *Veslingius*, *Laurembergius*, *Conrinx*, *Regius*, plurimique alii, sanguinis chylo coctionem; *Hogelandius*, *Villanius*, *Bartholinus*, *Schenckius*, *Rolfincius*, *Deusingius*, *Mæbius*, *Backius*, *Sylvius*, *Blasius*, *Malpighius*, *Charleton*, & alii sanguinis fermentationem; *Kyperus* sanguinis e corde transmissi aliqualem coctionem pro chyli fermentatione; *Higbomus* sanguinis melancholici corde advecti fermentationem, succi melancholici separationem; *Lindanus* sanguinis excrementi crassi & terrestris eum copia feri quasi defuncti suo officio e corde adducti elaborationem, chyli in trunco venæ portæ fermentationi in servitutam; *Glissonius* separationem per nervos pro succo nutritio diluendo

Paracelsus peculiarem digestionem, *Helmontius* & *Grembsius* fermenti pro-
 entriculo præparationem, sanguinis
 coctionem, imaginationem, *Venerem*,
 omnium, & nescimus, quæ alia insomnia
 tribuunt.

In tertio ordine observantur dissiden-
 ses opiniones de loco, ex quo ad Lienem
 educatur alimentum, seu alius coquendus
 locus. Is autem est *Hippocrati* & *Ari-
 oteli* *ἡ δὲ* venter (quam vocem alii
 interpretantur de cavitate ventris, in qua
 alimentum continetur, qualis est ventri-
 culus & intestina) *Galeno* & *Laurentio*
epar; *Plmo*, *Banrhino*, *Platero*, *Hoffman-*
n, *Varolio*, *Iessenio*, *Spigelio*, *Sennertio*,
anrembergio, & aliis intestina; *Conrin-*
o, *Reusnero*, *Pisoni*, *Regio*, *De la Cham-*
e & aliis ventriculus; *Veshingio*, ventri-
 culus & pancreas; *Kypcro*, *Highboro*,
indexo, *Hogelandio*, *VWillisio*, *Barihols-*
o, *Rolsincio*, *Schenckio*, *Backio*, *Deusn-*
o, *Mœbio*, *Sylvio*, *Blasio*, *Malpighio*,
arletoni & aliis cor.

In quarto ordine nobis ante oculos

ponitur locus, ad quem, id quod in Liene fuit coctum atque elaboratum, abbeatur. Eum *Hippocrates* vesicam & alium; *Galenus* ejusque sequaces, ut *Laurentius* & alii ventriculum pro appetitu excitando; *Baubin*, *Platerus*, *Hoffmannus*, *Varolius*, *Iessenius*, *Spigelius*, *Reusnerus*, *Sennertus*, *Laureimbergius*, & alii ventriculum, intestina, aliasque hypochondriorum partes pro nutritione *Vimus*, *Parisanus*, *Piso*, *De la Chambre*, *Helmontius*, *Grembsius* & alii cor; *Coringius*, *Regius*, *Kyperus*, *Highmorus*, *Lindanus*, *Vallisius*, *Baribolinus*, *Rolfincius*, *Schenckius*, *Mœbius*, *Backius*, *Sylvius*, *Densingius*, *Blasius*, *Malpighius*, *Chariton* & alii hepar constituunt. *Glisson* diversam ac peculiarem præ ceteris nervis in Liene repertis amat opinionem, uti antea diximus.

CAPUT II.

Cogitata Medicorum ac Anatomicorum quorundam præcipua circa Lienis usum enunciat, eaque examinat.

PRæcipuas præcipuorum Anatomicorum ac Medicorum de usu Lienis opiniones in superiori capite adduximus, quas omnes ordine examinare nobis & tædiosum esset, & Lecturis molestum. Antequam autem ad verum Lienis usum nos convertamus, cogitata Medicorum ac Anatomicorum quorundam non levia circa Lienis usum enuntiata ventilabimus, ut nostra sententia, quam concepimus ac pro stabili firmamento habemus, eò purior, clarior ac illustrior reddatur.

Certè Lienis usus hæcenus inter eruditos fuit polum Eridos; de eo enim tot opiniones reperiuntur, quot ferè sunt Scriptores Medici. Hamatosin olim tribuerunt quidam Lieni, ast de viis admodum dubii fuerunt. Nonnulli enim
per

per vas breve venosum ejusque ramos
 aquosiores chylum Lienem sugere cre-
 diderunt. Verum vas illud breve num-
 quam fuit candicante succo repletum.
 Adhuc interdum non inseritur in Lienem,
 sed ramus est splenicæ extra illum
 ac semper suo sanguine turget. Quod
 itaque à vase illo provenit sanguinis, in
 in splenicum ramum profluit; unde non
 datur in Lienem regressus.

Cl. *Joh. Dan. Horstius* in hoc casu qui-
 dem venam splenicam substituit, sed in-
 vitâ experienciâ & venarum officio.
 Liene & arteriis omnem sanguinem ac-
 cipit, nihil reddit splenica vena, unde
 gata in vivis versus Lienem impletur.
 tumet ex *Walai observatione*, sed ver-
 sos hepar inanitur. E ventriculo nihil
 præter chylum tenuiorem ac aquosio-
 rem per peculiare suos ductus lacteo-
 ad hoc viscus amandatur; nulla enim
 lia vasa in homine immediatè cum
 communicant. Ramulus arteriæ ec-
 diacæ ad ventriculum sanguinem defer-
 timore omnium aliarum arteriarum; no-

erò revehit. Ramuli venæ portæ à ventriculo quidem ad truncum ejusdem sanguinem à nutritione superfluum reuocant; sed ab isto tronco nihil ad Lienem abit, verum potius sanguis è Liene ad eum quoque accedit, & ita mixtus ad hepar pergit. Et licet verum esset, quod ramuli venæ celiacæ simul portionem potûs & cibi subtiliorem vel spirituosiore à ventriculo acciperent, quod quibusdam videtur verisimile, nihil tamen ex eo, ut antea dictum, ad Lienem, sed solum ad hepar veniret; cum omnis sanguis è venâ portæ ex hypocondriis ad hepar amandetur, non vice versa.

Nec admittenda videtur *Henr. Regii* opinio *lib. de fundam. Physic.* quoniam licet inter ligaturam & ventriculum teneat vas breve, non supra versus Lienem; hoc tamen minime indicat, chyli à ventriculo per vas breve venosum ad ipsum ferri Lienem; sed est sanguis, qui circulatur us, si ligaturâ impediatur, vas prædictum extendit.

Hinc

Hinc etiam Cl. *Jacob Backius* *Dissertat. de corde sect. 2. c. 2.* an aliquid à ventriculo in Lienem deferatur, asserere arduum judicat : scit existimare viros etiam graves & non contemnendi judicii portionem chyli tenuiorem sese insinuant in tunicarum ejus poros (simili modo quo imaginantur admitti ab intestinorum membranis & venis mesaraicis tenuè, quod post egressum è crasso residuo expressione separatur) & unà cum sanguine remanente per venarū gastricarum ramulos in Lienem duci, ibique ex arteriis copiosissimis in venas transeuntis sanguini misceri, & à calore ejusdem Lienis subactam, deinde per ductum splenicum, cum hæmorrhodiali in venam portam & hepatis confluere.

Hæc cum obscura sint, neque satis manifesta, iis adhibere fidem, aut contrarium dicere non audet; tunica ventriculi tantum videtur impedita emittendo humorem ad coctionem requisito, ut suspicetur duobus contrariis motibus, è tunica poris in capacitatem, & è capacitatem in tunica

ca poros, præcipuè dum chylican-
am adhuc in eo hæret, uno eodemque
tempore inservire non posse.

Nihil etiam probare ait, quòd venæ,
quæ in Lienem feruntur ligatæ, in ani-
mali vivo, versus ventriculum intume-
scant; hoc enim omnibus venis ligatis
est familiare, detumescere versus trun-
cum, distendi verò eis ligamen. Quare
hic? Venæ enim gastricæ in ramum
inseruntur splenicum, & quidem in Lie-
ne adhuc latitantem, sed Lienis substan-
tiam, qui per eas mittitur sanguis, non
attingit. Confunditur tantum cum ex
eo egrediente, & cito motu, sine mora
in portam, diluendo chymo, è glandibus
mesenterii ibi concurrente, fertur.

Præter vas breve, etiam per venas ga-
stricas & epiploicas serosum & potulen-
tum ex ventriculo statim exiit à Liene
existimârunt *Reusnerus, Carolus Piso* &
alii, qui ignorârunt motum humorum in
hisce venis. Utraque vasa exonerant
se in ramum splenicum, & tùm recto du-
ctu ad hepar amandatur sanguis, nec.

obstantibus valvulis, ad Lienem regreditur.

Haffmannus & Spigelius per arterias mesaraicas lutosam chyli portionem ad Lienem deducunt, ut ibi in sanguinem coquatur. Qui eadem culpâ tenentur. Arteriz enim sanguini ad mesenterium deveniendo destinatz sunt, quod ex ligaturis oppidò manifestum est: quemadmodum etiam nihil per venas mesaraicas deducitur ad Lienem, sed contrariâ Liene ad mesaraicas. Et eadem videntur vehi sanguinem & revèhi chylum, à natura est alienum, ne confundantur. Præterea nunquam in sectionibus vivis chylus ibi observatur. Lutosâ autem portio chyli, quâ nulla pars ad sui nutritionem indiget, rectius per intestina expurgatur. *Galenus l. 2. de loc. affect. c. 1. & aliorum veterum Medicorum ac Anatomicorum* constans opinio fuit, Lienem succos limosos, crassos & melancholicos in hepate genitos attrahere per eas venosum, & attractos, præcipuè arteriarum ope, alterare, sibi que convenienter

imentum inde elaborare ; reliquum
erò & quod inutile est ad ventriculum
per aliam venam mittere, nec tamen sine
utilitate , dum sua acerbitate actiones
ventriculi roborat. A vulgata hac sen-
tentia multi recesserunt, negantes, sue-
ram melancholicum in hepate genitum
Liene attrahi ; sed statuerunt , mox ex
venarum mesaraicarum trunco , ante-
quam chylus ad hepar feratur , portio-
nem ejus crassiorem, ingenita facultate,
per portæ ramum splenicum ab eodem
elici. Et in hanc sententiam postea
concesserunt Anatomici plerique, *Va-*
salpius, Posthius, Iessenius, Platerus, Bauhi-
us, Spigelius, Sennertus, Laurembergius
Riolanus in *Anthropographia prima*.
sed condonandum isti seculo, quia igno-
vit, quæ posteris jam innotuerunt. Au-
topsia enim anatomica docet, nullum
chylum, seu crassum, seu tenue per ra-
mum splenicum ad Lienem deferri. Ad
hec ligatura in vivis monstrat, nihil per
illum splenicum deduci ad Lienem,
sed contrà à Liene ad venam portæ &

consequenter ad hepar. Per solum enim
gò ramum splenicum defertur omne
quod ex Liene profluit, & quidem non
nisi in venam portæ & hepar.

Verum enim verò, cur meatus illi
Galeno & aliis ad succum huic ad Lienem
ducendum instituti repudiantur?
Cur novæ, eæque multis anfractibus ab-
ruptæ, & tam longæ exquiruntur viæ
semitæque inauditæ, imò quæ naturæ ini-
urias faciunt? breviter ostendemus.
Melancholiam primùm *Galenus* dixit
excrementum esse secundæ coctionis in
hepate, at quomodo hoc fieri poterit, si
per ramum splenicum à chylo in portam
separetur, antequam hepar ingrediatur
chylus. Sed dicat aliquis, postquam in
hepate fortè separetur, in portam regur-
gitare; & per ramum splenicum ad Lienem
deduci est verisimile. Nequaquam
certè, quomodo in hepate separari po-
terit? Ad bilis separationem illic affi-
gnantur vasa separantia; ad melancholia
verò nulla. Præterea, quid illam
in portam regurgitare faceret? Sed hoc

processu, quod vel suâ naturâ, vel virtute
Lienis attractrice, in portam rursus de-
catur; quomodo inde ad Lienem
transcat? perfacillimè, inquiunt, per ra-
mum splenicum. Nullo modo; in ramo
splenico, ut 6. 13. sect. 1. dictum est,
valvulæ apponuntur, omnem ad Lienem
transitum, nec quicquam in il-
lum remeare potest. At si quis hîc ul-
terius urgebit: verum hoc esse potest in
canis, damis, ovibus, equis, canibus &
ceteris animalibus, in quibus hujusmo-
di valvulæ inveniuntur, in homine verò,
quo tales nunquam observantur, alia
separationis via; corpusque huma-
num multum à cæteris animalibus dif-
ferat. Ita ne? Quia in figuris exter-
ioribus, ob situm forsitan convenientiam ani-
malium viscera ab humanis paulò varia-
tione concessit natura: Ideò statim aliud il-
lud fingemus officium? In naturalibus ac-
tionibus nulla omnino in omnibus ani-
malibus est partium discrepantia. Qua-
propterea chylum conficiunt in ventri-
culo, æque ac homo; sanguificat in cor-
de,

de, æquè ac homo, similiter & excrementa deponunt, in vesiculam fellis, in vesicam urinariam, serum in corde & cerebro spiritus conficiunt, homo, non in jecore aut intestinis: hepate per cavam ad cordis ventriculum dextrum sanguis defertur in illis, in homine, non à corde ad hepar in bruta, in homine verò ab hepate ad cor. cum in omnibus hisce actionibus naturalibus bruta cum hominibus conspirare videamus, cur in hac, æquè ac ceteris naturali, discrepantiam fingeremus? Præterea valvulas in corpore humano ramo splenico non prorsus denegamus illas tamen dicimus esse non adeo conspicuas, ut in cæteris animalibus. Jam verò cum nullæ aliæ, præter arterias, inveniantur viæ, per quas aliquid in Liveriem transferri poterit, illis officium Judicis facile concedimus.

Ex ista autem falsa ac autopsiæ anatomicæ planè contraria opinione, quod nimirum succus limosus, crassus & melancholicus in hepate genitus ad Liveriem

atur; seu quod Lien per ramum sple-
um attrahat, duæ adhuc aliæ opinio-
longè falsissimæ emergunt; quarum
est: quòd Lien sit humoris crassi &
melancholici receptaculum; altera ve-
quòd Lien per vas breve venosum
melancholicum & acidum in
triculum ad eum roborandum ac-
petitum excitandum eructet.

Triplicem namque actionem Vete-
Lieni tribuerunt. (1.) Attrahere hu-
rem melancholicum, excrementum
& limosum ex hepate. (2.) Me-
cholicum excrementum inde secer-
re, ut bono sanguine nutriatur. (3.)
retum in ventriculum & intestina e-
tare. Statuitur etiam alimentum
enis ab arteriis elaborari & frangi,
in caro fungosa & laxa nutriri debeat
guine vaporoso & subtili. Ductus,
quos eructare putatur excrementum
melancholicum. sunt primùm vas bre-
, & deinde vena hæmorrhoidalis. Vo-
at itaque splenem esse melancholici
crementi, seu feculenti crassi sangui-

nis in hepate segregati receptaculum
(quemadmodum vesica biliaria flavam
bilem recipit) & ideo Lienem è regio-
ne hepatis positum.

Lienem verò huic excremento reci-
piendo tantum dicatum saniores Anato-
mici ac Medici negant. Nulli enim as-
sunt ductus ab hepate succum hunc im-
mediatè ad Lienem deferentes. Et
quis dicat per ramum splenicum, à facie
tate insita Lienis, à portæ trunco, ante
quam hepar ingrediatur, succum hunc
separari; quomodo tunc secundæ co-
ctionis in hepate excrementum dici po-
terit, cum ad hepar nunquam perveni-
rit. Absurdum insuper est, regurgita-
re excrementum in venam portæ
& postea in ramum splenicum. Per eor-
dem ductus excrementa suspiceret
rursus expurgaret. Cur non per hep-
tis substantiam disperguantur furculi he-
patis receptaculi, aut saltem rami splenici
quemadmodum vesica biliaria ramulum
suscepit in hepate dispersos. Lien etiam
non est idoneum huius excrementi re-

otaculum, quia nullam habet cavita-
tem, quâ contineat, nullamque viam,
â se exoneret, sicuti bilis vesica, & ve-
sica urinaria obtinuit. Non in ventri-
culum per vas breve eructatur, quia tûm
dum continuò emoveremus; nec
hæmorrhoides evacuatur, quia tûm
tunc hæmorrhoidibus laborarent. Et
denique excrementi receptaculum ef-
f, cur non inferiori loco situs est, ut
immodius suscipiat ponderosum ex-
crementum, quemadmodum reliqua re-
ceptacula? Ejus igitur longè alius usus
est, qui arterioso sanguine juxta consue-
tudinem aliorum membrorum alitur.
An ergò tam nobile viscus theca pesti-
feri excrementi esse poterit? tot arteriis
regnans. Nec ideo ipse fabricatus est
tamen, ut sit organum excrementorum re-
ceptioni inserviens.

Quapropter nunc planè arbitramur,
est quam nullum vas (quale observatur
etque ureter urinam deferens à reni-
bus ad vesicam urinariam) reperitur,
quod secretum in Liene liquorem qua-
lem.

lemcunque, tanquam inutile corpori recrementum ad partem aliquam externam, per quam vel continuò, vel per intervalla in totum è corpore excludatur ac eliminetur, transportare queat: Verùm, venæ duntaxat & vasa occurrant lymphatica, per quæ, quicquid ex Liene effertur, possit deferri; & venæ quidem contentum in se sanguinem propellant in venam portæ, & consequenter in ipsum hepar; lymphatica verò vasa lympham suam in truncum effundant: propter, inquam, opinamur, quicquid Liene prodit, sanguinis commisceri missa; ac proinde nullum in Liene secerne inutile, noxiumve corpori excrementum; verùm sanguinem in corde jam confectum, ac copiosè ad Lienem delatum amplius in ipso elaborari, & quodammodo perfici, aded ut ferme tincti cujusdam sanguinei, aut tincti (cum chymicis si loqui libeat) indubie ibidem naturam, cujus interventu facilius & celerius in sanguinem abeat chylus.

Nec sententia eorum, qui humorem melancholicum & acidum in Liene elaboratum partim pro roboranda coctione, partim pro appetitu excitando ad ventriculam per vas breve venosum deportari cum *Galeno* & *Avicenna* l.c. statuerunt, firmo innititur talo; nullus enim ejusmodi humor in Liene generatur; & si generaretur, excrementitius esset, nullique usui dicatus: impediretur potius coctio alieno istiusmodi humore excrementitio ingesto.

Et si excrementum hoc feculentum melancholicum à Liene ad ventriculum mitteretur: fieri non posset, quin chylo admisceretur, eumque inquinaret & corrumperet, & plura mala symptomata excitaret. Ventriculus etiam suo & nativo robore gaudet; appetitus excitandus aliam agnoscit causam, ut eò excrementitii hujus humoris incimento non opus sit. Quin etiam in Anatomia hæc, quæ de excrementorum melancholicorum in ventriculum transmissione dicuntur, maximè suspen-

ita reddit. Qua de re insignis Anatom-
 icus *Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. c. 99*
 hæc habet: Ego sanè, inquit, de hac res-
 crementi Lienis in ventriculum eructatio-
 ne & ejus usu nihil afferre audeo: neque
 etiam sectio hac, quæ tamen citra ullam
 controversiam Anatomes Professores au-
 dacissimè asserunt, luculenter commo-
 strat. Primum enim nullum meaturum
 illi, quo bilis in intestina repurgatur, simi-
 lem esse, haud ambigo: Vena autem, quæ
 sinistro ventriculi lateri implantantur
 non à Lienis prodeunt corpore, sed ab illis
 quæ jam Lienis inferuntur. Neque a-
 penitus harum venarum per ventriculum
 series visitur, quàm reliquorum omnium
 corpus ventriculi petentium. Deinde nu-
 la hîc est prorsus vena, conjuge carens arti-
 riâ. Postremo, si quid in ventriculum
 Liene deferretur, id potius ventriculi fu-
 dum petit, quàm superius illius orificium.
 Ex nulla sinistrum ventriculi latus adie-
 nullo alio turget sanguine, quàm reliqui
 ventriculum implantantes vena.

Et, quod magis est, aliorum Neotec

rum autopfia luculenter ostendit, per
sa brevia arteriosa sanguinem quidem
Liene ad ventriculum pro hujusce nu-
tione fluere: at ejus magnam partem
r vasa brevia venosa refluere ad Lie-
m: per ramum verò splenicum nihil
runco venæ portæ ad Lienem, sed con-
ià Liene versus hepar affluere sangui-
m, qui per arterias coeliacas Lieni in-
uatur. Nullum ergò liquorem aci-
m aut quemvis alium per vas breve ex
ene in ventriculum deferri, sed tam ex
utriculo, quàm ex Liene, mediante
cto vase sanguinem in aliam venam in
mo splenico desinentem prodire, ipse
aturæ prædicti vasis (propè ventricu-
m & Lienem) in vivorum dissectioni-
is ostendunt.

Hinc etiam Cl. *Marcello Malpighia*
Viscer. Structur. Exerc. Anat. de Liene
certissimum videtur, sanguinem, qui
enem attingit, ab eodem unà cum
mmixto quocunque corpore, quod
separetur, & immiscetur à membra-
sis sinibus & cellulis, in continuatum

splenicum ramum exprimi, qui, cum pa-
 tentem in jecur viam inveniat, arduū vi-
 detur in vas breve, quod ab arteriis pro-
 pulsus sanguinem impetu revehat, infi-
 nuari posse; & hujus impossibilitatem
 presenti experimento explorat. Ligato
 splenico ramo, libera adhuc comes ar-
 teria permaneat, ita ut propulsus san-
 guis à Liene refluens impeditam inve-
 niat viam in itinere ad jecoris portas,
 ligentur interim portiones vasis brevis
 propè tunicas ventriculi, ne sanguis,
 comitibus arteriis in ipsum irrumpat,
 vel mavis digitis compresso vase brevi
 versus splenicū truncū sanguis exprima-
 tur; etenim licet impensè turgeant Lienis
 & ramus splenicus, non tamen unquam
 Liene ascendet sanguis per continuatum
 vas breve in ventriculi fundum. sed, im-
 pediente valvulâ in hiatu ejusdem vasis
 in splenicum ramum, detinebitur, deo
 nec, solato vinculo, in jecur rapiatur, va-
 cuâ semper & flaccidâ interim perma-
 nente vasis brevis inter valvulam & liga-
 turam, seu digitorum pressuram, po-
 tione.

Alioquin etiam non negamus; quandoque fieri posse, ut redundante vitioso humore melancholico in vasis splenicis, is quoque per hoc vas ad ventriculum confluere possit, ubi eum non nutrit, nec roborat, nec appetitum excitat, sed potius conturbat, vomitiones sanguineas nigras, aliaque symptomata gravissimum affectum inducit, de quibus Medici Practici in hypochondriaco & hypotropico affectu agunt.

Mixtam ex omnibus his opinionibus, quas hactenus adduximus, Lienis actionem nuper procudit in *Enchirid. Anat. Riolanus*, limosum scilicet sanguinem trahere ad sui nutritionem, inde serum quoddam particulare fermentativum per arterias splenicis effundere in ventriculum, & cum bibulum sit ejus parenchyma, per venas elicere & emungere superfluum liquorem ex ventriculo. Nobilior sanè est Lienis actio, quàm ut superfluum ex ventriculo suscipiat. Id autem per quas vias? Nam venarum officium est, sanguinem in partibus ex ar-

terius revehere ad truncū ex fundamētis
tis circulationis frustrā hīc à *Riolano* in-
pugnatis. Nec aliud ligaturæ in vivis co-
ment.

Franciscus Vlmus, quem sequuntur
Carol. Piso, & *Æmilius Parisanus*, in
bell. de Liene censuit, Lienem pro sinistro
cordis ventriculo arteriosum sanguinem
conficere, sicut pro dextro hepar. Quia
sententiam jam dudum à *Cl. Hoffmanno*
in lib. de usu Lien. c. 24. Excell. *Contra-*
Riol lib. de generat. sang. & motu nat. c. 22.
Celeberr. Thom. Bartholino Anat.
format. l. 1. c. 16. refutatam legimus, quod
(1.) nulla est via, per quam in cordis
sinistram ventriculum illabatur sangui-
nis hic confectus; neque enim per aortam
potest, propter valvulas ad ostium ex-
iituras. (2.) Permissio fieret succorum
perfecti & imperfecti, si eadem viâ
eodemque tempore acciperet cor sangui-
nem & iterum redderet. (3.) Sine Lienem
multa vivunt, quæ tamen spiritus
tales generant.

M. de la Chambre tractat. de Dia-
gnosi existimat Lienem conficere spi-

in usum abdominis. Sed is spiritus nutriendas & vivificandas partes inferiores per aortam suppeditatur, qui sit sufficere. Si tamen spirituosus sanguinis modificationem quandam in usum abdominis accommodatam intelligimus, eum meritò cum Excell. *Bartholino* usamus.

Arduum sanè ac molestum nobis esset omnes Anatomicorum ac Medicorum de officio Lienis opiniones, tumque discussiones hìc adducere. Nihilquid novi nuper *Helmontius* & *Sonius* de hoc Lienis usu in medium protulerunt, jam ab Excell. *Thom. Bartholino* l. I. *Anat. reformat.* c. 16. & *Highe* pro *Disquisit. de affect. hypochondr.* c. 4. contilatum & refutatum legimus. Subijcimus ergò in hoc capite, & sequens credimur.

CAPUT III.

Primum ac verum Lienis usum, qui est sanguificare, manifestat.

Quamvis hætenus Autorum varias de usu Lienis opiniones recensuerimus, nihil tamen certi de vero ejus officio

cio exinde judicare potuimus. Præter
missis ergò pluribus rerum difficultati-
bus ac verborum ambagibus, in hoc ca-
pite ad primum verum Lienis usum, qui
est sanguificare, accedere nobis placuit.

Galenus quidem l. 4. de usu part. c. 11
& l. 6. de loc. affect. docuit, Lienem salu-
tem humorem feculentum & melan-
cholicum ex hepate attrahere, ejusque
esse conveniens receptaculum. Contra-
ante eum Aristoteles l. 3. de part. animae
c. 7. tradidit: τὸν σπλῆνα βοηθεῖν πρὸς
τὴν πέψιν τῆς τροφῆς, hoc est, Spli-
nem conferre ad concoctionem nutri-
menti, & consequenter δύναμιν αἱμα-
τοποιητικὴν habere. Et hanc sententiam
postea sequuti sunt Alex. Aphrodisias
sect. 2. probl. Aretæus l. 1. de caus. & signis
morb. chron. Autor. lib. de respirat. Rem-
merus l. de Scorbute. c. 4. Platerus, Bar-
tholinus, Casp. Bartholinus, Hoffmannus
Spigelius, Sennertus, Horstius & alii. A-
verò modus αἱματοποιήσεως illius
omnibus eodem modo non determinatus

ir. Quidam enim Lienem instar hep-
tis sanguinem elaborare voluerunt,
sed nec de via consenserunt, nec de chy-
li natura. Præprimis autem statuerunt,
Lienem ex crassa chyli parte per ramum
splenicum insitâ facultate ad se tractâ
sanguinem crassiores, sed tamen lauda-
bilem ad nutrienda viscera infimi ven-
tris elaborare. Probârunt hoc (1.) ex
structuræ affinitate cum hepate. Quem-
admodum enim hepar viscus carnosum
est, tunicâ vestitum, vasis plurimis dona-
tum, cujus caro quasi sanguis affusus est;
ita etiam Lien viscus est, tunicâ dona-
tum, & plurimis vasis variè implicatis;
cujus caro propria quasi sanguis affusus
& congelatus est. (2.) Plexus sunt in-
voluti in Liene: at plexus solum elabora-
tionis novæ inserviunt: quæ elaboratio
est chyli pro sanguine. (3.) Patet hoc
ex situ rami splenici, qui est longè infra
hepar, ex trunco venæ portæ, ubi attrahit
pars chyli, sive chyli sanguinis ali-
quam dispositionem habentis; si itaque
materiam ibi recipit, ex qua fit sanguis,

N s. cur

cur non etiam sanguificabit Lien. (55)
 Ex ductu rami splenici & connectione
 Lienis cum ventriculo per venas per
 infinitas arguunt, quas si quis rectè per
 penderit, (inquit *Sennertus* l. 1. c. 9. *Institu-
 tut Med.*) vix causam aliquam inveniet
 cur non usum eundem iis cum reliquis
 venæ portæ ramis attribuat. Imò animus
 adversum est, Lienem vices hepatis sub-
 ire, & hepate malè affecto, ejus officium
 fungi, unde mole suâ interdum hepar su-
 perat, ut ex *Vesalio Fabric. corp. hum.* l. 1.
 c. 9. *Schenckio* l. 3. observ. 91. & *Fernelio*
 l. 1. *Physiolog.* c. 7. videre licet. (6.) Quod
 magna vasa non à jecore immediate, sed
 à portæ vena, quæ chylum vehit, tendant
 ad Lienem, quam ob causam potius chy-
 lus, quam sanguinis excrementum
 hoc viscus permeabit (7.) Omnes
 homine partes, ajunt, esse bipartitas,
 in renibus, testibus, pulmonibus, man-
 tis, organis sensuum patet; si unicam
 cit natura, eam in medio locavit, ut ex
 ventriculus, uterus, vesica, nasus, lingua
 os, Lien verò & situ & structurâ cum
 hepate

hate convenit, ergo & alterum esse
par, ac sanguinis conficiendi orga-
m existimant. (8.) Verisimile non
est, tam numerosas arterias Lienem in-
cedi, & tam patentes arteriarum cum
venarum anastomoses in illo inveniri in ex-
perimentorum gratiam, quin potius ad
purificandum crassiorem sanguinem, ut
per contrariam tenuitatem contra
ex crassities frangi possit. (9.) Lie-
nem observârunt Anatomici hepate
multo rubicundiorē & majorem. Et
cœtu Lien rubet, ut hepar. (10.) In-
terdum hepatis situs mutatur, ut sit in si-
stro latere, & Lien in dextro. His ad-
Platerus (11.) omnes hepatis morbos
que Lieni convenire & sanguificatio-
nem tollere. (12.) Eadem remedia ad
curandum vitia utriusque usurpantur,
illumque discretimen, nisi quod fortio-
rius magisque aperientibus in affecti-
s Lienis uti debeamus, invenitur.
Hisce machinis non contentus est
Sfmannus in lib. de usu Lienis; hinc ul-
terius in hujus sententiæ confirmationē

ur.

urget, & (1.) ex venæ portæ substantiâ
ita argumentatur: Quæ venæ eandem
substantiâ speciem habent, illæ quoque
eandem habent actionem; at portæ dextra
ter ramus & sinister, videlicet ramus
splenicus eandem, ad sensum, substantiâ
speciem habent. Ergò. Ejus autem ac-
tionem esse ait, vehere chylum; & certè
qui portam arbori assimilant, mesaria-
cas omnes ejus radicibus comparare de-
buere, quibus ex intestinis alimentum
trahant (2.) infert: Splenicus trahit id
quod exortu suo contingit; at contin-
git chylum. Ergò. (3.) Ex ramis spleni-
ci progressu arguit: Dividitur, inquit,
statim in ramos multos, quorum pluri-
mè in ventriculum feruntur: quos si mesar-
iaicis compares, non ineptè dixeris effe-
ctumque idem officium, una origo
& una substantia designat unam actionem
(4.) In Lienem, inquit, hujus fur-
culi inseruntur, ut in hepate, & ad eun-
dem modum per substantiam ejus disse-
minantur. (5.) Deinde substantia Lie-
nis non minus est parenchyma, quam

par, itaque chylum non minus tra-

Si auctoritates valeant, multæ etiam
medium proferuntur, *Aristoteles lib. 3.
part. animal. c. 7.* ita ait: *simili naturâ
adi ta hepar & Lien*; item, *Lienem ef-
quasi jecur adulteratum, & ubi Lien ex-
nus est, ibi hepar bipartitum esse, & quod
ones partes ferè in corpore bipartite sint.*
Lato Li-nē vocavit ἥπατος ἑκμυζήτιον,
pressum hepatis simulachrum. Hippo-
ates eundem dixit ἥπαρ ἀεὶ σερρον.
Ii vocant hepar v. ariū, sinistrum.
utor l. de respirat. usu hoc confirmavit,
i & Alex. & Aphrodisæus, Aretæus, & alii.
archangel Piccolthomineus alterum usum
enis fecit copiosiorē sanguinem
nificere.

Verū argumenta supra allata parū
anguificationis opus in Liene probant
onfirmantque. Ad ea autem præci-
ta breviter & in genere pro instituti
ostri ratione ita respondemus. Quanta
ad structuram in his duobus visceri-
as, hepate scilicet & Liene sit diver-
tas,

tas, satis superque patet sensibus in artificiosa dissectione; quam ob causam argumentum illud primum nihil firmiter concludit. Plexus etiam ad elaborationem simpliciter non inserviunt, sed potius ad moram, ne sanguis citius præterfluat, quam oportet. Præterea plexus illi in Liene, non sunt ejusdem naturæ cum illis in hepate, rete mirabili ubi variè contextuntur venæ & arteriæ sed ex fibris variè inter se contextis constant, quasi percolationi potius quam sanguinis elaborationi inservirent.

Partes etiam, quas geminavit natura commercio quodam, vel vasorum communis origine conjunxit, ita ut deficiente alterâ, ejus vicem suppleat altera illæsa. Quemadmodum in renibus, arterias ex aorta, venas ex cava utrisque communiter cavat; sic testes ab iisdem truncis sua vascula possident. Pulmones sua ab eadem trachea, venâ & arteriâ; & sensuum organa ab eodem principio nervos succipiant. At hepar & Lien tale commercium non habent; à cava enim ad Lienem

per-

in nullus patet aditus. Et quamvis
 par non sit in medio, non tamen ne-
 cessario duplex esse debet, quia aliàs
 entriculus quoque, in sinistro latere
 erens, duplex requireretur. Notan-
 tem autem, illa membra solùm esse du-
 plicia, quæ facultatem suam utrique late-
 rine necessariam ad utramque partem com-
 municare nequeunt. Multitudo item
 arteriarum aut anastomose non nihil facit
 simpliciter ad sanguificationem. Illarum
 in prædictis satis illustratum dedi-
 mus. Et magnitudo alicujus partis præ-
 naturalis nil nisi errorem naturæ, non
 officium aliquod naturale illi debitum
 probare potest. Quòd si interdum he-
 patitis situs mutetur, ut sit in sinistro late-
 re, & Lien in dextro, rarum est exem-
 plum, sitque saltem præter naturam, nec
 tam sanguificationem in Liene pro-
 ducit: Lienem verò hepatis vices subire
 nunquam demonstrare posse cense-
 mus. Morbi præterea cum hepate &
 Liene communes aliis quoque partibus
 convenire possunt, an ergò illis hæma-
 tosin

tosin tribueremus? inflammatio utrisq;
convenit, quæ fit ex sanguinis extra va-
sa quocunque modo aberratione, unde
cum sine motu sit, & major sit ejus quan-
titas, quàm à parte illa regi poterit, pu-
trescit & inflammatur: hoc idem pleu-
ræ accidit. Obstructio utrisque etiam
commune malum, sic scirrhus.

Sed hæc cuilibet parti vasa habentia
multa, in quæ humores crassi impingan-
tur, accidere possunt: ut renibus, pan-
creati, pulmonibus, non tamen vim ha-
bent sanguificam. Et iisdem remediis
morbos hepatis & Lienis tolli est neces-
se, non quòd partem affectam similem
respiciant, sed quia similem materiam &
eandem morbi causam in diversis parti-
bus inveniunt.

Quæ de situ rami splenici ejusq; pro-
gressu & divisione, item de venæ portæ
rami dextri cum sinistro, videlicet ramo
splenico quoad substantiam similitudine
dicuntur, quibus chyli motum ad Lie-
nem probare contendunt, saltem com-
menta sunt, & autopsiæ veræ anatomicæ
planè

planè contraria ; ne minima enim chyli portio ad Lienem immediatè per ramum splenicum deducitur ; & ligatura in vivis manifestè monstrat , nihil pervenas mesaraicas deduci ad Lienem , sed contrà à Liene ad mesaraicas. Fatemur quidem , splenicum ramum eandem habere actionem cum cæteris mesaraicis , sanguinem scilicet ad portam revehere , sed quomodo eandem habeat actionem , cum cæteræ ad portam (juxta doctrinam *Hoffmanni*) trahant , splenicus verò à porta. At certè si traheret , non chylum importaret , cùm ipsum ne attingat quidem. Venæ illæ à ventriculo ad portam delatæ , sunt arteriarum comites ad ventriculum , & idem habent officium cum illis in cæteris corporis partibus. Et vasa quoque non sunt hujus actionis opifices , sed parenchyma , quod in quolibet viscere est diversum , aliud in hepate ; aliud in pulmonibus , aliud in renibus , in Liene etiam aliud. Ergò & officia diversa illis sunt assignanda.

Quid dicamus de autoritatibus , quas
ad-

adducunt. In Medicina sanè ac potissimum in Anatomia non autoritatibus, sed rationibus & experienciâ pugnamus.

Quidam tenuissimum sanguinem, spiritûs vitalis materiam in splene præparari statuerunt, ut *Francisc. Vimus in lib. de Liene, Carol. Piso, & Aemil. Parisanus*, Quidam cum *Reusnero in lib. de Scorbuto*. humidiores & magis aqueas chyli partes in Liene præparari & in sanguinem converti voluerunt. Quorum opiniones in superioribus jam ventilavimus, & ad singula ferè verba nostrum responsum dedimus.

Quidam Lienem trahere feculentam sanguinis partem eamque colligendo sanguinem reliquum puriorem reddere dixerunt; quam sententiam passim *Galenus* proposuit, eumque sequuti sunt præstantissimi quique, quod patet ex *Vesalio, Fernelio, Laurentio, Columbo, & aliis Classicis*. Confirmant hanc communem assertionem argumentis subsequentibus. (1.) Qualis in aliqua parte color & sapor excedit, talis quoque humoris adest abundan-

dantia: at in Liene color lividus & sapor acidus percipitur. Ergò melancholicus humor in Liene colligitur. (2.) Ubi frequenter scirrhusi tumores & obstructions accidunt, ibi feculentum sanguinis excrementum colligi necessum est. At in Liene frequenter illud accidit. Ergò. Minorem probant ex *Galeno l. 13. meth. med. & l. 5. medicam. simpl.* ubi simul causam addit *Galenus*, dicens, propterea frequenter Lienem his affectibus obnoxium esse, quod humorem crassum ac feculentum contineat. (3.) Cujus obstructio est causa melancholici succi redundantis in reliquo corpore, illud est ejus receptaculum. At Lienis obstructio est causa redundantis feculenti succi melancholici in reliquo corpore, quia icterus niger subsequitur: Ergò Lien est receptaculum sanguinis feculenti. (4.) Accedit, quòd melancholicus succus à Liene ad ventriculum transmissus, appetitix causa sit, quod non fieret, nisi primum ab ipso colligeretur.

Quæ argumenta jam ex parte in superiori

riori capite ventilavimus ac etiam refutavimus; ut verò ex asse iis satisfaciamus, nos hæc addimus. In sanis Lien semper & naturaliter rubet, & non est lividus; neq. etiam talem saporem acidum exhibet, qualem ei tribuunt. Si enim Lien sanguinis melancholici tantum esset receptaculum, utique ejus substantia imbiberet aliquem saporem atræ bilis, quem in ejus usu & esu gustu perciperemus. Atqui aciditas ista, quæ in Lienibus gustatione percipitur, modica & temperata est, ac ex Lienum diversorum quoque animalium coctorum gustatu nihil tale, quod amarum & valde acidum sit, indiciumque humoris melancholici præbeat, depræhenditur; sed potius grata quædam dulcedo, præsertim in juniorum animalium, porcorum, vitulorum, cervorum, &c. Lienosa carne, quæ palato non est insuavis. Observato quidem Liene; crassi & melancholici in corpore coacervantur humores, non quòd crassi & melancholici humores à Liene non trahantur, quos nec in cona-

tu-

turaliter licet invenire ; sed quod Lien-
 tincturam suam seu succum acidum at-
 tenuantem nequeat sanguini chylove
 communicare. Si quid excrementitii
 humoris in sanguine est, id facilè per a-
 lias vias, beneficio tincturæ hujus, ex-
 purgari potest. Quando autem atræ bilis
 fit receptaculum, id non nisi ex depravata
 ejus actione, cum nimirum tincturam
 hanc vel planè non generat, vel non ju-
 sto modo generare potest, ac obstructio-
 ne, duritie & scirrho laborat, ob quam
 læsionem multum seculenti, crassi & ad-
 usti humoris, tam in ramo splenico,
 quàm ipsa substantia Lienis, vicinisque
 vasis colligi potest, accidit. Atque in
 hoc insignes Medici, quos omnes ad di-
 tum recensere nobis molestum esset,
 consentiunt. Nec etiam præclari Ana-
 tomici ab hac sententia longè discordant,
 quemadmodum videre est apud *Vesali-
 um, Columbum, Archangel. Piccolthomi-
 neum, Riolanum, Varolinum, Iessenum,
 Spigelium, & alios.*

Nos sanguinis quandam in Liene ge-
 ne-

nerationem fieri concedimus, non ex chylo crasso, neque fœculenta aliqua sanguinis parte, sed ex chylo aqueo, tenui & humido, qui per venas lacteas huic usui dicatas immediatè ad Lienem deducitur, ac in eo vi caloris insitæque suæ constitutionis ac beneficio tincturæ illius, pro totius corporis nutritione ac conservatione, in sanguinem laudabilem coquitur. Et hanc actionem nobilem Lien æquè ac aliud sanguificationis organum præstare potest. Gaudet enim Lien omnibus & quidem pluribus ac majoribus sanguificationis veræ requisitis: adest raritas visceris: gaudet calore insigni: habet vasorum amplitudinem & copiam, quorum non minima pars sunt vasa chylifera, quæ in non alium usum tum à ventriculo tum à pancreate ad Lienem immediatè pertingunt, quàm ut chylum tenuiorem & aquosorem ibi deducant, quò in eo in sanguinem laudabilem commutetur: possidet etiam tincturam suam, cujus beneficio & ope chylus in sanguinem mutatur, isque redditur

aprus,

ptus, è quo vitales spiritus generentur, &
in actum suscitentur.

Officium ergò Lienis consistit primò
circa chylum tenuiorem ac aquosiorrem
in sanguinem commutandum. Quod
sic demonstrare licebit. Ex morbis,
quibus splen afficitur, idem non obscure
colligitur. Primùm enim quibus Lie-
nes sunt calidiores, ventriculus plerum-
que est siccus & siticulosus. Nec ventri-
culus tantùm siccitate tùm laborat, sed
& alvus ipsa. Illa verò siccitas unde, nisi
à chyli tenuioris & aquosioris valida at-
tractione? Deinde quibus ita absorbe-
tur multum chyli tenuioris ac aquosio-
ris, illis Lien intumescit. Id certè olim
etiam observatum *Hippocrati* 4. de morb.
& 1. de morb. mulier. Docet idem *Ale-*
xander Aphrodisaeus sect. 2. probl. 44. quæ-
rens, cur febre laborantibus Lien es au-
geantur. *Hippocrates* l. de aer. aq. & loc.
testatur, aquas plaustris bibentibus Lie-
nes semper magnos esse & compressos,
ventres verò duros, tenues & calidos.
Tales verò edaces & siticulosos esse,
ven-

ventresque (*νεφίλιος*) tūm superiores, tūm inferiores sic cūmos habere. Scilicet aquas illas palustres attrahit avidus. Lien calidior, & inde tumet, quo superior & inferior ventriculus non potest non siccare, aliorum proleatā omni humiditate. Subscribit huic *Aerii* testimonium *tetr. 3. serm. 2.* aquæ largiorem potum & olera humectandi vi præditā ad splenis magnitudinem conferre. *Urnæ de & doctissimus Vallesius 7. Epid. in Eadem demo; Potu verò pauco, inquit, uti debent Lienosus & multo plurimum ladi periclitari & fieri hydropicos, res est expertissima: neque ratio obscura. Cum enim Lien sit spongia similis, plurimum aquei liquoris imbibit atque distenditur, obruiturque eo facile calor.* Contrā autem, in quibus ad Lienem non possunt deduci ejusmodi humores, quando scilicet ipsi sui caloris imbecillitate eos non admittit, vel quia abundat nimis humor, iis ventriculus superfluit humiditate nimis & alvus quoque inrerdu laxior est. Dixerunt verò hoc ipsum & multa illa salu-

quorundam spleneticorum, & illa ventriculi nausea, & aquæ vomitus.

Sanguis porrò eorum, qui magnis laborant Lienibus, totus tenuis est & aquosus; ut dubitandum non sit hujusmodi quid à splene adduci. Scribit disertè etiam Hippocrates 6. Epidem. s. 70 aph. 30. Lienem κατὰ ῥόπον parere sanguinem tenuem καὶ ἰχωροειδῆ. Et l. 3. Epid. de ægroto Lienoso scribitur, sanguinem illi ex nare sinistra prodiiisse aquosum. Aristoteles etiam sect. 9. probl. 5. expressè pronunciat, aquosum esse sanguinem τῶν σπληνιῶν. Proditur verò illa Lienosi sanguinis aquositas frequentissimis hæmorrhagiis ex variis corporis partibus, per ipsa cœca cutis spiracula sanguine nonnunquam emanante. Fundunt quoque gingivæ spleneticorum sanguinem tenuem & aquosum. Nigredo quoque Lienis oritur ab aquoso humore putrido & nativo calore lestituto, vel interdum etiam à succo quodam adusto; cum non omnis ni-

Q

gre-

gredo in humore crasso & terrestri semper consistat, sed multa quoque aquosa & tenuia esse nigra notum sit. Sunt & Lienis tumores aquosi, qui desinere tandem solent in hydropem, aut largo urinæ profluvio solvuntur. Sanè si qui crassi humores ferantur in Lienem, non possunt non illi obstruere exilia ejus vasa. Adeò enim illa sunt arcta, ut crasso admissio regressum non possint non denegare. Quapropter non mirum sanè esset, si Lienis tumores à crassis sæpè producerentur. Sed, ut ante diximus, sunt tumores illi plerumque aquosi. & Lien non admittit, nisi per arterias crassa. Ulterius, & magnorum Lienum excrementa tenuitatem indicant latitantium ante humorum; Profluunt enim inde urinæ copiosæ. Certè hoc usque adeò Lienosis est proprium, ut l. 3. Coacar. affirmat Hippocrates: in longis febribus tenuibus erraticis tenuium urinarum mictus (αὐτὸν δὲ) Lienosis sunt. A sudoribus quoque benè se habent

bent Lienosi. Tùm verò Lienes magni
in hydropem sæpè finiuntur, aut articu-
lorum dolores, aut capitis defluxiones,
quæ omnia à seroso humore oriuntur,
Arguit eandem aquositatem visceris,
quod, notante *Arætao l. 1. Chronic. morb.*
13. neque frequenter, neque citò, neq;
deò magna cum violentia inflamme-
tur ac hepar. Indicant idem & medica-
menta ad splenis morbos magno secu-
rò consensu comprobata, quæ omnia
quas ducunt, ut doctè *Hier. Reusnerus l.*
de Scorbut. c. 4. probavit.

Ostendit postremò idem & Lienis
abstantia mollis, rara, spongiosa, præ
qua hepar densum est: quod non solum
Hippocrates l. de morb. testatur, sed &
Galenus l. 13. meth. med. c. 16. & l. 4.
de usu part. c. 15. Confirmatur verò ma-
ximè & oculis nostris, & contactu. In-
structus est enim Lien innumeris, sed
enuissimis vasis, fibrarum instar, quod
expressis in Liene bubulo est conspi-
cuum. Carne verò constat molli & fa-
cile dissolubili, quamq; grumos potius

sanguinis dixeris quàm carnem vel parenchyma. Tegitur porrò tunicà, ut jam dictum est, satis crassâ, longè certè crassiore ac hepar, & quæ ex morbo nonnunquam in cartilagine[m] densetur. Talis verò substantia tenuibus quidem accipiendis continendisque apta est, crassioribus autem nequaquam. Fibræ enim istæ tenuia quidem admittunt, aut crassa minimè. Tunicæ verò illa est densitas procul dubio, ut eò rectius tenuia & liquida, ne excidant, & hydro-pem creent, contineantur. Certè aut crassa continenda suffecisset, qualis est in hepate membrana.

CAPUT IV.

Alterum Lienis usum; seu Tincturam illam nobilem, quam ipse in se generat, fideliter propalat.

Nihil novi in accuratiore structuræ artificiosæ hominis contemplatione est, partes varias habere actiones & usus. In corde præprimis hoc videmus. De Liene simul res constat; cujus actio & usus est non tantum sanguificare, sed etiam tincturam nobilem aliquam in se generare, cujus beneficio variarum operationes in œconomia corporis humani feliciter perficiantur.

Arbitramur ergò sanguinem arteriosum à corde per arterias ad Lienem delatum, ibidemque per plexus fibrosos multiplices, ac quasi per retia multifariam contexta transeuntem ulterius ad splenicam ramum, in plexibus illis particulas quasdam limosas & terrestres, quæ sunt sanguinis veluti fex & caput mortuum, relinquere: hæcque verò ibidem

dem spiritibus animalibus continuo eodem confluentibus, novoque continuo affluenti sanguini similiterque transeuntium commixtum, magis magisque cum ipsis permisceri & digeri, atque sic in tincturæ aut fermenti sanguinei essentiam exaltari: nequaquam verò sanguinem ipsum tenuiorem ac puriorem, vobis latili magis, ultra modum, quem partium nutritio poscit, spiritu perfundi aut exaltari ultra vitalitatis gradum ipsi sanguini seu spiritui in eo congruentem, & ratione plusquam perfici, hoc est, revera destrui ac corrumpi. Hanc autem actionem Lienis egregiam structura viscerum ac plexus copiosi arguunt, ipsaque ratio quâ ad Lienem affluunt humores, & eodem refluant, illustrat.

Maximè autem huic negotio declinando inserviunt eleganter exposita.

Cl. *VVillisio Tractat. de Fermentat. c. 1. pag. 30.* Dum sanguis, inquit ille, per arterias advectus Lienem subit, ipsa detrahatur quiddam, scilicet pars

*cula limosa & terrestres, quæ sunt
cruoris veluti fex & caput mortuum,
ut hâc ratione tota cruoris massa à suc-
co melancholico seu atra bile liberetur,
quæ in Liene non secus ac flava bilis in
hepate secernitur, quare Lien plerum-
que est atriaut lividi coloris propter
feculentias illuc depositas: (nimirum
inter plexus multiplices Lienis, quasi in
retibus hærentes.) Cùm verò hic suc-
cus, inquit, in Liene repositus, non sit
omniò inutilis, sed ob copiam salis fixi
sit valde fermentescibilis natura, non
statim ut bilis in cloacam rejicitur, sed
ulterius in Liene coquitur, & exalta-
tus in fermentum abit: (nimirum non
abit in fermentum vel tincturam ipse san-
guis in Liene quodammodo purificatus,
atque à sedimento feculento liberatus:
sed ipsamet illa feculenta materia in fi-
brosis Lienis pl. xibus hærens:) quod
fermentum, inquit Willis, denuò
san-*

sanguini commissum ejus motum (fermentativum) & volatilisationem, (id est, ulteriorem spirituum vitalium inactum exsuscitationem,) promovet. Quare, ut sanguini per arterias Lienem ingresso aliquid detrahitur, inquit, scilicet crudus melancholice succus; sic eidem per venas refluxo, aliquid continuò additur, scilicet idem succus coctus, & in fermenti naturam exaltatus. Non secus ac Chymici inter destillandum, ut liquor optimus fiat, partes subtiles & spirituosas à capite mortuo destillando segregant, ac dein ipsas reaffundunt; atque hoc pacto toties repetunt, donec caput mortuum crebra destillatione volatilifetur, & liquor secundum omnes suas particulas rite exaltetur.

Atqui huic sanguinis exaltationi specialis promovendæ, ut Excell. Franc. de Bœ Sylvius Disp. 5. de Lien. & Gland. ubi loquitur, non parùm conferre spiritus

nim

nimales, nemo ibi facile inficias, qui per Chymiam edoctus fuerit, omnia fixa unius spiritus volatilis ope reddi volatilia; & ex fixi volatilisatione, hinc volatilis fixatione manare multis inauditas vel incredibiles, veras tamen mutationum mirabilium tincturas. Arbitratur ergo, sanguinem à corde per arterias ad Lienem delatum ibidem spiritibus animalibus continuò eodem confluentibus commixtum magis magisque cum ipsis permisceri & digeri, atque sic in tincturæ aut fermenti sanguinei essentiam exaltari & plusquam perfici.

Sic igitur & nos quoque nervorum ad Lienem pertinentium longè nobilio-rem esse usum existimamus, quàm qui illi à *Glissonio* assignatur: nimirum ut spiritus animales copiosè satis devehant ad Lienem, non quidem pro sensu & motu; non enim est Lien organon sensui ac motui satis idoneum; sed ad sanguinis in Liene fermentationem, ac constituendum ibidem naturale aliquod fermentum, (quod omninò spiritu plurimo

Os

per

perfusum esse oportet) ejus beneficio deinceps sanguinis massa elaboretur, fermentetur, spiritiosa reddatur, atque ita nutritioni partium quarumvis magis id in ea evadat.

Hanc proinde ab animalibus spiritibus pendentem sanguinis in Liene perfectionem nonnunquam etiam lædi videmus, dum vel eadem minuitur, vel aliter quando augetur; nam in medio virtutis Minuitur prædicta illa sanguinis in Liene perfectio, tum imprimis spirituum animalium defectu, tum fortè aliquando sanguinis culpâ, & quidem viscidioris unde minus aptus est suæ perfectioni. Minui quoque potest eadem sanguinis perfectio Lienis malè affecti culpâ; cum enim per Lienis vasa penetrare, atque aliquam mutationem subire debeant tum spiritus animales, tum sanguis, qui ab ipso parenchymate singulare aliqui eis expectandum veniat, non est dubium nam si gravi de causâ angustiora evadant vasa dicta, nervosa præsertim, parcius ascendent spiritus animales; si præterea si

mius, & ideò forsan minus potens evadat Lienis parenchyma, & hæcenus quoque minus exaltabitur in ipso sanguis.

Augetur contrâ eadem sanguinis exaltatio spirituum animalium ad Lienem, faltem delatorum nimîâ abundantîâ, quam promoveri quoq; potest universus sanguis fluidior ac spirituosior, & forsan Lienis parenchyma solito tenuous, aut tenuius, aut laxius. Quomodo autem ejusmodi læsio curetur, apud *Franc. de le Boë Sylvium Med. Practic. l. 1. c. 43.* legimus. De hujus autem tincturæ usu nobili ac vario in sequentibus sumus dictu-

ri.

CAPUT V.

Tertium Lienis usum : qui est , sanguinem beneficio & ope hujus tincturae nobilis à succis crassis , tartareis & salinis liberare , eumque hac ratione purificare , declarat.

NON sanguificat solum Lien , tincturamque nobilem , cujus usu omnes in corpore partes gaudent , in se generat , verum sanguinem etiam ipsum , beneficio & ope hujus tincturae , à succis crassis , tartareis & salinis liberat , eumque hac ratione purificat.

Cum enim nihil ad Lienem veniat , nisi sanguis arteriosus , videndum , quidnam negotii ei in hoc viscere sit expectandum. Ubi nobis objici huc potest : sanguis arteriosus ab it ad partes , ut eas nutriat ; idem ergo usus ei erit in Liene. Verum si in hunc solum usum isthuc abiret sanguis arteriosus , in tanta copia , quâ advehitur , non opus erat. Hepa
quan

quantitate notabiliter Lienem exsuperat, & tamen longè minori sanguinis portione per minutulum arteriæ ramum adductâ nutritur. Arteriæ ad renes abeunt sunt majores, quàm pro nutrimento adducendo: Unde & publico usui, sero nimirum à sanguine lacunando, interserviant. Idem proinde de arteriis ad Lienem abeuntibus judicandum, & sanguis copiosus adductus non solum nutrit, sed publici usus gratiâ ad diversorium istud properabit. Arteriæ propterea mirabili decursu & plexu totum Lienis viscus perreptant, & transitum difficilem præbent; quod ipsum ejus quoque singularem coctionem ibi arguere videtur. Quod enim *Galenus* de hepate dicit, quòd in eo natura tantum plexum vasorum fecerit non secretionis alicujus causâ, sed ut morans in viscere alimentum in sanguinem perfectiorem mutetur: idem hæc potius de Liene affirmamus, quòd plexus vasorum iste mirabilis ad accuratiorem coctionem faciat. Et ut renes ex eodem arteriæ descendenti

his trunco sanguinem serosiores, ut sero-
rum superfluum segregent, accipiunt;
ita Lien naturali instinctu feculentiores
& terrestriores sanguinis partes copio-
so sero imbutas etiam recipit, ulterius
digerit, coquit, aptasque reddit, ut feces
in his latitantes in convenientibus locis
postea secerni queant.

Maximum autem hic de depuratione
sanguinis in Liene, beneficio tincturæ
hujus, nascitur dubium. Si enim in hac
officina sanguis arteriosus & feculentus
ulterius coquitur, ubi est locus, in quo
colliguntur feces melancholicæ, seu ubi
reperitur canalis, per quem educuntur?
Cum enim Lien *ὄζον ἡπαρ*, sanguinem
ut hepar ulterius coquit, sua etiam vasa
recrementis destinata, ut hepar habere
debebat. *Galenus l. c.* per vas breve ve-
nosum succum melancholicum (quem
multi succum etiam acidum vocant) ad
ventriculum deduci statuit. Quidam
ad pancreas eundem mitti crediderunt.
Verum meatum istum è pancreate ad Li-
enem nos nunquam invenire potuimus.

nec ab aliis etiam peritissimis Anatomicis unquam fuit visus; & vasis brevis usum longè alium jam antea descripsimus. Proinde, quod de corde dicitur, quod nimirum sanguinem quidem è chylò coquat, recrementa autem in aliis locis convenientibus demum segregantur; idem de Liene non negamus. Hic enim ope suæ rincturæ simili modo chylum tenuiorem ac aquosiorē in sanguinem commutat, sanguinem jam commistum ulterius coquit, fermentat, digerit, & ita disponit, ut recrementa, siue sint tartarea, siue serosa, siue ex utroque mista, in locis convenientibus commodius secerni queant. Itaque quoniam omnis sanguis è Liene ad hepar progreditur, nullum dubium, quin ibi statim crassiorē quandam bilem deponat. Reliquæ scorix siue retrimenta sanguini bono admixta iterum ad cor redeunt, denuò coquuntur, demumque partim in cerebri emunctoriis maximamque partem in pancreate, item in renibus; in nonnullis, ubi robur naturæ

ad-

adeſt, ubi abundant iſtæ ſcoriæ, per hæ-
morrhoides, veletiam per arterias mee-
ſaraicas ad inteſtina, imò in toto corpo-
ris ambitu per poros inſenſibili *Αλεπνο* voc-
ſegregantur. Viſcera quippe mutuam
navant invicem operam, & in unum ſi-
nem, ſanguinem nimirum & coquendū
& perficiendū conſpirant.

Quidam hîc forſan non leve move-
bunt dubium, dicentes: Iſtæ ſcoriæ me-
lancholicæ, ſi manerēt in ſanguine, quæ
turbas ad cordis regiam cerebrique ca-
pitolium translatae eſſent daturæ? Se-
ſi ſcoriæ iſtæ melancholicæ ad cor pri-
mò ferantur, antequam Lienem ingre-
diantur, quantas illi moleſtias agerent:
cū ſucci ſint naturæ pernicioſi; quid
agerent in ſpirituum officina? Illos certè
maximè inquinarent, & ſiphothymias &
ſyncopes producerent, aliæque cordi
graviffima concitarent mala. Hoc lu-
benter & æquo animo largiri poſſumus:
ſi ſcoriæ iſtæ melancholicæ ſint ſince-
ræ, & à ſanguine ſeparatæ fuiſſent; & ob
hanc rationem procul dubio, qui com-
ſti-

stitutionis sunt melancholicæ, & quibus multū humoris isti⁹ separati à sanguine, & congregati à Liene, in sanguinis massa accumulatur, dum cordis ventriculos per transeat, palpitatione cordis maxime infestantur. Novit quendam Melancholicum Cl. *Highbornus Disquisit. Anat. l. 1. part. 3. c. 3.* sæpius in die eā graviter vexari, cum pulsu sæpius intermittente, qui evacuato isto humore, liberabatur. Verū inanis est iste metus: Excrementa naturalia sanguini bono adhuc mixta justā proportionē sunt mitia: proprièq; loquendo nondum sunt excrementa, nec ullam ostendunt malitiam, sed sunt in fieri, quæ demum in locis convenientibus secreta sordium induunt naturam.


Quod si verò istæ partes excrementitiæ p. n. in sanguine cumulentur, proportionēque sanguinem bonum exsuperent, vel vitio ipsius Lienis non ritè munere suo fungentis, scoriasque coctione debiliori, non ita tincturâ suâ, ut in locis convenientibus sequestrari queant

ant, disponentis; vel vitio aliarum partium, quarum actio & usus est, separationem institueret, tunc certe innumerae calamitates exinde in totum corpus redundant. Ipse Lien obstructions, ventumores patitur. Cæteræ partes à sanguine recrementis Lienaribus p. n. referto malè nutriuntur. In coctionibus suis indies magis ac magis debilitantur & exinde decolor facies, affectus hypochondriacus, melancholia hypochondriaca aliaque symptomata, de quibus affatim in *præfat. hujus libri* diximus, oriuntur. Quod si istæ scorix diutius in massa sanguinea remaneant, ac degenerare incipiant, lividas corporis maculas, gingivas cruentas, capitis dolorem, hæmorrhagias narium, oris gravem dolentiam, tibiæ ulceræ, adeoque ipsum scorbutum & ossa cariola pariunt, & inde novas novorum symptomatum dant turbas, Lernamque morborum in microcosmo excludunt.

Lienis coctio læsa sanè in causa est, quod tartareæ salinæque scorix in renibus

bus simul cum urina separari nequeant; quare etiam multorum hypochondriacorum & scorbuticorum urinæ sæpius observantur planè pallidæ & aquosæ. Excell. *Mæbius Med Physiolog.* c. 61. Nobilem Saxonem novit, qui per multos annos laboraverat scorbuto, arthritide vagâ, cordis palpitatione, melancholiâ, appetitu prostrato, Lienis dolore gravativo, aliisque quam plurimis symptomatibus, in quo urinæ semper fuerunt aquosæ & pallidæ. Curatione autem ritè pro Liene reserando ejusque temperie reducenda institutâ, quamprimum urinæ è tartaro & salibus admixtis flavescentes iterum apparuerint, symptomata pedetentim cessarunt. *Talpini* l. 2. *observ.* 19. similem memorat historiam, ubi quidam cordis palpitatione à duro Liene laborans, eam semper triduo ante ex urinis crudis tenuibus præsagiebat. Imò & hoc consideratione dignum, quod Lienosi diureticis adhibitis multum juventur, ut *Secl.* 4. sumus dicturi; & Lienis tumores (quod *Hippocrates* 2. *Epid.* exemplo *Bionis*

comprobat) interdum urinæ profluvio sanentur. Tartarus nimirum & salia volatilia acida, quorum in omnibus corporibus proventus sat largus existit, videntur præter cordis actionem, peculiarem etiam in Liene desiderare, quâ denegatâ, remanent in sanguine confusa, nec commodè in renibus secerni possunt. Lienosi, ut hypochondriaci, scorbutici, plerumque sunt vel salivatores, vel sudoribus nocturnis diffuentes, vel utroque modo simul laborantes. Istud autem certum non fieret, nisi & Lien peculiari modo mediante scilicet tinctura sua, sero coquendo, ut in locis convenientibus commodius secerni posset, destinatus esset. Et ita non temerè dixit *Aristoteles*: animalia quæ bibunt, habent Lienem, renes & vesicam. Quare bibentes vesicâ & renibus opus habeant, satis est manifestum; sed quid Lienis ad istud negotiû opus erat? Extra omne dubium Lien non solum salia volatilia & tartarum, sed & serum sanguine adhuc mixto in tincturâ & coctione sua disponit, ut de

inde promptius obediant & secerni queant. Rectè ergò *Hypocrates l. d. nat. hom. t. 5.* Lienem  fontem appellavit, per motus à symptomatibus ferros, quæ à Liene malè affecto provenire solent.

Nostra ergò in dubitata sententia erit, Lienem partes sanguinis terrestiores, tartaro & salibus sylvestribus imbutas, sed sero copiosiore mixtas naturali instinctu accipere, singulari modo coquere, alterare, ac mediante suâ tincturâ ita disponere, ut postea in locis convenientibus, si non unâ vice, crebriore tamen transitu beneficio circulationis separari queant.

Si igitur Lien istum humorē melancholicū, tartareum, salinum, sero copiosiore dilutū, & sanguine adhuc mistum coquere debet, utique etiam opus esset, ut tota massa sanguinea (cū tota ejusmodi scoriis sit referta) per Lienis parenchyma transiret, ut omnes dictæ scoriæ coqui & ad separationem in aliis partibus disponi possent. Ex autopsia autema-

na.

anatomica percipimus, quòd minima fec-
rosi sanguinis pars per arteriæ magnæ
ramum ad Lienem deferatur; & ita
quamvis ista pars coqueretur, maxima
tamen pars semper in corpore remane-
ret cruda, nec posset segregari in suis lo-
cis, cùm coctionem genuinam in Liene
non fuisset experta. Verum enim verò
nobis verisimile videtur, non totam for-
lùm massam sanguineam crebriore cir-
culatione à natura institutâ tandem
Lienem transire, sed partem etiam quan-
dam sanguinis in Liene ritè coctam, &
fermento isto specifico seu tincturâ in-
istâ imbutam in regressu ad cor, juvari
totius massæ sanguineæ fermentatione
ut recrementolæ partes ad separatio-
nem disponi queant. Et quicquid ali-
de usu Lienis dixerunt, quòd sangui-
nem à corde transmissum immutet &
aptum faciat, ut deinde fermenti instar
Chyli in sanguinem mutationem pro-
movere queat, istud potius de eo affir-
mamus, quòd nimirum sanguis in Liene
peculiari modo coquatur, fermentetur

deinde tota massa sanguinea eâ tincturâ imbuta conceptum fermentum continuet, quo recrementa ita disponi possint, ut in locis convenientibus segregari queant. Mutuas, uti supra diximus, omnes partes tradunt in microscopio operas; & laxâ unâ, facillè alteratur, & in consensum ducitur. Cum ergo Lien vel leviter laxus gravissima in sanguificatione & nutritione symptomata, & plerumque melancholiam excitare soleat; quis ulterius dubitabit, cum singularem in hoc sanguificationis opere & imprimis in coctis melancholicis, tartareis, salinis ro mistis à sanguine separandis, eum de sanguinem hâc ratione purificando æstare operam.

CAPUT. VI.

De diversa Lienis Compagis auxilium, quod hisce actionibus defert, memorat.

Lienis usum & actionem esse non sanguificare tantum, sed tincturam etiam nobilem aliquam in se generare, ejus beneficio variæ operationes in æ-

conomia corporis humani perficiantur
nec non sanguinem à succis crassis, tan-
tareis & salinis liberare, eumque hanc
ratione purificare, hætenus diximus.

Nunc videamus, quàm benè omni-
ad actiones has egregias conspirent. S-
tum habet Lien in infimo ventre, ut i-
eodem cum cæteris nutritioni dicat-
partibus jaceret. In hypochondrio li-
nistro, ut majorem calorem è sin-
istro cordis ventriculo hauriret, ac cum
arteria magna, à qua non exiguum ar-
teriarum numerum suscipit, majus ip-
esset commercium. In nonnullis alti-
ri, in aliis humiliori sede gaudet. Ple-
rumque depressior est hepate; quod
non gratiâ humoris naturâ loca decen-
ora affectantis, quem *Galenus* l. 2. de
lem. c. 4. gravissimum, crassum, & ma-
veri contumacem vocitat, ob que
α τὰ πρὸν Lien sit, & curatione
per inferiora sollicitet, accidit, verum
ut fonti suo, arteriæ nimirum Spleni-
propior esset, tùm ventriculi etiam fu-
do veluti carbo igneus esset vicini-

Lienis quippe vicinitas maximè confert
 ventriculo; carbonum nimirum igni-
 torum ollæ circumpositorum instar
 χύλωσιν adjuvat. Nec deest omento,
 intestinis, renibus, pancreati, ut scilicet
 foveat hæc, & per eadem se expurget. Id
 quod factâ manu complet. Cùm abest
 Lien, bipartitum esse hepar, & lobum e-
 us sinistrum extendi cum *Bauhino Hoff-*
mannus statuit. Sub costis nothis re-
 conditus est, ut tutum haberet ab exter-
 nis injuriis locum.

Connectitur diversis partibus, ut ubi-
 que substernaculum habeat. Superius
 diaphragmati, ne decidat: inferius reni,
 ne corruat: posterius dorso, ne pronus:
 antè ventriculo, ne supinus fiat.

Substantia est *παρέγχυμα*, quia viscus
 est. Viscera autem omnia sunt paren-
 chymata, quoniam omnium usus com-
 munis est, non vasorum solum necessa-
 riam ad coctiones congeriem fulcire de-
 bere, sed singulares etiam coctiones ac
 alterationes in se ipsis instituere. Ac im-

primis Lien actionum hujusmodi nobilissimum Autor princeps est, & huic maxime coctio debetur.

Membranâ etiam tegitur Lien, ut cætera viscera. Protegmine enim opus fuit, quò illæsa tum parenchyma, tum ejus vasa servantur. Cum autem id densum requireretur & leve, non melius erat quam membrana, quòd plures contraheret arterias, quæ adeò protegmine firmiore indigent, tum quia laxior quoque ipsa est substantia.

Vasa obtinuit plura quam cætera viscera, ut arterias, venas, vasa lactea, lymphatica & nervos. Arteriæ numero suo coctionis negotium faciunt. Dissolvuntur enim & miscentur inibi omnia exactissimè; utile postmodum mandant ad hepar & cor, inutile, ad missoria relegant. Copiosæ sunt arteriæ, scribit *Galenus. l. 4. de usu part. c. 11*
 (1.) Crassum sanguinem ut subtiliorem
 (2.) fuligines expellant. (3.) Spirituum vitalium copiam suppeditent. Venæ ab arteriis præstolantur utrumque, quod

bus etiam aliquando munus excipiendi ex mente *Nic. Tulpii* & expellendi inutilia committitur. Venæ Lactæ chylo aquosiori & tenuiori vehendo, ut in eo in sanguinem laudabilem coquatur, inserviunt. Lymphatica verò vasa coctioni ac separationi meliori conferunt. Nervi spiritus animales in magna copia non pro sensu ac motu solum, sed pro tincturâ etiam ista nobili, cujus usus maximè ad nutritionem hominis ejusq; conservationem requiritur, in Liene præparanda ac elaboranda adportant; alimento deferendo cæterum impares. Anastomoses circulum constituunt Fibre quæ occurrunt, cum tincturæ præparandæ ac elaborandæ inserviunt, tum stabiliunt unâ & firman parenchyma, suspendendoque poros & cavitates efficiunt. Humiditatem è nervis eos ad se allicere, ac ita officium vasorum lymphaticorum ac glandularum subire, uti *Glissonius* & cum eo plures opinati sunt, veritati haud consentaneum videtur.

Quantitas ea, quæ coctioni ac defecationi respondet. Modò major, modò minor. *Adrian. Spigelius Fabric. corp. hum. l. 8. c. 14.* magnitudinem Lienis homini maximâ proportionem sui corporis esse, ut defecari sanguis felicius queat à crassis humoribus; cum homo animal sit sapientiæ studio additum. Et sanguis, quò tenuior sit, & purior, eò sapientiores reddat secundum *Aristot. l. 2. de part. animal. c. 2.*

Qualitas secundum temperiem considerata *Βονητήν* auxiliari videtur, quatenus calida est propter substantiam & propter calorem à corde copiosorem, ob quem *Ζερμην Φύσιν* Lien est sortitus. Hinc crassa concoquit felicius, ac tinctoria suâ singulari ita disponit, ut inutilia per singula corporis emundatoria eò felicius expelli queant.

Color de efficiendis testatur humoribus, nimirum rubris & laudabilibus, v. etiam terrestrioribus, feculentis, atris,

dividis , prout magis vel minus sunt tales.

Figura actioni & loco convenientissima est, quo minus vicinis partibus officiat; in quem finem cava antè & versus ventriculum commodior facta est, quem (1.) ideò non lædit. (2.) ut vasa in Lienem probè derivarentur, iterumque dimanarent. Posterius verò gibba reddita est, quò à compressione coarctatum tutior sit. Inæqualitas superficiei exasperata connexioni favet, & à vicina dependet. Sinum secundum posteriorem sedem conditum habet, ne mole jecur aut caudex cavæ ingrediens septi transversii motum afficeret,

CAPUT VII.

Tinctura illius nobilis ac singularis in Liene producti nobilitatem ac præstantiam in appetitûs corroboratione, chylificatione, sanguificatione, spirituum generatione, nutritione, seminum elaboratione & excrementorum sequestratione pertractat.

Tanta est hujus tincturæ in & à Liene producti nobilitas & præstantia, ut Medicorum ac Anatomicorum nemo ejus usum egregium satis describere queat.

Tincturam hanc (quam etiam succum acidum fermentativum dicimus) non ineptè lapidi illi Philosophorum universalis, qui ex ipsius auri essentia factus est, comparamus. Quemadmodum enim ille lapis universaliter tingit, cuncta metalla in aurum commutat, ac planè infinita alia efficere potest. Ita quoq; hæc tinctura in corpore humano sanguine

eo imbuunt colore, quo illud ipsum fove-
tur ac integrum conservatur. Cujus
præsentia omnia in corpore vegetiora
fiunt, spirituque copiosiore perfundun-
tur; & cujus absentia flaccescunt omnia,
& tandem torpent atque concidunt. Hu-
us ergo tincturæ ope ac beneficio appe-
titus in ventriculo excitatur atque cor-
roboratur, cibus in chylum coquitur,
Sanguificationis opus perficitur, spiritus
quàm vitales quàm animales generantur,
nutritio instituitur, semen in testibus
ac aliis spermaticis vasis præparatur ac
elaboratur, atque demùm partes sangui-
nis feculentiores, tartaro & salibus syl-
vestribus imbutæ, sed sero copiosiore
mixtæ singulari modo coquuntur, alte-
rantur & ita disponuntur, ut postea in
locis convenientibus, si non unâ vice,
crebriore tamen transitu, beneficio cir-
culationis, separari queant.

Appetitum ergo primùm excitat hæc
tinctura in ventriculo; naturâ enim suâ
acido-salinâ ipsum incidendo in partem
ventriculi summè sensibilem, punge-
do,

do, mordendo & vellicando eam, fieri motum excitando, procurat. Hinc falso sitim induci *Helmontius tract. pylor. rector. §. 26.* explicat. Et hæc sanguis ita admista, ac postea per arterias cum sanguine nutritio ad ventriculum delata à ventriculo per poros facile recipitur, ut fermentum suum acuat & auget. Quò etiam porrò *Iohan. Baptist. von Helmont in tract. de Pylor. rector. §. 22.* inclinare videtur, quando ait *Non morerentur schola, famem à splene in stomachum inspirari: splenem nemini novisse rerum agendarum scopum, viscus regendis decoctionibus princeps: ideoque appetitibus præfective effective, cui tamen pylorus assistit rector & exequutor. Pylorus nempe a huc placidum habet Blas liberum appetendi se, vel claudendi. Quod si sanitate movetur, ob cognitionem nium cognitorum stomacho, propter quos coctio & appetitus creatur à splene*

e, tanquam pylorus conscius sit secre-
 rum finium splenis. Et Cl. Franci-
 us Osuvaldus Grembsius Arbor.
 integr. & ruinos. l. 1. c. 3. de usu part.

6. usum Lienis esse dicit, ut vitale fer-
 mentum fabricet ex illo spirito salino
 balsamico, hoc si in debita dosi in sto-
 machum inspiratur, fiunt appetentiæ, si
 erò exorbitat, tunc morbi.

Coctioni ciborum, quæ aliàs chyli-
 catio dicitur, strenuè inservit etiam
 hæc tinctura seu succus acidus fermenti-
 tivus. Postquam enim concoctionis
 muneri ritè se accinxerit ventriculus, ci-
 bus mox emolliri ac dilui incipit, & par-
 tim potius, partim acidi hujus succi (in
 ventriculo reperti) beneficio, perma-
 nescere. Quinam liquor acidus, ratio-
 ne incisivæ penetrantisque, quâ prædi-
 tus est, facultatis, crassiores solidioresq;
 hos in minima frustilla incidit, discer-
 nit quasi, atque dissolvit: simul atque
 quicquid in eis est succi alimentaris, ad
 modum tincturæ, elicit & imbibit. A

cidus autem hic humor ex Liene in ventriculum venit, quod non alia pars accipit in corpore nostro sentiatur: quod edulgenti cocto Liene & præsertim suillæ gravitas quoque ventriculi à copia crassitie cibi emendetur: quod assumptis acida quævis, ut acetum eo que macerata cibi, succus citri, spiritus sulphuris, trioli salis, cremor tartari & similia ventriculi imbecillitatem sublevent & emendent: quodque extra corpus acetum fermentet terram & lac; quemadmodum atrabilis, chalcitidis acor Theriacam, fermentum acidum panes; & ita alius liquor per minima commixtus tunc tempore consistentiam tenuioris cremoris hordei coctione adipiscitur quam ubi accepit, tunc demum cibum intestina protruditur.

Succus autem hic fermentalis non per venas, sed per arterias cœliacas in ventriculum transudat. Quod nobiscum egregiè testatur *Cornelius ab Horelande in Hist. Oecon. animal.* ita scribit in *Oeconomiam animalis inspicienti, præ-*

Bum alterandum, & potum tum di-
to cibo diluendo inservientem; tum
ibi vicem suppletem, occurrit liquor
quidam subtilis, & attenuans saliva
ictus, ex arteriis per palatum disper-
s prodiens: cui cibo masticato, & de-
lutito accedit in stomacho ex arteriis
eiusdem liquor alius priori non admo-
rum dissimilis, præterquam quod ma-
ifestè acrior cibo in eiusdem facilitate
em concoctionem & alterationem di-
gerendo, fermentando, & quantum
atis, solvendo, eiusdemque essentia
parti nempe puriori & magis oleosa,
um in corporis nutritionem, tum in
spirituum generationem abitura) ex-
trahenda instar menstrui, ut Chymici
similes liquores vocare solent, ex aqua
forti & spiritu vini compositi, magis
appropriatus. In notis annexis probat
fferitū ex eo, quòd (1.) siccissimus cibus
ex gr. panis biscoctus, & similia, nullo
ad

adhibito potu, & digerantur, & concoquantur. (2.) Quòd alii liquores, gr. in vomitu liquor nonnunquam acidus, plerumque verò tenax & viscosus & (3.) impedito menstruo fluxu, menses per stomachum & os rejiciantur. (4.) Quòd appetitus videatur ab acrimonia similis humoris vellicando ventriculus fieri. (5.) Quòd oculi cancri, cortices ovorum & similia ingesta sine fructu assumerentur, nisi tali menstruo resisterentur. (6.) Quòd volatilia, imprimis gallinæ, tam nostrates, quàm calicones in stomachis suis filices, vitrum ipsiusque aurum (ut partim ex fide dignis auctoribus, partim propriâ experientiâ comprobatus est) solvant & consumant. Unde tandem concludit, bonam vel malam digestionem cibi in stomacho digestionem, fermentationem vel concoctionem, magis huius liquoris acrimoniæ, vel aciditati, aut subtilitati, sive cruditati, aut viscositati quàm ipsi stomacho deberi.

Alb. Kyperus Anthropolog. pag. 34. tandem quæstionem tractat, an scilicet

aliquid ex arteriis, quasi fermentum excidat in ventriculum? Non nego, respondet, spiritum vitalem excidere, an aliud quid nescio, saltem nullum evidenter ostendi potest, nec ratio cogens afferri. Nam si spiritui illi vim inesse attenuandi, incidendi, rarefaciendi, calefaciendi que statuamus, ab ipso fermentatio omninò fieri potest. Quando autem ista sic pono, loquor de statu naturali: nam praternaturaliter quin aliquid ventriculo communicari queat, nullatenus dubito.

Interea succum hunc acidum ventriculo adeò necessarium esse, ut absque ejus auxilio, sanum chylicationis munus, ut par est, præstare nequeat, minimè dubitandum est. Quoniam certissimum est, homines istos, quibus defecerit iste succus acidus, de infauusta admodum infelicique ciborum concoctione semper conqueri; nec infrequens est, talibus semicrudos atque integros assumptorum

mor-

morfulos per inferiora excerni. Quod
 haud obscure significasse videtur perpee-
 tuus noster Dictator, *Hippocrates*, ubi
 inquit, (*sect. 3. aph. I.*) *in longis intestinor-*
um levitatibus, si rubrus acidus (scilicet
 ex con simili humore ortus) *fiat, qui prius*
non erat, signum bonum est. Nec minus
 certum est, isthuc acidum, ut non nisi à
 calore moderato excitari foverique, ita
 discuti atque penitus extingui ab immo-
 derato. Atque hinc est, cur tum in leu-
 cophlegmaticis frigidaque ventriculi
 intemperie laborantibus, languet adeo
 ac de jicitur appetitus: tum in febribus ac-
 utisque calidioribus morbis, in totum
 destruitur; haud absimili prorsus ratio-
 ne, ac massa farinaria in frigido loco dif-
 ficulter fermentatur, in calido verò ne-
 quaquam.

In sanguificatione etiam hujus tinctu-
 ra usus sanè laudabilis est. Ad perfe-
 ctam namque sanguinis elaborationem
 plurimum confertur à Liene & ejus tin-
 ctura; Vereque hujus demum bene fi-
 cio & ope aptus redditur sanguis, e quo

vita-

vitales spiritus generentur, & in actum
suscitentur: dum nempe beneficio Lie-
nis fermentatur sanguis, qui per arterias
coeliacas ad ipsum affluit, ac per veno-
sum ramum splenicum ad ipsum hepar
remeat: quâ ratione item hepatis conti-
nuè fermenti quædam portio communi-
catur, ipsique sanguini permixta rema-
net. Nihil novi ergo est, quando san-
guis in Liene fermenti cujusdam sangui-
nei naturam induit, cujus interventu fa-
cilis & celerius in sanguinem abeat
chylus, seu potius ipsum rudimentum
sanguineum in hepate confectum, vel
chylus utcumque in hepate elaboratus ac
sanguini perfectiori ibidem permixtus,
hoc est, sanguis chylosus ac crudior et-
iamnum, cui itidem id chyli, quod
per ductum thoracicum subit, in cordis
auricula dextra permiscetur. Quare
etiam *Iacob. de Back Dissertat. de Cordi.*
§. 2. c. 6. non in alium finem per spongio-
sum parenchyma filtratum, ab arteriis
acceptum sanguinem tam liberaliter lar-
gitari opinatur, quàm diluendo chylo, ut
à pan-

à pancreate & mesenterii glandibus co-
taminatum, rubroq; colore tinctum,
splenicis & mesentericos ramos effu-
sum probè diluat, & salutarem hepatis
advehat.

Quando igitur hæc tinctura hepatis
Liene communicatur, sanguis in ejus pa-
renchyma jam influxurus, reviviscere
fermentari statim incipit. Et pulsatio
portæ intra hepatis confinia motus, testatur.
*Gualt. Charletonæ de Oeconom. animæ
Exerc. Physico Anat. 7. artic. 25. in cau-*
est, ut sanguis (præ itineris usque à cœ-
de huc emensi longitudine jam prop-
languescens, deque calore suo hauri-
parum remittens) & fermentatione
ad ipsius perfectionem adeò neces-
sariam, & micationem, quam in venul-
rum angustiiis planè amiserat, hîc recu-
peret; utque eo pacto ad quendam viri-
litatis gradum, talem nempe, cujus re-
spectu parenchymati hepatis vivificandi
sufficiat, restituatur.

Maximè ergo fermentum aliquod ad
sanguificationem requiritur; quod, cû

si natura deficiat, bono cum successu artis operâ suppletur, etenim sales fixi, alcalia, extracta, digestiva, deoppilantia & imprimis remedia chalybeata tantum sub hac ratione juvant, quod velut fermento quodam sanguinis ebullitionem aut imbecillem aut ferè extinctam de novo restaurant.

Ista proinde fermentatio sanguini accidit vel ab interno suo principio, vel à tinctura sibi à Liene communicata. Ab interno principio, uti scribit *Gualt. Charleton de Oeconom. Animal. Exercit. Physico- Anat. 5. artic. 16.* singulis momentis recenset calorem nativum, accensum perpetuò constans spiritibus; idque motus cujusdam intestini ratione, quò subtiliores, æthereæ magisque agiles sanguinis particulae sese extricare, expandere, limitesque suos ampliare gentiant; dum elementa ejusdem crassiora eorum motui reluctantur. Unde lustrata quædam, sive antipraxis, inter particulas sanguinis heterogeneas, diversis motibus, horsum, versum, sursum, deorsumque

sumq; alternatim agitas, exoritur, quæ
 fermentationis speciem exactè referent
 fermentatio vitalis haud immeritò nunc
 cupetur: essentiam quippe caloris gen
 ralem à *νεβως* exhibet; eâque cessante
 te, sanguis veluti emortuus, genioque
 suo privatus, illicò putrescit. Quibus
 subnectatur & hoc unicum: fervent
 hâc luctâ, nimirum, spiritus nunc cæter
 præpollentes, totam sanguinis massam
 attollere & tumefacere: nunc verò el
 menta crassiora (auxiliante simul corde
 & arteriarum systole) victoriam vic
 tim obtinentia, motum illum retunde
 re; indeque fieri in ipso sanguine undu
 lationem, sive palpitationem illam
 quam sanguinis micationem dignè no
 minârunt *Harvæi* sectatores.

Deinde tincturæ nobilis in Liene ge
 nerati virtute sanguificatio perficitur
 Quare *Cornel. ab Hogelande* *Elisio*
Oecon. animal. peculiarem sanguinem
 nimis subtilis deorsum à corde missi fer
 mentationem in Liene, ubi tinctura har
 generatur, & vires suas egregiè & mir

liter exierit, collocat, quod pluribus
gumentis probat, & tandem conclu-
t: ipsum Lienem sive ejusdem sub-
stantiam purum ac perfectum esse
mentum, cujus actione & fun-
ctione sanguis in salutarem corpo-
is nutritionem, spirituumque gene-
tionem fermentetur ac præparetur.
Quod quidem primâ fronte planè tem-
endum videtur. Sed siqui considera-
erimus, ventriculos vitulorum per ali-
ot dies aquâ falsâ maceratos, & dein-
e ab omni humore tunicis in hærente,
tus extraque repurgatos, ex siccatos,
in aqua simplici coctos vim adhuc
abere lac coagulandi, quod muliercu-
s rusticis pro caseis conficiendis in usu
quotidiano est; vix temerè ridebimus,
Lieni & cæteris viscerum substantiis
ciam fermenti vis attribuat. Verifi-
ile ergò nobis videtur, non totam so-
am massam sanguineam, crebriore cir-
ulatione à natura institutâ, tandem
lienem transire, sed partem etiam
uandam sanguinis in Liene ritè co-
tam

Etiam, & fermento isto specifico imm
 tam in regressu ad cor, juvare teo
 massæ sanguineæ fermentationem
 recrementosa partes ad separationem
 disponi queant. Et quemadmodum
 Lien sanguinem à corde transmissum
 immutat & aptum facit, ut deinde
 menti instar chyli in sanguinem mu
 tionem promovere queat : ita etiam
 sanguis in Liene peculiari modo coag
 tur, fermentatur, & deinde tota ma
 sanguinea eo fermento infecta com
 ptum fermentum continuat, quò ex
 menta ita disponi queant, ut in locis
 convenientibus segregari possint. Cuius
 ditus ergo à Divino rerum universitatis
 Architecto Lien est, ut in vectum
 pœnitiores sui parenchymatis recep
 sanguinem in summè activi fermenti
 naturam exaltet, & promoveat, et
 lemque refundat in venas.

Hunc usum Lienis nobilissimum
 præstantissimum adhuc in dubium ve
 cant *Marcell. Malpighius & Gualt.*

arleton. Marcell. Marpighius de vi-
r. Structur. Exerc. Anat. de Lien. c. 6.
g. 127. & 128. ita dissertit: Apud ple-
sq; probabilissimum adhuc cense-
r, in Liene crassiorem sanguinem à
propria arteria transductum dissolvi
attenuari, ut perfectior ei sangui-
s natura communicetur, ne residu-
m sanguinis ab hoc inficiatur. Dubi-
ndi tamen nobis ansam præbet dili-
gens sanguinis consideratio ab arteria
lenica excreti, qui non majorem
eam reliquis crassitiem possidet.
Pag. 138. Quid sit illud, quod
Liene sanguini affunditur aliisque
communicatur, adhuc est obscurissi-
um, multaque eget indagine; ete-
m separatus à glandulis succus sejun-
im recolligi, & ad sensum truti-
im revocari nequit, unde sicut in
teris fermentantibus visceribus, ut
ssim de ventriculo experimar, com-
ple-

plexus ille humorum, scilicet glan-
ularum, & Lienis cellularum expo-
nendus est. Hic igitur mediâ des-
tillatione, liquorem exhibet empyri-
ma spirantem, quod plurima destil-
la etiam ex carnibus, rebusque sulphu-
reis concomitatur. Sanguini rec-
ter ab animali extracto, & concre-
destillatum miscui humorem, ut
aliqua mihi affulgeret, & illisò e-
ratâ quâdam bullâ, nigrefactus
sanguis, quod tamen ceteris destil-
latis, oleo sulphuris & salis spir-
familiare postremò deprehendi,
tandem aspersus ille cruor quasi
Eturâ quâdam super assatus riguit.
lic insuper, extracto ex Liene s-
tentavi, quod consimili fœtet em-
reumate, & si gustetur, Primò ac-
tatem exhibet, & tandem amari ti-
qua profusè linguam inficit. A-
ciditas illa, quæ primò occurrit, su-

les activitatis ignis sale melicientis,
passim hesitantes video Chymicos,
verò à constitutivo principio emer-
t, ignoro, sed tamen Lienis carnem,
cellularum scilicet membranas acorem
habere qualis à ventriculis quorun-
dam brutorum erumpat, unde acidi-
tas ei connaturalis fortassè erit. Ut
item ejusdem vires rimarer, lacti
adhuc fluido affundi curavi, & tanta
etis subsequuta est deturbatio, ut a-
lissio propria substantiæ modo, & co-
ribus, fætens redditum fuerit, quod
em in sanguinis sero eadem ratione
mixto accidit. Pluribus miscui,
iritu nempe vini, oleis & diversis
iam salibus, nec quicquam novi ex-
tatum vidi, quare ex adductis non
incongruum fortassè est censere, in ex-
trato sale multum sulphurei, summe-
re activi contineri, quo aliorum e-
am compages solvatur, & spirituo-
sif.

stioribus aliqualis libertas, & exa-
ctio donetur.

Ol. Gualt. Charleton Tract. de Scorb
c. 6. artic. 10. à Lienaris fermenti part
nis cum Excell. Marcell. Malpigg
Exerc. Anat. de Liene c. 6. pag. 139. & 140
dilcere percipit, si illud in Liene con
Etum alii nulli inservit usui, nisi ut p
enniter permeanti sanguini admistui
universam ipsius massam sua vi ferme
fica imbuat; cur ita fermento noviter
prægnatus rediensque à Liene sanguis,
immediatè in venam cavam deducit
sed per longas venæ portæ ambages in ip
hepatis substantiam. Certè si ferme
tum universo sanguini tantum utilita
esset præstiturum, frustra per anfractuos
los venæ portæ ac hepatis labyrinthi
inibique perturbatam sanguinis con
stentiam, quæ bilis separationem nece
sariò præcedit, circumduceretur; &
proximior simul & patentior via occu
reret per venæ cavæ truncum: in qu
recto transductu rami splenici sang

exonerari posset, sicque tota sanguinis
massa quin & pręcordia citius & prom-
ptius expectato fermento inficerentur.
Et artic. 3. quę sparsim de hac quęstione
dixit, in unum quasi manipulum con-
trahit, dicens: Cum fermentum sup-
positum nulla satis manifesta sui indi-
cia, neque in dissecto nec in dissoluto
Liene hactenus (quod sciam) exhi-
bit: cum ex ipsis etiam hominibus
haud pauci Liene destituti, non in-
ommode tamen vixerunt; cum Le-
nem egrediens sanguis ei, qui ipsum
am ingressurus est, usque eo persimilis
oparet, ut per arduum sit, alterum ab
altero discriminare: Et cum supposi-
to fermenti istius usus vix conveniat,
et nescio, quo exquisito artificio in
Liene elaboratum, mox obtundatur,
& reprimatur in hepate: his inquam,
admissis, equidem non video, quin mi-
seri fas sit de ejusdem existentia dubi-

*tare donec immeritò dubitâsse certis-
ribus experimentis constiterit. V*
rùm dubia hæc Lienis usum egregium
non tollunt; nec necessum nobis est,
multis ad ea respondeamus, cum eorum
argumenta non ita firmo stare talo
deantur. Breviter autem dicimus: Il-
lèt sanguis Lienis confinia egrediens
dem per omnia appareat cum ingressu
ro; & quamvis quis duas conchas re-
pleat, alteram sanguine sectâ arteriæ
splenicæ effluxo, alteram eo, quem apo-
tus effundit ramus splenicus venosus
& nec colore, nec sapore, nec consisten-
tiâ, nec pondere minimum discrimini
reperiat, quo hunc ab illo distinguere
valeat, attamen magna est differentia
quæ oculis nostris non ita subijcitur
cum enim sanguis in loco suo natura-
est, & circulum agit, alium colorem,
alium saporem, aliam consistentiam,
que aliud etiam pondus habet, quam
in loco violento hæret, ac aëri exponi-
tur. Et quanquam etiam sanguis eggre-
diens cum ingressuro per omnia firmo

apparet, in se tamen majorem activitatem habet, quam non ita sensibus nostris percipere possumus; satis nobis sit, quòd egregias suas operationes exarat, taleque in corpore humano præstet, quod maximè ad vigorem & conservationem ejus faciat. An destillatione vel extractione aciditas ista ex Liene comparari possit, ipsi adhuc sunt dubii, nec quicquam certi de eo determinare possunt: aciditatem accipiunt, an verò illa sit soboles activitatis ignis sale melientis, an verò à constitutivo principio emergat, ignorant. Hoc interim facientur, multum sulphurei, summeque activi in exarato sale contineri, quo alioquin etiam compages solvatur, & spirituosioribus aliqualis libertas & exaltatio onetur. Fermentum quoque hoc Lie-
nis lacti affusum non ita id ipsum coagulat, ut acidum illud in vitulorum ventriculis contentum, sed potius deturbat; fermenta enim sunt diversa, & in aliisque aliis visceribus etiam alias atque alias operationes efficiunt; hoc no-

Q²

strum

strum Lienare non coagulat, sed incidit, dissolvit, rarefacit, ac omnia subtilitate suâ penetrat. Liene destituti non ita commodè, sed pessimè potius, experientia testatur, vivunt; Lien enim ad nutritionem ac conservationem meliorem facit, quæ in eo carentibus desiderantur. Nulla quoque commodior via, ut antropia anatomica monstrat, est, quàm si Structura hæc Linearis in universum corp^o distribuatur, quàm si ramis splenico in venâ portæ; & exim in cavam, & ex ea in cor ducatur; quo, spirituum vitalium miscellâ, majores vires accipit, ac ita sanguini universi beneficio circulationis, multum utilis præstat: In hepate demùm non coarctatur & reprimitur ejus vis, verum potius in eo sanguinem languelcentem deque calore suo præ itineris usque corde huc emensi longitudine haud parum remittentem excitat, fermentat, chylum etiam diluit, & motum meliorem promovet.

Quid dicamus de spirituum vitali

de animalium generatione. Ea maxi-
mè beneficio hujus tincturæ celebratur;
nisi enim hæc sanguinem crassorem in-
adat, dissolvat, eumque ita subtiliorem
et puriorem faciat, ex eo neque in cor-
de vitales, neque in cerebro animales
spiritus generari queunt. Ut spiritus
vitales generentur & in actum susciten-
tur, calor cordis vix sufficit, nisi tinctu-
ra hæc accedat, & fermentationem in
orde simul concitet. Et ut spiritus a-
nimaes ex spiritu vitali generentur, vix
sufficit sola alteratio, quam refrigera-
tione fieri dicunt. Sic enim etiam in
mediculis talis generatio institui posset, ut
in ad refrigerium locus satis est commo-
dus. Nullum aliàs viscus in toto cor-
pore, quod non suo modo & coquat
sanguinem & perficiat. Cerebro in
tanta mole à natura formato, & diligen-
tissimè munito, quare suam quoque co-
ctionem denegare velimus, non vide-
mus. Idcirco cum spiritus vitales san-
guini arterioso immersi in cerebro exal-
entur, & exinde fiant animales, nullum

dubium, quin coctione novâ in cerebro parenchymate instituta hoc fiat negotium. Nihil enim novi aliàs in corpore humano generatur, nisi præviâ coctione atque fermentatione, quam tinctura nostra Lienaris non parùm promovet.

Hujus ergò tincturæ auxilio, sanguis non spiritu solùm vitali perfunditur, verùm ita etiam disponitur, ut arteriæ adductus à singulis corporis partibus attrahatur, retineatur, alteretur, appropriatur, agglutinetur & assimilatione suam substantiam convertatur; atque sic proba & inculpabilis nutritio peragatur.

Seminis elaborationi magnum etiam auxilium præstat hæc tinctura. Sic *Hemontius Tract. de Duum virat. §. 4.* Spermatis coctionem fieri in testibus splene scribit. Et *Tract. de asthm. cussi.* Lienem Veneris nidum appellat. Notatu dignum observavit *Cl. Fridericus Deckerus in not. & observ. ad praxin Barbett. l. 4. c. 10.* in cane fœmella Li-

et jam destituta atque curata ; nempe
quod post annum circiter à dissectione
atulire incipiens, cumque aliis canibus
bis terre congressa , nunquam conce-
berit ; quare nonnulli etiam Lienivim,
sanguinem prolem generandi aptum, ad-
scripserunt. Egregio autem huic mu-
lieri inservit Lien, quatenus tincturâ suâ
d sanguinis arteriosi spiritu vitali co-
pioso mixti & ad spirituum animalium
generationem facit. Seminis namque
laborationem hoc modo se habere exi-
stimamus, sanguinem nimirum arterio-
sum, spiritu vitali copioso mixtum, ut &
spiritus animales (an etiam humor qui-
dam oleaginosus ? Non negabimus)
per nervos adychi, in labyrinthis an-
traxibus & membranis nonnihil alte-
ari, misceri, demumque parenchymati
estium instillari, & ibi à peculiari fer-
mento (quod odore cujuslibet anima-
lis graveolentè innotescit) coqui, par-
tim ipsos testes nutrire, partim in semen
nutari, & demùm ad parastatas mitti,
ubi colligi, nonnihil fermento continua-

io perfici & inerasari, seruarique pro
congressu Venereo. Hinc semen vi
detur esse *μετρίωμα* nutrimenti testi
m, quod in principio est instar seri um
ctuosi liquidum, & in parastatis à fer
mento proprio ulterius perficitur &
condensatur.

Atqui tandem hujus tincturæ ope a
beneficio partes sanguinis terrestriores
tartaro & salibus sylvestribus impræ
gnatæ, sed sero copiosiore mixtæ ita co
quuntur ac disponuntur, ut postea in loc
eis convenientibus, si non unâ vice, cre
briore tamen transitu, circulationis ac
miniculo, segregari possint; quæ de re
prolixius in capite sequenti disc
remus.

CAPUT. IIIX.

Lienem non immediatè per certos
quosdam meatus, partes sanguinis re-
frictiores, tartaro & salibus sylvestri-
bus imbutas, sed sero copiosiore mix-
tas expurgare; verum tincturam e-
us coquere, fermentare, digerere ac i-
ta disponere istas, ut postea in singulis
corporis emunctoriis, si non unâ vice,
turbidior tamen transitu, beneficio cir-
culationis commodius segregari &
expelli possint, docet.

QUatuor esse locos, per quos Lien
expurget humores pravos, scribit
Hippocrates l. de morb. 4. Scilicet per os
nares, urinas & podicem. Alii gene-
ales tres in praxi occurrentes recen-
sent, ut sunt (1.) Renes, & vesica. (2.)
utrisque, & (3.) Os. Nos Lienem non
immediatè per hosce meatus jam recen-
tior partes sanguinis feculentiores tar-
tar.

tareas & salinas, sed fero copiosiores mixtas expurgare; ast tincturam ejus sanguinem commissum coquere, fermentare, digerere & ita disponere contendimus, ut recrementa, siue sint tartarea, siue serosa, siue ex utroque mista, in locis convenientibus commodius fercerni queant. Itaque cum omnis sanguis à Liene ad hepar progrediatur, nullum dubium, quin ibi statim crassiores quandam bilem deponat. Reliqua scoriæ siue retrimenta sanguini bene admixta iterum ad cor redeunt, denuo coquuntur, demumque partim in cerebri emunctoriis, maximamque partem in pancreate, item in renibus, in quibusdam, ubi robur naturæ adest, ubi abundant istæ scoriæ, per hæmorrhoides, vel etiam per arterias mesentericas ad intestina, imò in universo corporis ambitu per poros insensibili transpiratione segregantur. Viscera nimirum omnia mutuam navant invicem operam & in unum finem, sanguinem nimirum coquendi & perficiendi, sicque eum

Excrementis liberandi collimant.
Ut autem eò melius scopum nostrum
attingamus, manifestiores vias, per quas
humores excrementitii, tartarei, salini,
sed sero copiosiore persusi à Liene bene-
ficio & ope suæ tincturæ cocti, alterati,
digesti & benè dispositi expurgentur,
contemplabimur.

Per ventriculū primū & postea
per os eliminantur excrementa tum cras-
sa, tum aquosa. Et illam expurgationem
per os fieri existimant veteres per vas
breve, quod in sinistram ventriculi par-
tem (uti *Baehnius* observavit) inseri-
tur, ut succum crassum & melancholi-
um, qui in Lienis nutrimentum muta-
ri non potuit, in ventriculi fundum, ali-
quando ejus os eructet, qui torpescen-
tem appetitum suā aciditate excitare
possit. Sed vasis illius existentiam mul-
ti in dubium vocant. *Vesalius* *Anato-*
nicus olim oculatissimus & exercitatis-
simus l. 5. c. 9. *Fabric. corp. hum.* de usu
jus nihil afferre audet. *Neque* inquit,
lectio illud luculenter demonstrat.

Primo

Primò enim nullum meatum illiquo-
 bilis in intestina repurgatur, similem
 esse haud ambigo. Vena autem, quae
 sinistro ventriculi lateri implantan-
 tur, non à Lienis prodeunt corpore, sed
 ab illis, quae Lieni inserantur. No-
 stram de vasis hujus usu, item de succo
 melancholico sententiam in prædictis
 jam adduximus. Quòd verò aliquan-
 do humores nigri, & melancholici pe-
 os ejciantur, diuturna penè suadet ex-
 perientia, Et *Valverda Anatom. l. 6.*
9. §. mentionem facit *Cardinalis Tibi-*
qui vomitione sanguinis defunctus
mortis causam inquirentes Medici dil-
secto corpore, ac compresso ventriculo
Lienem inturgescere; compresso Lien-
ne, è contra ventriculum inturgescere
viderunt. Sed hoc non ex vase aliquo
Liene naturaliter contingit, verùm cum
humor iste in sanguine cum eo undique
mixtus abundet, nec à Lienē continer-
queat, ex arteria coeliaca, à qua Lienē

et plerique veterum ac recentiorum Anatomicorum adstruunt, porriguntur
hæ arteriæ, facile in ventriculū eructari
potest, atq; sic non à Liene immediate
in ventriculum ejicitur, sed à Liene be-
neficio suæ tincturæ, fermentatur & se-
paratur; ac cū in illo contineri nequeat,
in venas unà cum sanguine propellitur, &
ab iis mediante corde in arterias emitti-
tur; sed cū naturaliter et vi cognationis
ad Lienē tendat, at in illo contineri ne-
queat, ideo natura in arterias illas, quæ
vel ad Lienem ducunt, vel quarum origi-
nes quàm proximæ sunt illis, emandat.
Quales sunt primò arteriæ cœliacæ sur-
culi ad ventriculum delati; & per hos in
ventriculum facile eructari poterit. Sic
hypochondriaci nonnulli acidum, non-
nulli *amur* quid vomunt; & in scorbuto
salivæ proventus uberrimus est, uti & in
quartana, adeò ut salivationē in numero
ignorum ejus potuerit *Galenus*. Hinc
etiam melancholici sputatores & sali-
vatores insignes esse solent. Et *Aëlius*

zetrab. l. serm. l. c. 9. in quartana vomitu præcipiunt.

Confirmat id ipsum *Hippocrates Epid.* qui balbos fieri dicit melancholicos ob aquam translata ad ventriculum, & inde propter communem tumorem ad os & linguam. Confirmat hoc pariter exemplo *Cl. Hoffmannus lib. de usu Lien. c. 17.* Amicum habuit ex intermis, ejusdem cum ipso professionis & aetatis, qui toto habitu omnibusque signis verè melancholicus fuit. Is præsertim cum loquutus est, tam abundavit salivæ ut creberrimè coactus sit interrompere sermonem, & exspuere. Quod nisi fecerit (fessus est ille) adeò illi læsa fuit concoctio ventriculi, ut, nisi voluerit agrotare, pudoris rationem habere non potuerit.

Salivalis hæc materia partim ex ventriculo adscendit, & à tonsillis excipitur partim verò ex arteriis in ductus salivales, qui ad radicem linguæ conspicui sunt, deponitur, si copiosa hæc sit. Si

Cl. Joh. Theod. Schenckius, cujus memora-

in benedictione est, ut de se ipso. *Ex*
Anat. 6. l. 1. f. 2. c. 24. scribit, gravi sa-
tiatione post peractum prandium &
enam detentus fuit. Hæc duravit ad
as propemodum horas, postea sudo-
s successerunt multi, & alvi fluor, cre-
â vice noctu interdumque ad septima-
s tres usque affligentes. Atqui præ-
tim arteriæ fluxum hunc salivæ sup-
ditant. Cùm enim liquor iste neces-
siò mediantibus vel venis vel arteriis
per palatum & fortè gingivas in os im-
mittatur, atque per circulationis re-
ctas constet, sanguinem, (& si quis a-
liis liquor) per venas à circumferentia
centrum, id est, à corporis extrema-
ad cor ferri; & è contra, quicquid di-
tribuendum vel expellendum sit, per
rectas arterias distribui & expelli; neces-
siò sequitur, dictum liquorem saliva-
m non venis, sed arteriis mediantibus
os immitti.

Non verò semper aut acida, aut salsa,
ut insipida salivatio hæc animadverti-
tur, *Helmontius* excrementum hoc
fa-

fatuum per se censet inquinamenta
 scipere eorum quæ comitatur. Alter
 ri autem melancholicum humorem
 desciscere à suo genio facile posse, et
 vis notum est. Et si crassum illud
 excrementum, facile in tenue mutari
 potest. Tota siquidem massa sangui-
 nea serescere apta nata est. Sanguis
 travasatus aëri expositus licet crassus
 sit, in serum tamen resolvitur, ut
 nobiscum Excell. Thom. Bartholinus
*Vasis Lymphaticæ & acutissimus Bern-
 Suvalve in Disquisit. Therapemic.*
 stantur.

Ad intestina deinde & alvum tam crassos
 si quàm aquosi humores excrementi
 per arterias mesaraicas propelluntur.
 Quamvis enim melancholicorum plerumque
 sint sicca alvi, tamen non omnes ta-
 lunt; & sæpè quoque Lienosi sanantur
 si illis superveniat dysenteria, quæ non
 diu durat; vel etiam diarrhæa soluta
 vel si etiam accedant dolores colici, quæ
 certis temporibus recurrentes liberantur.

mines à symptomatis melancholi-

Hoc non ignotum fuit Aristoteli,
in 1.3. de part. animal. c. 7. ita scribit:
ἡ τὴν ἐν ταῦτα παλίσροισαν τῆς ὑγρό-
της, πολλοῖς καὶ χειλίας ὑγροῦ, γί-
νεται τοῖς ἀσληνῶσιν, ὥστε σκληραῖ
εἰς λίαν ὑψηλοῖς ἀλλὰ τὸ αἰτιώμενα.
καὶ τὰς ὑγρότητας. Lienosis quibus-
dam alvus est humida, cum, qui ex
cestinis ad Lienem ivit humor, ad
cestinarefluit: Quibusdam est sic-
cum humor non cendit eò, ubi fuit,
sed ad vias urinarias obstruitur.

Ejusmodi autem humores crassi & a-
cidi, si quantitate nimium peccent,
inmodissimè per alvum medicamen-
expurgantur.

Tertio, succi illi terrestres, tartarei &
ini, sed sero copiosiore mixti undiq;
arteriis & venis per totum corpus
trāsunt. Paulò infra emulgentes ar-
terias oritur mesenterica inferior, quæ
ad

ad rectum intestinum & anum descen-
dens, arterias constituit hæmorrhoidi-
les, quæ se & in venas hæmorrhoidales
externas à cava, & internas à porta ex-
nerant. Quæ (internæ præcipuè)
copiâ horum humorum gravantur, ex-
herant, & spontè sæpè aperiuntur, unde
fluxus hæmorrhoidalis oritur.

Ad nares quartò sæpius demandantur
ejusmodi humores vitiosi. Hinc Spas-
netici per hæmorrhagias narium sanan-
tur, uti *Bion* apud *Hippocratem* l. 2. *E-*
dem. f. 2. t. 27. Facilis via est ex vena sp-
nica ad cor; ex hoc & arteria magna
caput & arterias carotides certissimè
est ductus.

Ad renes quintò per arterias em-
gentes, & ex illis ad ureteres & vesic-
ejusmodi humores tartarei, salini, nat-
ræ molestiam agentes, amandantur; præ-
cipuè cum sint aquosi, multamque cras-
sèro cognationem habeant. Atque hæc
ejusmodi urinæ sæpius cum bono suc-
cessu fiunt. Sic *Hippocrates* in l. de
tern. affe&ct. lienosis diuretica jubet præ-

ribere. Et l. de extern. affect. biliosis,
 i magnum Lienem habent, ac ideo
 avi ac fædi coloris sunt, malignaque
 ontrahunt ulcera, urinas vult subduci,
 uare etiam 4. de morb. & 1. de morb.
 ulier. hydropis causam esse ait, si Lien
 on dimittat aquam ad vesicam. Galenus
 quoque l. 1. ad Glaucon. c. 11. in omni
 quartana jubet uti diureticis. Et l. 2. ad
 Glaucon. c. 11. Lienem purgat per uri-
 nas. Idem l. 7. simpl. Medicam. Cap-
 ares ait Lienes vacuare per urinas. Imò
 erò pleraque omnia splenica sunt diu-
 tica, ut videre est in longissimo Cata-
 go, quem texit Reusnerus in lib. de Scor-
 ero.

Quemadmodum verò in affectibus
 lenis urinæ sæpè nigræ apparent, &
 lenetici atque melancholici dicti ab-
 ondant sero, ut ex Hippocrate & Galeno
 otum; nam serum crassissimi humoris
 ehiculum esse debuit; quartanarii quo-
 ue copiosissimè sudant me juntque; ita
 usmodi quoque Lienes affectus per u-
 nam copiosam, & nonnunquam atro-
 rum

rum humorum per urinam evacuationem
 felici ac bono cum successu solvuntur.
 Quemadmodum refert *Anton. Valetius*
in Exerc. ad c. 40. Hollerii de morb. in
tern. de Viro quodam religioso, cui ter
aut quater in anno, præcipuè vere & au
tumno incuntibus, Lien intumescebat
cum dolore hypochondrii sinistri, &
sublividus toto corpore fiebat, ut in icte
ro nigro; sensimque deterius habebat
sed tandem urinis nigricantibus emissis
per quinque, aut septem dies, pristina
sanitatem recuperavit, idque illi per an
nos duodecim aut quindecim accidisse.
 Similiter, ut *Hoffmannus l. de usu Lien*
c. 15. narrat, Religiosus quidam fuit to
to habitu melancholicus, qui perpetu
mejebat triplo plus quàm bibebat.

Hisce tandem addimus evacuationem
 per sudores: multum enim illius humo-
 ris hoc modo evacuatur, veluti ex sudoribus
 illis criticis in febribus quartanarum
 adeò copiosis, sine quibus nulla est fe-
 bris solutio, videre licet. Ita quoque
Lycia Lienosa apud Hippocratem l. 2. l.

ad §. 2. l. 23. melius habuit ex sudore. I. m. l. 2 §. 3. l. 2. scribit *Hippocrates Hippo-*
rati uxorem post annuam quartanam
 isse curatam partim febris, partim
 uliebris fluxu. Nominat per hoc res
 acuabatur aqua, & per mentes tunc. Et
 5. *Epid.* §. 3. l. 7. m. l. 1. *Claudio* criticè
 it liberata per hoc. qui Lien illi
 at naturâ magis. Si hac consuetu-
 a est, per quartanâ moris aquo-
 s & serolos expellitur; si hanc at-
 ngere nequeat, sepius inconsuetas que-
 t. Sic *Archang Piccolomini* *Comm.*
lib. Hipp. de humor. novit puellam me-
 ncholicam, quæ coacta lacrymabatur,
 aque liberabatur à symptomate. Cujus
 ater ejusdem constitutionis, cum face-
 nollet, mortuus sit.

Quando verò per hasce vias jam no-
 inatas exitum non inveniunt humores
 culenti, tartarei, salini, sed sero copio-
 ore perfusi, verum in Liene stabulan-
 r, multi inde exoriuntur morbi mali-
 ossi, tumores, inflammationes, febres &
 ia multa mala; vel etiam p. n. in alias
 par-

partes vergunt. Exemplum egregium rarum, quod hanc rem maxime illustrat legimus apud *Higlmorum Disquisit. nat. l. I. part. 3. c. 3.* puer annorum 12. circiter anno 1640. in civitate de *M. Sarum* per dies aliquot febre laborat peracutâ continuâ; diris cruciatibus paraphrenitide vexatus fuit; tandem volis manuum & plantis pedum, ac digitorum apicibus, pustulæ magnæ & tæ excitabantur, humore rubro, paucis nigricante, ichoroso plenæ; tandem rôt mortuo venter summè extendebatur aperto autem cadavere totum abdominis spatium inter intestina eo ipso humore, qui è pustulis manuum & pedum effluebat, repletum & distentum invenit. In Lienē versus partem ejus inferiorē quâ ventriculum spectat, foramen magnitudinem pollicis, in substantia ejus insinuatum, cujus media pars sumpta fuerat, eodemque humore illud Lienis foramen effluente apparuit, quo humore ungues nigricantes colore adeo tingeantur, ut per dies

quod ad nativam albedinem non redi-
unt. Nonnunquam in alias partes p.n.
ergunt. Sic lib. 2. prorhetic. scribitur:
*Quibus Lienēs magni sunt, iis gingivæ
atiantur, & os grave olet. Quibus
lienes magni sunt, neque sanguinis e-
ruptiones contingunt, neque os grave-
et, in tibiis ii mala ulcera habent &
gras cicatrices.* Item 2. epid. s. 3. *Quæ
stjudicationem relinquuntur, recidi-
as facere solent.* Primum igitur in Li-
um humoribus, nisi in articulos desi-
unt, vel sanguinis è naribus eruptio,
vel præcordii dextri intensio fiat, nisi
ina irruerint, & viam sibi quo-
modo fecerint: sunt enim velut u-
orumque interceptio.

In conclusione hujus Sectionis non
meritò quærimus: unde manet tan-
m tincturâ illa in Liene generata, non
tandem languescit & fit effæta? Ma-
nè; & hujus tincturæ quicquid ad a-
tionem præstandas ineptum est, id cum
fero

sero per urinam excernitur; facile etiam
talia acida, ut acetum, spiritus sulphuris
vitrioli, salis aquæ miscentur, qui &
dus humor possit destillando exurim
serum elici.

CAPUT IX.

Usus Lienis secundarium deprimere

De usu Lienis secundario pariter
de primario variæ etiam circum
runtur Medicorum ac Anatomicorum
sententiæ, quæ tamen sano sensu int
gi possunt, nec parum à veritate de
nant.

Aristoteles l. 3. de part. animal. c.
communem usum, quem omnibus
buit visceribus, Lienique prim
adscribit, videlicet quò venæ, utp
pensiles copiâ viscerum sustineri &
biliri ad corpus possint, quasi enim,
quit, anchoræ partibus appensæ, visce
ad corpus jaciuntur.

Arabes Lienis beneficio correfri
ari sentiunt. Negat hoc *hieri Vesalius*

um cor non contingat. Cl. verò *Schencius l. 8.* respectum habens ad sanguinem, quem Lien partim à corde transmittit, partim eidem remittit, id fieri posse arbitrat. *ur.*

Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. c. 9. Lienem suo calore innato, ac frequentibus, uæ illum intertexunt, arteriis, ventriculi concoctionem fovere autumat, Hoc am suo tempore etiam concessit *Galenus l. 4. de usu part. c. 1. & l. 3. de fac. nat. c. 6.* cum ventriculum ceu ollam circumactis prunis inter duo hæc viscera, hepatis & Lienem, veluti duos ignes, ut inalesceret felicius, interpositum delineavit. Rationem facile quivis dare potest; sanguine enim arterioso vitali spiritui prædito crebrius & liberaliter si irrigitur Lien, non potest non vicino ventriculo, ut in statu naturali egregias subsidias ferre, ita in præternaturali gravia amnia accersere. In eo autem peccasse videtur *Highmorus Disquisit. Med. de aff. et. hypochondriac. c. 4.* quòd solum Lienem ventriculi gratiâ esse formatum di-

cat, ut calore suo, quasi foco suppositi
concoctionem promoveat; ut motu
ter particulas ciborum inde oborto,
cilius per fermentum stomachale pro
temque liquidam seu potulentam fiat
lium solutio.

*Petr. Laurembergius Colleg. Anat. Lib.
erc. VII. §. 15.* præter actionem illi
præcipuam *εισιβάτωρ*, cui splen om
conatu incumbit, etiam alium quasi
centuriatum carnis ejus usum com
tuit, qui consistit in consumendis ab
bendisque vaporibus aquosis. Et
ex *Aristotele l. 3. de part. animal. c. 7. Hippocr. l. 4. de morb. & Alex. Aphrodisæo
probl. 44.* probare maximè conatur.
gumenta ejus præcipua hæc sunt: Tra
(1.) Lien τὰς ἐν πλάσας τὰς ψεύσας
quia caro illius spongiæ non est absim
lis: quæ verò talia sunt hauriendo bibou
occurrantia humida. (2.) Quia sem
Lien plusculâ aquâ prægravatus, lang
icit & deprimitur. Hinc porrò aqua
ad illum fluit, tanquam ad partem humi
liorem & debiliorem.

*Anton. Densingius Id. Fabric. corp^o
um. part. 1. c. 6. §. 16. cū sapius per
accidens contingat, feculentam sangui-
nis portionem quandoque inter plexus
Lienis in parenchymate hærere, & ob-
structiones ibidem scirrhusque produ-
cere, aquosam chyli portionem è ven-
riculo, ac aliunde forsan, ad Lienem de-
atam ipsi diluendæ interservire scribit.*

*Non defuerunt etiam olim, qui Lica-
nem risus autorem proclamârunt, juxta
ritum illud:*

*Cor ardet, pulmo loquitur, fel com-
movet iras.*

*Splen ridere facit, cogit amaro
jecur.*

*Plinius in Histor. Nat. & Serenus Me-
dicus putatum hoc ab antiquis fuisse di-
cunt, cū Lien depuret sanguinem
visco melancholico, à crassa, obscura &
tera humiditate, & consequenter san-
guis depuratus hilaritatem & risum in-
ducit. Vesalins l. 6. idem hinc desum-
ptum*

ptum esse conjicit, quod crassum, fee-
 lentum & lutosum sanguinem ad se L
 alliciat, reliquumque sanguinem a
 liorem, & quasi hilariorem reddere
 datur. *Knoblochius Institut. Anat. Lib.*
6. quest. 1 risum à Liene non per se,
 per accidens esse censet, quatenus ni-
 rum defecat sanguinem, eumq; lucid-
 rem & calidiorem reddit. Hic mag-
 nimos & gaudentes reddit homines,
 tillationem partibus spiritualibus fa-
 unde motus insurgit risus. Datur au-
 tem risus in melancholia *μῆ γέλωτ*
 Maniaci motus risu & lacrymis recipi-
 cantes ostendunt. Rarò rident Mel-
 cholici, qui temperamenti ejusdem su-
 at cum incipiunt, vix sibi à risu conti-
 perare possunt, nec citò desi-
 nunt.

ANATOMIÆ LIENIS
SECTIO III.

*LIENIS affectus praternaturales
enumerat.*

CAPUT I.

*Lienis affectus p. n. in intemperie &
in situ mutato proponit.*

Postquam haecenus Lienem in naturali sua constitutione perlustravimus, ordo nunc postulat, ut quoque, quanam hujus visceris constitutio sit p. n. videamus. Caput I. às & Lien, teste Hippoc. 4. de morb. maxime morbis afficiuntur. Et ipse de Tral. iani iudicio l. 8. c. 10. omne ferè morbi genus experitur. Eosdem patitur affectus, quos hepar. Propter hoc Rondeletius Meth. curand. morb. c. 37. non agit specialiter de morbis Lienis, solum

valentiora medicamenta Lienem præfate desiderare ait.

Non solum autem Lien per se patitur, verum quicquid mali in se continet, istud in ceteras quoque partes, etiam maxime diffusas, propter consensum propagat, & ob communem, cum reliquis quam sustinet partibus, communicacionem ac operam easdem afficit.

Tam varia, tamque periculosa inde contingunt mala, ut vel ad *Pyrrhum* quendam, qui olim, notante *Alexandro ab Alexandr. Dier. Genial. l. 3. c. 12.* splene laborantibus non æquè, ac hodie Rex Galliarum invictissimus contactu suo strigas curare creditur, medebatur, accedebant, vel extra urbem in fanis *Aesculapii* ut *Salutis* incumbere, hisque formidant, tanquam salutis patronos invocarent. *Ἄγε μάχῃρ σωτῆρ βοτῆς τέλος ἐσθλὸν ἀπάζον*, hoc est: *Veni beate Salvator, proferbens bonum vite finem.* Vel cum Romanis: *Veni salutis dator, valetudinum pestis expulsator, prohibitor & extirpator.*

or. Sive cum Sostrata apud Terentium
a Hecyr. act. 3. sc. 2.

*Malè metuo, ne Philumena magis
morbus aggravescat :*

*Quod te, Aesculapi, & te Salus,
ne quid sit hujus, oro.*

Vid. Alexand. ab Alexandr. Genial.
Dier. l. 2. c. 4. Natal. Comit. l. 4. My-
tholog. c. 11. Plinium Histor. nat. l. 7. c.
7. Meibomium Dissertat. de incu-
at. in fanis Deorum Medicina olim
ausâ fact.

Cum verò morbi Lienis tam varii
sint, & præterea, judice Hoffmanno l. de u-
s Lien. c. 23. & cognitione & curatione
difficillimi, nos breviter pro instituti
ostri ratione eos percurramus.

Intemperie laborat Lien modò sim-
plici, modò compositâ, ut cætera visce-
ra. Calida frequentius est ejus intem-
peries. Nonnunquam se frigida offert,
ùm sicca & tandem humida. Ab hac in-
temperie varia morborum genera pro-
ullulant, inter quæ obstructio est fre-
quen-

quentissimum. Si enim vasa Lienis mesenterii à materia obstruente turgant, iusta sanguinis circulatio in corpore nostro impeditur, ad eor itaque, quo primùm demissus, motu retrograc tendit. Quoniam verò ingratus hic humor illi facilè inimicus est, semper illum respuere intendit, & inde in quibusdam tam graves cordis palpitaciones nasci prius oriuntur; & quando vitiosi huius sanguinis labem jam singulis ferè membris asperfit, dolores atrocissimos, arthriticis non absimiles, illis inducit.

Situm interdum mutasse deprehensum est, & quidem vel in utero, ut quando in dextro hypochondrio, & hepar in sinistro, quod observavit *Aristoteles l. 2. histor. animal. c. 13.* locum obtinuit, vel extruterum, quando nimirum laxatis ligamentis pondere suo deorsum propeccidet, vel ruptis iis procumbit in hypogastrium (quod quater vidit *Riolanus*) tumque fallit imperitos Medicos speciem molæ, vel scirrhi uteri in fœminis: & in viris specie tumoris glandulosi instans

stear

teatomatis in mesenterio latitantis. Nonnunquam visus alteruter ren eò prolapsus : utriusque tamen facile est discrimen. Renis prolapsi index est tumor rotundus, prociduus verò Lienis tumor oblongus, & inconsueta solitudo in hypochondrio sinistro. Quòd si mobilis sit tumor, ut est in principio, facilè vel en, vel Lien ad suum locum naturalem evocatur; alioquin ultra semestree spatium, si loco remotus Lien fuerit, ita firmiter antrorsum peritonæo adhærescit, undò vesicæ, intestinis, & in mulieribus utero, ut necessum sit ibi putrescere, quod fiet ocius, si emollientibus remediis intus assumptis vel foris admotis utaris. Protrahes vitam, si sæpius sanguinem detrahas, atque sub ligaculo, seu fascia convenienti tumorem sustineas, ut monet *Riolanus in Enchirid. Anat. Pathologic.*

Situs quoque ejus minimè ad hydroem disponit, quatenus $\chi\tau\iota\ \tau\eta\upsilon\ \kappa\alpha\iota\ \lambda\acute{\iota}\nu\upsilon$ ventriculo proximus est, prout docuerunt *Hipp. 1. de morb. mulier. & Aristoteles*

coles l. 3. de part. animal. c. 7. nihil enim
 ventriculo attrahit. *Spigelius l. 8. c.*
Fabric. corp. hum. ἐξ ἡννοῖν addit; cui
 mulier insigni febre laborans plurimu
 biberit, nec revomuerit, aut per urina
 alvum vel sudorem reddiderit. Tunc
 nim Lienem (necesse est) aquâ impp
 ri, quæ postea in ventrem aliasque p
 res fluat. Patitur idcirco situs pot
 ab hydropo, quàm ut hunc inducat; tr
 enim sedem mutat, atque non modò s
 sum quàm deorsum inclinat. Tot
 abdominis cavitationem interdum repl
 ti *Spigelius* memorat.

CAPUT II.

*Lienis affectus in magnitudine au
 vel imminuta p. n. adducit.*

Magnitudo Lienis nonnunqu
 vel augetur vel minuitur. Pluss
 sto major est vel à primo ortu vel p
 ortum ob validas obstructions cau
 que morificas alias.

Vesalius Fabric. corp. hum. l. 5. c. 9.
 fert, se in cujusdam suspensi, candid
 mam & glabram cutem habentis, &

ita *Patisani* cadavere adeò grandem invenisse Lienem, ut mole hepatis parum ederet. *Idem* in iustero defuncto mollem & ingentem vidit Lienem.

Marcell. Donatus Histor. Med. mirabil. l. 6. c. 8. scribit, se in nobili foemina Lienem vidisse adeò magnum, ut universum abdominis spatium occuparet, quæ tamen plurimum liberorum mater extiterit. Et *Columbus l. 15. Anat. meminit*, se Lienem vidisse adeò magnos, ut unusquisque viginti librarum pondus excederet. Librarum 23. pondere splenem quoque observavit *Schenckius l. 3. observ.*

Guil. Fabric Hildannus cent. 2. obs. 45. commemorat, in foemina quadam (quæ sibi persuaserat foetum mortuum post partum alterius per menses 14. in utero remansisse, atque ideò, quòd in latere sinistro duritiem oblongam, atque in inferiore parte rotundam percipiebat, caput infantis repræsentantem, quæ ad ilia usq; sese extendebat, comprehendebatque simul regionem umbilici, una cum

dex.

dextri lateris costis nothis) hepar tam
 magnitudinis fuisse repertum, ut lob
 stomachum versus sub costis sinistri
 teris spurias transgrederetur: splene
 quoque immensæ magnitudinis duru
 & inferiore parte versus ilium rotu
 dum, sanguine adusto plenū, hepatis
 bo adnatum observatum fuisse, venasse
 ejus cum arteriis mesaraicis pollicis
 magnitudinem excessisse, vas verò bre
 exiguum & obstructum fuisse.

Excell. Thom. Bartholinus cent. 2. Hist.

Anat. 37. in aperto cadavere Vincenti

Architectonicæ militaris magistri, hy
 dropici & phthisici Lienem majorem fo
 lito, flaccidiorem, sanguine nigro ple
 num, magisque quàm hepar sanguifica
 tioni idoneum observavit. Leonhardus

Fioravanta Eques, Medicus & Chirurgus

Bononiensis, felix Empiricus, not

tante Eodem Bartholino cent. 4. Histor.

Anat. 51. Panormi in Sicilia cujusdam

Lienosæ mulieris ventrem dissecuit, at

que Lienem extraxit pendentem libras

24. sicque à maximo eo que interficiente

scie

cirrho mulierē liberavit. *Petr. Pavvius
bseru. Anat. 5.* in foemina octogenaria
hydropica publicè post mortem secta
Lienem durum admodum & solito mul-
tò majorem invenit; qui ergò ponde-
rosus figuram mutarat suam, dum & in
longitudine & latitudine accreverat. *I-
dem observ. Anat. 15.* Viro hydropico
deò Lien intumuit ac induratus fuit, ut
tres libras lancè libratus penderet. Et
*Cl. Ioh. Jac. VVepferus apud Thom. Bar-
bolinum cent. 4. Epist. Med. 13.* in illu-
strissima Domina Comitissa *Francisca
Elisabetha à Fürstenberg Illustrissimi
Domini Ferdinandi Friderici Conjuge*
Lienem magnum observavit.

Infans concionatoris pagani apud
Jac. Tulpium l. 2. observ. 30. malè habitus
nutrice, & loco lactis altus graviore ci-
to, quàm tenella ætas fuit ferendo. Col-
ligit inde plurimum lenti ac visci di succi,
sarcientis usque eò angustas mesente-
ri, pancreatis, ac Lienis venas, ut inde
scus illud summoperè intumescens, di-
cenderit non tantum abdomen ac lum-
bos:

bos, sed emaciaverit etiam corpus universum, ad instar rapacis alienius fuisse plus nimio ditati, ex immodicis tributorum exactionibus. Verum sublatâ constructione & imminutâ uberioris succopîâ, decrevit tam manifestè dissentire hocce viscus, ut luce clarius apparuerit tumorem hunc non tam fuisse à naturali conformatione, quàm à redundante augmento. Quo proinde subducto, reterritus est iterum infans. Neque apparuerit interim unquam illa signa, quæ magno Lien attribuit Hippocrates lib. prædict.

Hi sunt magni illi Lienes, quorum Hippocrates variis in locis meminit. In nive vel glacie resolutas bibentes aquam magnos habere Lienes lib. de aer. ag. loc. docet. In palustribus locis degeneribus idem contingere solet. Unde in ritimæ regiones minus sunt salubres hypochondriorum obstructionibus, morisque Lienis calamitati, Scorbutus nimirum endemio sunt expositæ: Magnus quoque & aquosus Lien, teste H

erate, est à potu copioso, & exinde hydrops oritur. Interdum à flatibus Lien distenditur, & cum dolore sine ulla gravitate intumescit, ac cum manu premiar, murmur intus percipitur.

Tumor Lienis interdum ad eò est magnus, ut totum hypochondrium sinistrum notabiliter elevet; quod bis in quibus virginibus nobilibus observavit Cl. *Mæbius Med. Physiologic. c. 16.* Et hos eundem tumorem in Viro quodam Embdano, præmissis Lienè æperientibus pharmacis, solo emplastro de cicuta feliciter curavimus. Hepar si simul tuer, utraque apparent repleta hypochondria. Leno *Plantinus in Circul. st. 2.* hanc profert querelam:

Nunc jam quasi Zonâ, Liene cinctus ambulo.

Geminos in ventre habere videre filios.

Nihil metuo, nisi ne medius dirumpar miser.

Quibus aliàs Lien nimis augetur, iis

est.

corpus minui minusque florere dicite.
 Hinc factum, ut *Trajanus* Imperator
 fiscum Lienem appellaret; quia ut h
 augmentum capiente, corpus minu
 tur: illo augescente plebs depauper
 tur. Ratio potest dari: quia Lien
 mis auctus sanguinem minus laudabi
 lem, ideoque ad nutriendum non sat
 aptum in corpore abundare indicat.
 huc pertinet, quod egregie *Alciatus*
Emblem. 146. pag. 521. scripsit:

Humani quod splen est corporis,
populi re,

Hoc Caesar fiscum dixerat
suum.

Splene aucto reliqui tabescunt cor
poris artus,

Fisco aucto arguitur civica pa
peries.

Ad quæ verba ita commentatus est
Minoës: Similitudine ostendit op
lentiam Tyranni, causam esse subdi
rum inopia. Vi enim in corpore

mo: si splen sit auctior ac tumidior, sem ac maciem ceteris partibus indicit. Rationem adfert Aristoteles problem, quod splen multam ad se trahat materiam, qua transire in alimentum debebat. Constat enim, ait, homines pauci splenis pingues esse. Splen autem viscus est in sinistra parte succos ad se trahens crassos ac melancholicos in hepate genitos. Lienem Latini vocant, de quo Galenus l. 4. d. de part. c. 15. In benè se habentibus mediocris est; unde etiam Hippocrades de loc. in hom. parvum magis prope videtur, quàm magnum; quo magis enim crescit Lien, eò magis creant mala.

Nullum aliàs in corpore viscus, quod non faciliè crescat ac decreseat. Auctus per interdum sponte, interdum medicamentum aperientium, martialiū & diureticorum, quæ Zacutus Lusitanus Medic.

dic. princip. Histor. Lib. 2. Dub. 63. 1p
caeteris extollit, usu decrefcit.

Magnitudo ejus interdum plus juri
 diminuitur. Sic Excell. Thom. Bartoli
linus cent. 1. Histor. Anat. 2. in muliere
hydropica post mortem aperta Lienem
minorem reperit. Et Cent. 3. Histor. 1
nat. 83. in corpore hydropico vetular
licujus dissecto Lienem etiam minor
vidit. De hac magnitudine Lienis
imminuta fect. 1. c. XIX. satis jam d
mus.

CAPUT III.

Lienis affectus p.n. in substantia
perpendit.

Varios substantia Lienis incurrit
 morbos, obstructions, infla
 mationes, tumores, scirrhus,
 flationes & similes.

Obstructio malum ipsi est frequen
 tissimum. Si enim in sanguine viscosu
 aliquid ac crassum insit, quod à Lien
 subigi & domari nequeat, inter fibras
 las Lienis complicatas retinetur, ac

si multum coacervetur, obstructiones in porosa ejus substantia inde facile iri possint, atque hinc tumores, inflammationes, & tenniori parte evaporata, scirrhi. Si etiam sanguis humor hoc adeo abundet, ut in Liene post actionem & separationem, usque dum per vias assuetas evacuetur, contineri queat, per ramum splenicum ad hepaticum ducitur, eumque inficit, & obstruit eum. Quam communionem viscerum humorum ductum diligenter quilibet tabit. Optimè enim hoc modo aphorism. 43. s. 6. Hipp. dilucidare potest. Qui a dysenteria corripiuntur, eaque lingua fuerit, his hydrops, vel lienteria evenit, & moriuntur. Qui sanè a primis communi vasorum splenicorum distributione & officio semper in obscuritate hæret. Quando enim à Liene malè affecto vis hepar refrigeretur & frangatur? Cum à Liene ad hepaticam communionem nullam accedant, sed solummodo ab hepate ad

Lienē patere aditū per ramum splenicū
asserant. *Qui splenici*, hoc est, quib⁹ in-
becillior Liē plurima inquinamenta co-
ligit; neque ut debuit, per hæmorrhoi-
des, aut mesaraicas, aut ductum pancr-
atis excernit, sed in Liene cumulantur,
cunctando putrescunt, & postea ad
testina per mesaraicas delata, ea exul-
rant, & dysenteriam faciunt. — *Eaque*
longa fuerit; hoc materiæ copiam
notat, & *μιασμα* in Liene quoddam
lictum, omne ejus alimentum, omni-
que humores illum præter fluentes
quinans & corrumpens, indicat, quæ
copia humoris illius corrodentis gen-
retur, ideoque *μακρὴν δύσεντε* in-
cat. Si enim brevi, peragat suam his-
torem, ac critica sit vacuatio, bono e-
ventu supervenit, secundum effatū
Hippocratis sect. 6. aph. 48. Splenicis
dysenteria superveniens salutaris est. Ne-
autem ea ab atrabile, nec diuturna,
quæ critice est, illicò placatur, & sp-

em evacuat. Heroïnam vidit *Heur-*
us, quæ quæſta antea de ſplene; in fe-
e cruentam atram materiam bis vel
r copioſè deiecit & evaſit. *Hu by-*
rops: Hoc eſt, ſi materiæ pars aliqua à
iene per ramum ſplenicum ad hepate-
atur, unà cum ſanguine revertente, iſ-
ue craſſis, tartareis ac pernicioſis ſuccis
refrigeretur, & frangatur *ἡπάτις* hepa-
s, debilitantur vires ejus, adeò ut lau-
abilem ſanguinem cribrando ac perco-
ndo eum efficere ulterius nequeat; ſed
quolum, frigidum & ſeroſum confi-
it; hînc hydrops ſupervenit; Vel *Li-*
ateria, ſi continuatâ ſerie, copia magna
d iſteſtina per ductum pancreatis ef-
andatur, ut inde iſteſtinorum robur
olvatur, ut excrementa continere ne-
ueant, ſed aſſiduo deſidendi conatu ac
igiliis, à genio ſuo fraudatur corpus, &
noriuntur. Sed de communione hac
iſcerum & humorum ductu prolixius
einceps ſumus dicturi.

Ejuſmodi autem obſtructionem fa-
ci-

cilè dignoscere possumus, si in principi
gravitas hypochondrii & dolor Lien
inferatur; hinc humor vitiosus co
sanguine permixtus, & in totum cor
diffusus livido colore sæpius ipsum
git, respirationem difficilem post ex
citium reddit. In ventriculum effusa
nauseam & vomitum: in intestina, di
hæam efficit. Interdum, propter sicc
tem alvum adstringit.

Laxior quoque redditur splen, & ex
situm, quantitatem & figuram unâ mu
tat; Spongiosum enim & porosum
cus est, uti scribunt Hippocrates
loc. in hom. l. 1. de morb. mulier. &
Aristoteles l. 3. de part. animal. c. 7. Et ni
laxitas hydropem, ex mente Hippocrati
parit. Ex succum & culpâ carentem
nistroque affixum hypochondrio
nem Jacob. Moccius testatur.

Substantia ejus rarò inflammatione
juxta Alexan. Trallianum l. 8. c. 12. inci
rit. Galenus l. 6. de loc. affect. in principi
& l. 13. meth. med. c. 7. arbitratur id fieri
non posse, cum purus sanguis veræ phlogi

monas autor in hoc viscus non pene-
ret. Cl. *Schenckius l. c.* melius putat, ut
dicamus, eum ut purum minimè diu
ospitari in Liene, à copioso etiam sero
temperari: crassum lentè putrescere
et inflammari. Mirum autem alicui vi-
detur, quòd scribat *Avicenna l. 3. Fen.*
f. 1. c. 5. ex multa sanguinis detractio-
ne Lienem inflammari, cum talem ve-
re sectio potius tollat. Explicant &
dicunt hinc interpretes fieri hoc posse ab
intempestiva, cum evacuato tenui cras-
so incalescat magis & computrescat.
Quando igitur inflammatur, tum ple-
nè simul palpitatur. Quia, cum Lienem
tanta vim caloris è corde per arteriam
accipiat, sanguisque facta obstructio-
nis exitum per venam splenicam non in-
veniat, ibi subsistit, & pulsatio primùm
interior, & demùm ipsius Lienis palpitatio
exoritur, quæ interdum tam vehe-
mens, ut etiam ab adstantibus audiat.
Hanc historiam consignavit *Tulpius l.*
observ. 23. *Nicolao Fabro*, ait:
Viro

Viro industrius, sed ab atrabile vehementius afflicto fecit nonnunquam induratus Lien tam vehementem impetum in costas circumpositas, ut urgentiore illo allisu non modo dolores ipsus, verum verberum sonitum, spicue exaudirent etiam longissime ipso remoti, & quidem tam distincte ut numeraverint non semel singula verbera, & admotâ manu etiam eam tetigerint quoscunque feriebant Lienis ictus.

Si inflammatus est Lien, simul accenditur febris continua, quartanæ periodum plerumque observans. Difficultas urandi etiam sequitur ob diaphragmatis compressionem. Tumor in sinistro hypochondrio, versus anteriora quasi tuberosus, & hominum quasi medietate cingens conspicitur; sic à renis sinistro dextro elatior, dolore & inflammatione distinguitur. Pulsatio & palpitatio illius lateris sentitur, ob arterias,

us abundat. Pedes & genua interdum abicunda apparent, nares & aures exanguis pallefcunt, & lingua etiam fit nigra.

Splenici sunt, qui non viscus hoc inflammatum habent, sed quibus splen obduruit, quamvis ita dici possint omnes, qui ex Liene laborant, secundum mentem *Galen* l. 9. de composit medicam. c. 5. Interdum pars ejus una & altera induruit, quod vidit *Sylvius* à *Schenckio* citatus. Frequentior Lienis scirrhus acutis est, non quidem, ut ait *Galenus* l. 13. meth. med. c. 16. ratione substantiæ, quæ durior & mollior, sed humoris feculentior & crassioris. Oritur ejusmodi durities & scirrhus ut plurimum læsâ facultate obstruere externum, à victu crasso & vitioso, ab inflammatione intempestive curata, adhibitione adstringentium & refrigerantium nimia. A vita etiam sedentaria promovetur.

Si confirmatus est scirrhus, nullos, & digitis fortius comprimatur, dolor percipitur, color in facie est lividus, &
 § quæ

quasi plumbeus, concurratque respirandi difficultas; Quibus accedunt tum renitens cum duritie oblonga in sinistram parte, decubitus in sinistram latus gravitatis oris siccitas; pedum inflatio & suorum molestus. Alius est recens, qui dolore ad jugulum usque se extendente affligit. Alius inveteratus, qui omni dolore caret, nec faciliè hominem, nisi hepatis consensum trahatur, tollit. Alius Lienem duntaxat secundum suam substantiam afficit, qui etiam Lienis figuram describitur, quamvis & hic interdum secundum longitudinem, ut teres appareat, interdum secundum latitudinem, interdum secundum omnes dimensiones intumescat. Alius in alias quoque partes vicinas effunditur, ut omnem partemque ventris sinistram regionem complectatur.

Interdum Lien planè est lapidosus, qualem *Forestus* l. 2. de incerto urina in senio conspexit. In senescentibus plurimum induratur, ut cartilagineus & scissus ferè appareat, non quidem ratio

arenchymatis, sed magis ratione tunicae
 ejus, ut volunt *Autores*. Sic membrana
 hanc, quâ succingitur, cartilagi-
 neam vidit *Columbus*. Crassam instar
 Corii bovini *Th. Bartholinus* observavit.
 Idem Vir Celeberrimus & Anatomicus
 illust. *cent. 4. Histor. Anat. 6.* Lienem in
 cadavere defunctæ mulieris dissecto in-
 venit tantæ esse duritiæ, ut vix cultro ce-
 deret, nisi magnâ vi intruso. Inter se-
 candum non dissimilis audiebatur soni-
 tus, quem in lignis spongiosis discissis
 animadvertimus; & si clarius loqui licet,
 & colore & duritiæ carnem fumo diuti-
 mo induratum Lien retulit, sive quòd in-
 terceptis obstructisque vasis spleneticis
 exaruerit, sive quòd atro succo repletus
 nutritusque fuerit induratus. *Petr. Pav-
 vius observ. Anat. 16.* puerulum trien-
 nem aperuit, in quo Lien admodum fuit
 induratus. In Serenissimi Principis ac
 Domini, Domini *Ferdinandi Alberti*
 Ducis Brunsvicensis & Luneburgensis
 filioli unius anni, piè defuncti, corpore
 aperto Lienem colore lividum & ni-
 grum,

grum, substantiâ admodum induratum
scirrhosum & ferè lapidosum nos die 22
Januarii hujus anni invenimus. Lienem
ex lapsu induratum observavit Cl. *Thobor.*
Kerkringius observ. Anat. 33. Vaccin
Lienem planè induratum ac lapillis in
fertum nos etiam Rostochii vidimus.

Substantiâ ergò & habitu adeò firme
interdû Lien redditur, ut etiam in totum
indurari observetur. *Dodonaus annotat.*
ad Beniven. nonnullorum, qui ab icter
ro in ascitem delapsi erant jecinora
disse adeò dura, & lapillis undique pleni
ut novaculâ perscindi non potuerint, in
fert. Simile narrat & *Andr. Vesalius*
in Epist. de China ad Ioachimum Rolan
de quodam viro Senensi, cujus jecin
prorsus candicans superficie constabat
non lævi, sed admodum inæquali, & lævi
bustuberculis exasperata, anterior vero
ejus pars & universa sinistra ad modum
lapidis indurata.

Substantia porrò hæc Lienis fit vitiosa
sa obrem vel p.n. in eo contentam, vici
si adnatam, Ita Lienis substantiam in
ter

riâ gypseâ refertam vidit *Fabric. Hilda-*
us cent. 2. observ. Chir. 44. Cum Nepos
Georgii Illustrissimi Hassiæ Principis hy-
drope 21. Junii 1655. vix annûm natus
 excederet, *Cl. Horstius* in examine ejus
 viscerum notavit, quòd in hepate & Li-
 ne foveæ aquâ plenæ apparerent, sicut
 d *Thom. Bartholinum* amica manu per-
 scripsit *cent. 3. observ. Anat. 81.* Et *cent.*
. Histor. Anat. 25. in nobilissima qua-
 dam matrona hydropica Lienem aposte-
 mate infectum, pressumq; puris copiam
 effudisse observavit *Cl. Paul. Mothius*.
 in *Martino den Selaper*, typographo,
 cui, quòd febriculâ tentatus carnificis
 ministerium occuparet, hoc est, ipsum se
 clavo fenestræ suspenderet, cessit in
 rædam novaculis publicis, & quem se-
 nit *Dominus von Horn*, solus Lien pec-
 tate visus est; ablatâ enim quâ teâus est
 membrânâ, totum Lienis parenchyma
 star crassæ & nigræ amurcæ diffluit,
 nihil in eo solidum, ut non creditum sit
 simile vero, ex corruptione melan-
 colici visceris miserum in deliria actum
 S 3 jus

ius vitæ suæ laqueo dixisse. *Olaus* *rich.* apud *Thom. Bartholin. cent. 3. E*
Med. 97. pariter in cive Patavino, ut
Vesalio l. c. annis tribus carcere detentus
 & tandem arquato nigro defuncto, pu-
 blicæ disseccioni adhibito, minus co-
 sus extitit Lien, sed exiguus, gibbæ
 parti adnatus adeps, lapidis instar can-
 didissimi concretus. Vescicam aquâ
 nam duorum pugnorum magnitudi-
 nis sub Liene invenit *Cotter*, uti refert in
serv. suis Anat. & Chirurgic. Vescicam
 quoque Lieni adnatas vidit *Platerus*
 militer & noseasprehendimus in
 ne ovīs, conformes iis, quæ hepatis in
 dum adnascuntur. Lapides in Liene
 pertos fuisse, referunt *Hollerius, Vesalius*
 & alii. Calculos è Liene ad vas bre-
 & exinde in ventriculum fuisse reje-
 cto affirmat *Riverius in observ. commun.*
 Et tandem D. *Luques* apud *Petr. Bo-*
lum cent. 1. observ. & histor. rar. 4. in Li-
 ne hominis os cruciforme invenit, quod
 tamen fuisse existimavit vasorum orifi-
 cia duræfacta, quæ obcalluerant, ut in co-
 bo

oum & equorum sæpè accidit, taleque
est os de corde cervi dictum, quo in me-
dicina adversus venena utimur. Rotun-
lum quendam tumorem instar stema-
is, undiquaque liberum Lien à parte
inferiore per connexionem membranæ
adhærentem, juglandem magnitudine,
ipsium verò Lienem colore & substantiâ
æquantem in anatome cujusdã corporis
humani vidit Cl. Hen. à Moinichen apud
Th. Bartholinum cent. 2. Ep. Med. § 6. Ab
inflatione simili modo Lien in tumorem
effertur. Et tum tumor & distentio cum
aliquo dolore, sed sine sensu gravitatis &
ponderis adest. Murmur & sonus edi-
tur. Compressus Lien cedit. Inflatio-
nem hanc excitant aquæ frigidæ largior
naustus; vel cibi flatu lenti, ut pisa, ca-
staneæ, fabæ &c. vel humores crassi &
viscidi, qui à calore imbecilli vinci non
possunt, & in vapores resolvuntur, qui
Lienem, quia spongiosus est, facile
inflant.

CAPUT IV.

*De Lienis affectibus p.n. in unitate
luta, & quidem primò de ejus
ceribus agit.*

M Orbis solutæ unitatis porrò affe-
tur Lien. Ulcera interdum in-
suboriuntur ex suppurato tumore,
post inflammationem, vel etiam à vul-
nibus malè curatis. Inflammatus Li-
en rarò quidem in abscessum abit & sup-
puratur. Semel tamen hoc *Petr. Forestus*
l. 20. observ. 6. in schol. in Moniali Alcmari-
ana vidit. Recentia ulcera interdum
curationem admittunt. Ita *Forestus*
fert, se inflammatum Lienem in abs-
cessum & suppurationem abire vidisse
Moniali Alcmariana (cujus paulò an-
te mentio facta) quæ purè per urinam
misso perfectè curata fuerit. Antiquiora
autem ulcera sunt incurabilia, ægro-
tum lentâ tæbe ad mortem deducunt. *Fri-
sc. Rossetus lib de part. Cesar l. 4. c. 5.*
fert, in quibusdam Lienis parenchyma

deò absumptum repertum fuisse, ut sola membrana remanserit, quod sæpè in rebus etiam acciderit. Ita etiam Lienis sanguinem putrefactum æmulantis *chenckius*, & corrupti similisque pici quæ *Riverius* mentionem faciunt.

CAPUT. V.

Lienis vulnera examinat.

Non defunt, qui splenis vulnera parvi admodum æstimant, nec ea mortem inferre posse dicunt. Verùm distinguendum est inter vulnera Lienis superficialia & profunda. Illa, quæ ipsam substantiam non intrant, curari posse Medicorum nullus ibi inficias; & exempla istud satis testantur. Hæc verò pro simpliciter & absolutè lethalibus sunt habenda, ob magnâ arteriarum per viscus hoc disseminatarum copiam. Id ipsum exempla varia pro dolor monstrant, & præstantissimi quoque Medici confirmant. Sic teste Cl. *Math. Glanderpio*

*in Spec. Chirurg. observ. 35. quidam
 splene latus octava die cum maximis
 ciatibus urinam purulentam emitte-
 ex hac vita emigravit. Fabric. *Ad-
 pendens l. operat. Chirurgic. c. 52. inter
 tera refert historiam de Empirico
 dam percutiente malleo suo tam ve-
 menter indurati Lienis scirrhum, ut
 rimas, & ager vapulans animam age-
 Et Tulpins l. 2. observ. c. 29. exemp-
 majori admiratione dignum propo-
 Inter ludicra puerilia, ait, ietus fuit
 pione in regione Lienis, juvenis
 annorum, cum insigni dolore, ac
 frequenti animi deliquio, ut post
 ejus diei vitam cum morte commu-
 ret. Licet foris nullum conspiceretur
 vulnus, quo etiam caruit textor
 quem à simili ietu incipinatò vidit
 cisum Oudekerka, pagus millepassus
 ab Amstelodamo distans; vidimus
 men in utroque cadavere, Lienem
 mollem, sic in gibba parte, in qua tamen
 ietu.**

Stum exceperat, illesum, ut in cava
 ontrià evidenter fissum, vel potius
 implârimâ tantum dilaceratum, ut in
 illa faciliè duos occultasses digitos. Mi-
 rabantur certè quamplurimi, cur ri-
 nas egerit, & non potius cesserit ictui
 molle ac pendulum hoc viscus.

Cl. Sennertus l. 5. Med. Pract. part.
 4. c. 3. de Lienis hisce vulneribus sic scri-
 bit: Equidem si parenchyma saltem
 Lienis, sine vasorum lesione vulneretur,
 agri evadere possunt. Si verò va-
 sa Lienis vulnerentur, vulnera talia
 non solum periculosa, sed & lethalia
 sunt. Cum enim Lien venas & im-
 primis arterias copiosas habeat, iis
 vulneratis ob sanguinis effusionem &
 spirituum dissipationem agros perire
 necesse est. Matth. Glandorpius,
 Medicus olim & Practicus Bremensis fe-
 licissimus, in Specul. Chirurg. c. 38 ita ju-
 dicat: Vulnera Lienis aequè periculosa
sunt

sunt ac hepatis, tùm. quia Lien quamplurimis abundat arteriis, & ejus actio corpori est necessaria. Si superficialis existat plaga, consolidationem quidem admittit, magnus interim adest dolor, & quidem pungitivus. Quibus egregiè suffragatur Excell. Gotthofred. VVelschius Rational. vulner. lethal. judic. c. 5. pag. 65. & 66. ita scribens; Lienis vulnera, si solè instillantur substantia, pro periculosis, sin verò majores vasorum, arteriarum imprimis, quarum copiâ Lien gaudeat, vulnerentur rami, pro simpliciter & absolutè lethalibus pariter habeantur. Valeant itaque & discant melius, qui Lienis vulnera tam parvi æstimant, nec ea mortem inferre possedunt.

CAPUT VI.

Veterum Σωληνοτομίαν rejicit.

Lienem frustra conditum esse voluissent perhibentur varii. *Erasistratus* otiosum viscus Lienem esse, ac tutò eximi posse putavit. Et frustra Lienem conditum esse *Democritus* quoque affirmavit. *Ruffus Ephesius* membrum vocat otiosum & nullius usûs. Fuere, qui non solum splenem nulli usui esse dixerunt animali, sed etiam incommodo & impedimento: adeoque sine damno valetudinis excindi tabellionibus, quo facto fiant hi ad currendum habiliores. Hinc *Plautus in Mercat. act. 1. sc. 2. v. 13.*

*Genia hunc cursorem deserunt;
Perii! seditionem facit Lien, occupat
præcordia.*

Hic enim quando p.n. intumescit, & aliorum viscerum loca occupat, nonnunquam totum abdomen implet, interdum ita augetur, ut ad cordis regionem accedat. Sic idem in *Casin. act. 2. sc. 6. v. 62*
pe.

perii! Cor Lienosum, opinor, habeo, jam dda
 dum sale. Quod pro morboſo comicè &
 joculariter dici credit Turnebus l. 7 ad
 c. 15. Et à Plinio l. 11. c. 37. hiſt. nat. quo
 ſcriptum legimus: peculiare curſus im
 dumentum aliquando in eo, quamobrem in
 uritur cursoribus, & per vulnus etiam e
 empto vivere animalia tradunt. Cujus
 opinionis etiam fuerunt Aretæus, Hal
 Abbas, Rouſſetus & Georg. Bertinus Can
 panus l. 18. Med. ſua c. 1.

Hanc veterum ἀληγοτομία non re
 centiorum quidam rejiciunt, & ita Lien
 exciſo, hominem ad curſum magis aptu
 eſſe dicunt. Nobis & aliis ſanioribus
 res valde periculosa videtur. In canibus
 autem, quorum Lien exiguus eſt, nec ita
 cum aliis viſceribus coheret, ac etiam i
 aliis brutis, opus benè, ut experientia
 comprobavit, ſucceſſit.

In Anglia Scarbourg, Jovilius VVhar
 tonus, Gliffonius & alii Medici hujus re
 benè ghari, in canibus ſæpius & feliciter
 experimentum fecerunt. Lienem nem
 pe, ut Cl. Martinus Bogdanus aptu

Thoma

Thom. Bartholinum cent. 3. Epist. Med. 77. meminit, cani vel alii animali, factum in sinistro latere vulnere, exemerunt, & ligatis vasis absciderunt; plagam inunctam Galsamo sulphuris *Rulandi* sanitati pristinam restituerunt. Ac imprimis, teste *Olao Borrichio* apud *Eundem Bartholinum cent. 4. Epist. Med. 42.* *Gualt. Charleton* Lienem cani exsecuit tunc temporis adhuc valido & Bathonia bellè viventi, nisi quod ex intervallo in maciem quandam tenuetur, & subito iterum planguescat. Et ut scribit *Excell. Thom. Bartholinus cent. 3. Epist. Med. 50.* in praesentia Serenissimi Regis Daniae binis canibus, experiundi gratia, Lien fuit exsectus optimo successu; uterque enim canis post vulnus curatum convaluit, & bene habuit. Sic etiam *cent. 3. Epist. Med. 64.* quater expedita manu, praesente Augustissimo Rege Daniae aliisque spectantibus, Lienem ex canibus majoribus minoribusque extractum digitis, totum exscidit Regius Chirurgus *Philippus*; videruntque vivos & superstites, praeter unum

num majorem, sanosque & agiles, ne
 quicquam inde damni passos, sed ad eum
 sum expeditos. Idem & Leidæ exopta-
 to cum successu in canibustentatum
 peractum esse *Anton. Denysingius lib. 1. de*
sanguificat. testatur. *Paul Barbette l. 1. c. 10. Prax. Med.* sex canes dissecuit, sed
 non nisi primus mortuus est, idque sit
 imperitiâ; reliqui æquè voraces fuerunt
 cucurreruntque, ac si Liene non car-
 rent. Excell. *Theod. Kerkringius observat.*
Anat. 11, scribit, quòd jam canibus ex-
 mure Lienem, eosque sanos dimittere
 lusus sit; fecerunt multi, & ipse sæpè pri-
 mum experientiz, deinde quasi animi
 causâ, ut incredulis confirmaret suam
 super re sententiam, fecit. *Lipsiæ etiam*
referente Cl. D. Majore l. c. à Medicis
quodam Candidato canis dissectus est
quo operatio optimè peracta fuit, Lien
exemptus, & vulnus integrè iterum co-
ratum; quem canem familiari joco
nomine deinde Ohn. Wils vocarunt.

In suis aliquoties felici cum successu
 hanc Lienis sectionem Anglici quoque

quoque exercuisse Medicos , Thom.
Whartonus Adenograph. c. 4. refert.

Verum enim verò in his animalculis
quolibet non innoxie sectionem experi-
ri potest; eorum enim de corio quoniam
auditur, audacius operi manum admove-
re potest, nullo habito respectu doloris
& symptomatum, sive intensionem sive
durationem eorum perpendamus. Qua-
mobrem etiam sectio ista hinc inde vel
ab Anglis, vel Gallis, vel Batavis semel
aut iterum bono successu tentata, sapius
post instituta est.

In Canibus, felibus cæterisque ani-
malibus abesse quidem posse Lienem
concedimus, licet non sine vita noxa;
Ipsam enim ad benè esse, non ad esse
simpliciter, ad meliorem nutritionem,
non ad simplicem comparatum esse di-
ximus. Abesse ergò omninò potest,
superstite animali, ut in Spleneticis &
hydropicis nonnullis videmus. Hi li-
cèt Lienem habeant, Lienis tamen usu
sæpè carent, sicque vitam quasi miseram
vivere coguntur. Quomodo enim ex
his

his animalibus intelligere possumus, se habeant melius, dum Lien adhuc intra abdomen lateret, an nunc, cum exemptus.

Periculosior est hæc sectio in homine, neque sine tyrannide quadam & magna temeritate à nostris Medicis intranda, sed Barbaris potius committenda. Et; quàm cautè etiam agat Medicus, susceptam operationem perficere dum festinat, ipso dum festinat (hoc enim summa elegantiâ posita videtur, inque hoc cardo rei versatur) nimis neque cautus esse studet, eo ipso minus cautus sapius aget.

Et quis tam crudeli animo in proprium genus favire possit, ut separando perichyma à vasis majoribus, atrocissimis hujusmodi doloribus ac cruciatibus hominem conficiat, nisi morti vel lentæ jam destinatum.

Quamvis etiam maximè salutiferum esset, quod nullatenus concedimus, periclitamur, ex ter mille tamen hominibus vix unicum inveniemus, crudeli hoc ce

perimento qui liberè sese exponat, qui-
ve adeò morigerum & facilem se gerat,
ut in corpore suo hoc sit admissurus, du-
bitamus, nisi eò per vim rapiatur, ut
fit apud *Turcas*. Sit etiam, quòd feli-
citer & ex animo totum succedat nego-
tium, infeliciter tamen post felicissi-
mam etiam Lienis exsectionem pera-
tam vivat necesse est. Hinc etiam *Ce-
leber*. *Conringius*, l. de generat. sang. &
mot. nat. c. 6. ut verum, supersitite ani-
mali, Lienem posse eximi; Ita falsissi-
mum, exempto illo, animal benè posse
& sanè vivere, nec hactenus ullo exem-
plo probatum judicat.

Sunt tamen, qui sectionem hanc in
hominibus concedunt, fundamentum-
que hujus opinionis hoc inferunt, quòd
Lien olim è corpore exemptus sit, & ad-
huc eximi possit, & tamen homo benè
valere.

Paracelsus, l. 2. de nat. hum. c. 4. putat
Splenem tolli debere; vi tamq; sine sple-
ne largiorem esse quàm cum splene: &
cum necesse sit alia membra in corpore
esse, attamen non splenem; nam bene

absque ipso nos vivere posse. Et d. 6. Splene, renibus & felle scribit, hæc nihil aliud utilia esse, nisi ut corrumpant quicquid utilia membra ædificant.

Zacutus Lusitanus l. 2. Histor. Mle princip. Dub. 63. Lienem quoque abesse, vel eximi posse, admittere videtur. Non hoc mirum, ait, videri debet, cum Lien sit per accidens necessarius, sicuti retrimenta tum alvi, tum vesicæ unde fit, ut non nullis planè deficiat. autem quidam hominum & quædam brutorum planè sine Liene vivere possunt, utique sine vita jactura exiri posse videtur.

Quasdam Lienis particulas excretas se vidisse, fatetur *Aretæus l. 3. de caus. sign. acut. morb. c. 1.* Quod etiam exemplis confirmant *Joh. Nesterus & Martius Weissius Medici olim famigeratissimi apud Sennertum Paralipom. 12. ad lib. med. pract. part. 6. s. 1. c. 8.*

Quid plura? Non rarò planè deficiat Lien, ut supra notatum. Exemplum porrò sunt pecudes in Creta, quæ sunt

iene vivunt, quòd scolopendrio ve-
antur, ut narrat *Viruvius* l. 4. c. 4. *Ar-*
biteet. quod, an sit asplenium, eruditè
plicat *Guil. Rovill.* l. 1. *hist. plant.* c. 4. & s
Ex Recentioribus *Theod. Kerkringius*
serv. Anat. II. idem statuere cum vete-
bus videtur, quando ita scribit: *Quis*
a hominibus, si sectionis dolores
estinare vel velint, vel cogantur, i-
em futurum neget? Historia certè,
quam *Fiorovantius* narrat de Græca
puliere, cui Lienem pendentem 32.
bras exemit, & intra viginti qua-
sor dies curavit, satis liquidò pro-
at, hoc membro carere posse ho-
minem, & vitam sine incommodo
transigere. Analogia etiam omni-
moda, quæ hominibus in rebus natura-
bus intercedit cum bestiis, suadet.

Ita *Francisc. Roussetus* l. 4. de part. Ca-
r. c. 5. totum quoque Lienem à Chi-
urgo exemptum fuisse refert. Sed
hic non est facilè credendum; non e-
nim

nim suâ, sed alienâ fide, ut *Conringius* l. 1. de isto scribit, narrat.

Aliam ferè portentosam sectionem malleo & securi peractam legimus apud *Hier. Fabric. ac Aquapend. in Chirurg. Operat. c. de ust. Lienis & Ventric.*

Leonhardus Fierovanta, Eques, Medicus ac Chirurgus Bononiensis, felixque Empiricus Panormi in Sicilia cujusdam Lienosæ mulieris ventrem dissectuit, atque Lienem scirrhosum *A. Zaccarelli* extraxit pendentem lib. 32. & si ægrotam ab interitu vindicavit. Totam hujus fœminæ curationem delineatam nobis dedit *Excell. Thom. Bartholinus cent. 4. Histor. Anat. § 1. Idem ex Turcarum Chronicis refert*, curantibus futuris Lienem eximi modo in secreto; ibique rarum sectionis hujus exemplum è *Ballonio* l. 2. *Ephem. pag. 251.* notat. Sed vi eò depelluntur & ita à Barbaris his barbaricè & crudeliter tractantur, quo promptiores cursum fiant.

Mira de cursoribus supra fidem penè
elocibus tradunt Historici. *Sim. Ma-*
ndr. l. c. de Lada, qui horum omnium
princeps fuisse olim credebatur, scri-
bunt, quòd etiam supra cavum pulverem
transiit, verit, ita quidem, ut arenis pen-
nentibus nulla indicia vestigiorum reli-
querit. Liene enim carebat. Addit in-
super ex variis *Autoribus* alia cursorum
insolentiorum exempla, præprimis au-
tem *Troglodytas* adducit, qui equis cele-
stiores fuerint, & reliquas feras quoque
cursu superaverint. *Polymnestor* facile
eporem consequi potuit. Sunt etiam
Iovi orbis incolæ quidam, qui cervum
vie integra (mirum dictu) sequantur,
donec lassitudine fessum capiant. Fides
est penes Autorem. Tàm agilis enim
cursu, ut dictis his non cederet, nemo
potest; & licet centum Lienes illi eximan-
tur, ignavioer potius erit eo exemplo,
quia in sanguine stagnantes crassi & tar-
tarei humores Liene absente ritè depu-
ari nequeunt, indeque innumera illi
ma-

mala nascuntur; quod splenetici & scro-
cutici suo subinde damno experiuntur.

Et si curfus, uti multi censent, & me-
deinceps etiam affirmabimus, videlicet
Lienitumenti pro fit, non videmus, ce-
toli debeat. Hic enim, cum à succo co-
piofo nimium turgēt & obftrictus ex-
ficq; corporibus moleftus fit, quonia
pondere fuo vicinas etiam partes prem-
& trahit, nec non ex hujus humoris m-
litia & motu atque vaporibus refpir-
tio fit difficilior; vel à commotione
humoris in Liene fluctuantis pu-
ctio lateralis percipitur, ea propter ne-
ftatim eſt eximendus, cum absque vi
jactura hoc non fieri queat: vel ſi fieri
maximo cum ſanitatís noſtræ detrimen-
to fieret.

Ridiculum hiſce annectimus, quod
vulgus noſtrum credit. Hoc equæ, quæ
do partus imminet, ſtat à latere, omni
curâ & diligentia in id incumbit, ut L-
nem, in lingua pulli poſitum quem ca-
dit, extrahat, & Lienem ipſum ſe ext-
ziſſe probat. Deinde extractâ alie-

portuunculâ carnis, Lienis formam quam
præ se ferre aliqui affirmant, gaudium
gaudent, & equum illum plurimum de-
inde currendo valere, sanctè testantur.
Sed hæc sunt suaves nugæ. Quomodo
enim (obsecro) splen ad linguam per-
veniret, cum nulla via seu meatus adsit.
Hoc quidem non negamus, membran-
ulam quandam aliam fronti adhærere,
quæ copiosa humore & viscositate a-
bundat. Hæmembrana aliàs furor e-
quarum, uno verbo, Hippomanes dici-
tur. Furor autem equarum dicitur,
quia mater, dum lambendo accipit istam
membranam, in furorem quasi adigi-
tur, propter amorem erga pullum. Si
verò lambendo istam membranam non
suscipit, non curat pullum. Unde et
etiam scorta illâ pro conciliando cujus-
dam amore utuntur.

Quamvis igitur Lienis excisio non
planè impossibilis sit, attamen non ne-
cessaria est, nec etiam summo periculo
caret. Dissuadent etiam nobilissimâ
& præstantissimi ejus usus, sine quibus

corpus humanum nec benè nutriri, nec
benè conservari possit. Refragantur
quoque ejus magnitudo & vasa, quorum
mira ibi adest copia, & hæmorrhagiæ
imminentem lethalem minantur. Re-
cusant partes, cum quibus magnus
commercium habet. Lien ergò ad vi-
letudinem fartam testamve conserva-
dam adeò necessarius videtur, ut, si h-
benè sese habeat, universum corpus
plurimis morbis sit immune: fin mit-
fons & origo omnium ferè malorum
quin non rarò ipsius mortis causa sit.

Ethoc, quod hæctenus de exsectione
Lienis admodum periculosa & pla-
non necessaria diximus, nobiscum etiam
sentiunt varii Medici & Anatomici
etissimi ac acutissimi.

Celius Aurelianus l. 3. c. 3. Chronic. p-
dicat: *Quidam etiam decidendum vel*
ferendum Lienem ordinare ausi sunt, q-
quidem voce dictum, non autem off-
completum accepimus.

Cornel. Celsus l. 5. c. 26. de Re Med-
Quibus Lien, inquit (subintellig-

fundo) vulneratus est, vix ad sanitatem
perveniunt, magis si prorsus auferatur.

Tob. Knoblochius lib. Disp. Anat. 7. ite-
dem Lienem ob præcipuam ejus cum
præcipuis partibus connexionem ex-
scindi posse, constanter negat.

Levin. Lemnius l. 12. de complex. c. ult.
ejusdem est sententiæ, statuitque hanc
operationem sine vitæ periculo peragi
non posse.

C. Baubinus Theatr. Anat. c. 43.
vulgo credidi, sed stultè Lienem curso-
ribus eximi, ait.

Vidus Vidius l. 10. de curat. morb. c.
10. ita hac de re judicat: Quamvis Lien
non numeretur inter partes, cujus vul-
nera statim mortem portendant, ejus
tamen esse conditionis, ut facile suas æ-
gritudines communicet ventriculo, je-
juniori & universo corpori, unde hy-
drops, Cachexia, elephantiasis, me-
lancholia, aliaque gravissima affectio-
nes, maxima ex parte ad interitum
perducentes enascantur.

Petrus Laurembergius Colleg. Acad.
tom. Exercit. VII, hæc absurda &
ania de excisione Lienis censet.
la corporis, inquit, quantum vis igitur
bilis portio frustra condita est à ma-
ra. Ergò nec Lien. Parenchyma
dem Lienis tolli posse, superviv
homine, testantur Roussétus de p
Casar, Aretæus d. morb. acut. Sch
kius in Observ. at totum ejus syst
exscindi posse vivo animali, mihi
fit probabile: In illa excisione, p
fiet de venis & arteriis, copioso san-
ne refertis, quarum vel levis
mortem infert.

Cl. Conringius l. de generat. San-
mot. nat. c. 6. ut & Highmorus Disq.
Anat. l. I. part. 3. c. 3. eandem senten-
defendunt. Anatomicus Illustris T.
Bartholinus cent. 4. Histor. Anat. § 1.
quoque inclinare videtur. Semper
ait, dubia fuit relatio de Lienis

fone. Quippe ex Celso l. 5. c. 26. vix
 a sanitatem perveniunt, quibus Lien
 vulneratus, magis si prorsus aufera-
 tur. Nobiles ejus usus dissuadent,
 qui in sanguine acido depurando ver-
 santur, & fermento pro totius inco-
 munitate, nisi vel pancreati, vel
 hepatis, vel alii parti hoc officium re-
 gnet Lien: Præterea metus sangui-
 nis imminet in excisione. Abundat
 Lien arteriis ex cæliaca, & venis ex
 amo splenico, quibus recissis, sanguinis
 cursus impeditus alias partes inunda-
 vit, & ingens hæmorrhagia provocabi-
 tur. Adhæc tam arcte per perito-
 nei membranas, & vasorum Com-
 mercium partibus vicinis annectitur,
 ut sine metu inflammationis, & vici-
 norum damno eximi non posse videa-
 tur. Optandum tamen omni voto es-
 set, ut tot malorum fomes extirpari
 posset. Sed meo judicio, parum profi-

ceremus, siquidem humorum praturum est vitium, qui illo ablato aliam partem eodem damno inficerent.

scirrhus tamen proficua foret illius eesectio, ubi pondere suo nimis est mortuus, & sæpè hydropem advocat.

Anat. Reformat. l. I. c. 16. fabulosam vulgi opinionem arbitratur, in cursoribus eximi & eximi posse Lienem absque vitæ periculo, quod nondum à quaquam visum aut literis mandatum, nisi Plinio, Fluddo, Fiorovanta, Rousseto, qui si veri sunt, pessimè sanè vixisse homines certum est, vel brevi post mortuonobilissimi huius visceris defectu, v parte tantum truncatos exteriori. Nam profundiora Lienis Vulnera pro lethibus habenda ob arteriarum copiam consensum cum partibus principibus.

Paul. Zachias Quæst. Medic. leg. l. 8. tit. 1. quæst. 12. ad eum morbum quoque obnoxium hominem inde evadere potest, ut ex hoc solo irregularitati fac subijciatur. Et Riolani in Phlegma

st: Qui Liene privantur, postea dete-
ius & infelicius vivunt, quia sanguine
rasso ut impuro aliter corpus, tantum ab-
st, ut sint graciliores, & ad omnes corporis
ctiones agiliores.

Manet igitur nostra ex Clarissimo-
um prioris & nostri seculi Medicorum
& Anatomicorum votis unanimibus
ententia vera ac stabilis, Lienem scilicet
n corpore nostro nobilissimi & maxi-
ni usus esse, & ita sine valetudinis jactu-
a neutiquam abesse posse, sed potius,
i mala & vitia ei adherent, convenienti-
us medicamentis eidem succurrendum
esse censemus.

Hoc unicum etiam hic addimus,
quod Orus Apello in hieroglyph. c. 39.
cribit, quod nimirum ii, qui frequen-
es huiusmodi sectiones instituunt, ca-
esque eviscerant, magna ex parte sple-
etici fiant; rationem additam, quia
graves ex incilo animali vapores Lienis
aletudini insidiantur. Ejusmodi sanè
vapores, qui ex una & item altera & c.
ne attrahuntur, si non noceant, etiam

non profunt, cum corporis nostri visceribus ac imprimis pulmonibus magis sint inimici quàm amici, & hominem non in morbum Lienarem, Phthisin tantum facile præcipitare possunt. Quod vero olim Romanis caro canina nullo nocumento fuerit, hoc eorum fecerit consuetudo, quæ ipsis altera quasi natura fuit.

CAPUT VII.

Lienis Ustionem commonstrat.

Ustionem in affectibus Lienis adhibuerunt quoque veteres, & nostrum etiam seculo felici cum successu eam fuisse exercitam ex Hier. Fabric. ab Agnaphend. Bauhinus & Meibius tradunt.

De hac Zacut. Lusitanus l. 2. Histor. Medic. Princp. Dub. 63. ita scribit Sic in desperatis morbis, partes corporis nostri inurere candenti ferro, prisorum sagacitas ad invenit. Quan-

do enim cum dolore & gravitate jecur
vomicâ laborat, & carnea ipsa sub-
stantia vitiata ostenditur, purisque
adeſt in tunica collectio, tunc adurere
oportet, ex Paulo Aegineta l. 6. c. 47.
Ita antiqui purulentum jecur adure-
bant, ut conſtat ex Hippocrate ſ. 7.
aph. 45. Si uſtionem contempſeris,
magna copia puris hepate concepta ef-
funditur in ventriculum, ad tetro ſuo
vapore ſuffocat. Virum verò hoc o-
pus actuali an potenciali cauterio ſi-
derandum, explicat Hollerius in
comm. cit. aph. Sic in longis ſtoma-
chi defluxionibus, ferramenti canden-
tibus mucronatis cruſtas moliri opor-
tet, ex ipſo c. 49. ejusdem libri. Et in
c. 48. ſimili ferramento hepar pluri-
mis cruſtis inurit, ut humor intimiſſi-
me pertinaciter impactus liquetur, & per
ulcera diu fluentia emanet. Accepit
Paulus ab Hipp. l. de intern. affect. n.

26. Hoc modo Andromachus & Archigines apud Aëtium tetrab. 3. serm. 4. c. 11. emplastra ex arsenico & alumine scissili, calce viva cum emollientibus pleni adaptabant, ut crustis excisatis virosus humor in profundo delitescens extraheretur foras. Secured super hanc partem ustiones celebrare poteris, nā Lien non est pars princeps nec principium alicujus facultatis existit; quare Lienis vulnera non semper lethalia sunt &c. Confer. Marc. Aurel. Severinus in Pyrotechn. Chirurg. c. 43.

Et Excell. Herm. Conringius l. de generat. sang. & mot. nat. c. 6. ita differit: A ustio quidem in magnis Lienibus locum habet, unde & Hippocrati, Paulo & Abrucafi commendatur, nostro seculo etiam felici successu est exercita, testatur Bauhino: neque ratio abscondit: Ita enim quā maximè potest tolli aqua copiose quā intumuerunt.

Hæc autem ustio duplici modo fit

vel externè saltem in regione Lienis, vel internè, cute & musculis remotis in ipso Lienis parenchymate. Externè tumenti dolentique Lienis decem per fungos crustas inurit *Hippocrates l. d. intern. affect. n. 13. & seq.* Per ignitum verò ferrum urendi rationem exposuit *Paul. Aegineta l. 6. c. 48.* quæ est, ut per hamulos distentæ cuti, quæ spleni superjecta est, cauterium triplex tridentis instar alterâ infixum transuatur? ita enim sex justæ relinquantur crustæ. Quam omnem Chirurgiam ex *Hipp. l. de loc. in hom. n. 36.* imitari videtur *Paulus Aegineta.* Ex hoc verò *Avicenna l. 3. fen. 16. tr. 1. c. 7.* & *Albucasis*, qui locum inurendum docuit fore illum, quo cubitus sinister pertingit. Hos sequuti sunt *Mercatus, Saxonia & alii.*

Internè Lienis parenchyma cursoribus uri prohibet *Rodericus à Fonseca tom. 1. consult. Medic. 41.* *Gothofred. Moebius* verò *Med. Physiolog. c. 16.* utionem hanc internè factam verissimo exemplo confirmat. Vidit ipse ante ali-

quoc

quot annos Halberstadii apud Suecicum Chiliarchum, à Burstorff, Cursorem Tyllianum in prælio captum, qui singulis diebus novem milliaria Germanica pedibus conficere poterat, & ejus rei hanc dedit causam, quòd ipsi unâ cum aliis quinque juvenibus Lienab Archiatro Tylliano, præmissâ potione narcotica, & apertâ prius sectione eâ abdominis regione, ferro leviter candente ustus fuerit. Ille deinde ejus rei dubitanti, ultrò Lienis regionem denudavit, & cicatricem à sectione residuam satis manifestam ostendit, addens præterea, quod unus de quinque sociis ex ulatione ista mortuus fuerit.

CAPUT VIII.

Ad Lienis symptomata, & primum ad ejus dolorem progreditur.

SUa porro symptomata habet Lien. Interdum enim dolet, & quidem modò tolerabiliter, modò gravissimè, quod in
Ma

Matrona Hallis Saxonum observavit
Mæbius Med. Physiolog. c. 16. Petr. Fo-
restus l. 20. observ. 7. in Schol. dolorem
 hunc distinguit, dicitque, quòd quintu-
 plex esse possit, ut pungens, à membranis
 affectis proveniens; perforans seu mor-
 dicans ab ulceratione; extendens à va-
 pore flatulento; gravans à parenchyma-
 te affecto; & pulsans ab inflammatione
 & arteriis pulsantibus dependens. In-
 terdum dolent muscoli hypochondrii
 sinistri; qui dolor, quomodo differat à
 dolore Lienis, ibidem pariter notat *For-*
restus, qui videatur.

Nonnunquam etiam propter coli in-
 testini annexionem & accubitus Medi-
 ci cum agris falluntur, nescientes, utrum
 dolor is colicus aut splenicus sit. Digno-
 scuntur autem, quòd hic sit gravis & fi-
 xus in una parte, maximèque sinistra: ille
 verò distendens, acutus mobilis, & totus
 venter à flatibus distendatur.

Accidit lateri sinistro dolor puncto-
 rius, isque acutus, qui sæpius inflamma-
 tionem mentitur. Hic cum superiora
 petit

petit, diaphragma similiter afficit, unde
difficilis respiratio accidit. Ad diaphrag-
ma enim, quemadmodum *Bartholinus*
& alii exercitatissimi Anatomici testan-
tur, parte suâ membranosa alligatur,
hancque, uti diximus, præ parenchymate
admodum sensilem obtinuit. Interdum
à connectentibus fibrillis costarum et
jussdem lateris per sentitur dolor, cumque
extenduntur, unâ pleuram trahunt, tum-
que inter respirandum punctorii dolo-
res molestissimi sunt. Arguit autem et
jussmodi dolor Lienem non parvum, non
siccum & induratum, sed magnum &
succulentum: arguit præterea humorum
affluxum, æstum & flatuum præsentiam
alia siquidem pondere suo atque vi do-
lorem inferendi vim habent. Succedit
etiam nimis potationibus, risui nimis
& cursibus vehementioribus. A scirr-
rho etiam idem dolor obrepere potest
tumor namque, qui in parte carnea est
extendit vincula. Qamvis enim inde
lens putetur scirrhus, expers tamen do-
loris non est, sed comparativè tantum

ita dictus, siquidem obtusus, gravativus,
lentus, diuque durans animadvertitur.

Cum reni sinistro peculiariter fibril-
lis aliquibus annectitur etiam Lien, eve-
nire potest, ut attollente se viscere hoc,
dolor nephriticus oriatur.

CAPUT IX.

*Lienem variorum morborum &
symptomatum aliarum partium per
consensum esse scaturiginem de-
monstrat.*

Lien malè affectus totius corporis œ-
conomiam turbare, plurimasq; par-
tes in consensum trahere valet. Imò
quòd dixit Hippocrates de utero, quòd
foeminae sexcentarum ærumnarum au-
tor sit; idem nos de Liene asserere pos-
sumus, quòd infinitarum ferè calamita-
tum faber existat. Dum enim archeus
seu natura Lienis aut suo aut alieno er-
rore malè administrat officium suum,
cruda coctis, crassa tenuibus, sicca humi-
dis

dis, salsa, acida & adusta dulcibus domi-
nantur, *Διὰ χύρην* accidit humorum,
omnia in pejus ruunt, partium symmetria destruitur, angitur cor, obnubilatur cerebrum, deiecitur appetitus, coctio diminuitur, nutritio depravatur, sensus & motus in partibus debilitantur & torpescunt, unde enumerata non minus mala, quam scabies, ulcera maligna, varices oriuntur, & quando nulla *πνευμάτωσις*, sed ciborum *μόλυνσις* perdurat, scorbutus ac alii gravissimi affectus admirandis symptomatum myriadibus stipati eminent. Et quævis interdum minus in vitio esse credatur Lien, eò quòd actionis suæ vitia in se ipso expressa non generet, attamen ipse cum mediante sua tinctura non ita quoscunque humores excrementitios in sanguine coquit, fermentat, & ita disponit, ut in singulis emundatoriis convenienter expurgari possint, vel etiam jam morbi finem non erendat, horum malorum largissimus promus condus est. Quamvis enim aut non admittunt, aut pellere de se ma-

se mala possunt viscera, vix iniuriab eodem stigma sibi aliquod patiuntur. Ad eò laudabilem corporis colorem præ se ferunt quam plurimi hypochondriacorum & scorbuticorum, ut ne agrotare deprehendantur, nisi & ipsi, quid patiantur, indicarent.

Vix, per quas humores aut vapores vitiosi à Liene ad caput, cor, ventriculū, intestina, renes, uterum & alias partes ferantur, per quas etiam Lien se exoneret, sunt communissimæ. Motus verò causæ morbificæ, & ejus ad hunc vel illum locum inclinatio particularis, quin naturæ robur & consuetudo, tum partium recipientium imbecillitas faciunt, quo minus atque ex arte prædixerat Medicus, symptomata præcitata sequantur. Hinc non omnis vomitus & alvi fluxus sanguineus est exitiosus, sed convenit, ut ex *Hippocrate* & *Galeno* videre licet. Ut autem eò melius hæc intelligantur, affe-ctus & symptomata præcipua, quæ corporis humani ventribus tam supremo quam

quàm medio & infimo, ac partibus etiam
externis oboriuntur, nec non in Liene
primum radicem potissimum habent, im
sequentibus capitibus paucis contempla-
bimur.

CAPUT X.

*Ventris supremi in corpore humano af-
fectus & symptomata, quæ à Liene or-
tum trahunt, enarrat.*

Circulationis lege, ut Sect. I. diximus,
Lien per ramum splenicum cum
variis corporis partibus, etiam remotissi-
mis insigne habet commercium. Hic
sanguinem vel purum, vel pro statu Lie-
nis impurum recipit, deinde per venam
portæ & cavam ad hepar & cor revehit,
sicuti aortæ mediante dicto ramo sple-
nico ferè à singulis partibus sanguis ad-
vehitur, qui pro constitutione Lienis
aut vitiosus manet, si talis advehitur, aut
vitio Lienis corrumpitur, licèt bonus
transmissus fuerit. Quare si Lien offi-
cium

cium suum deserit, nullam partem in corpore nostro à crudelitate hujus visceris in corpus nostrum savientis vacantem inveniemus: adeò quidem, ut si ne ulla injuria fundi nostri calamitas dici possit. Nam depurandi hoc sanguinis munere si frustratur Lien, gravia & multa inde emergunt & suscitantur symptomata.

Totum caput & cerebrum, licet à Liene sint satis remota, gravissimè tamen ejus culpâ possunt affici, & in varia symptomata præcipitari.

Hunc cerebri consensum cum Liene, & inde variorum symptomatum ortum diligenter Hippocrates l. 2. prædict. notavit: *Quibus sanguis è naribus profluit, etsi alioquin sani videntur, iis tamen aut Lienem tumidum, aut caput dolere, aut splendicans quiddam ante oculos observari comperies. Magnà verò ex parte unà & caput & Lien hunc in modum se habere videntur. Quibus Lienes magni, iis gingiva vitiantur,*
Eos

Et os grave olet. Cornelius Celsus dicit
Re Med. l. 2. c. 6. verba hæc ita explicat:
 Quibus sæpè ex naribus fluit sanguis,
 his aut Lien tumet, aut capitis dolores
 sunt, aut quedam ante oculos tanquam
 imagines observantur. Item qui gra-
 vedine ex capite laborant, non facile
 Lienis incurrunt magnitudinem aut
 tumorem, ait Hippocrates *l. 6. de morb.*
vulg. Etenim interprete Foesio destilla-
 tioni aut gravedini obnoxii pituitoso-
 tenui, aquoso, & plurimo crudo sangui-
 ne, non crasso, feculento & melancholi-
 co, uti Melancholici, abundant.

Melancholiam ex hypochondriis
 Liene non rectè constituto sæpè nos ob-
 servavimus; quod plurimorum quoque
 Autorum testimoniis confirmari potest.
 Modum verò quò hæc fiat, egregiè nobis
 explicat Cl. Ioh. Theod. Schenckius *Dis-*
sertat. de trib. coct. c. 10. § 13. Nimirum
 crassus & à fecibus suis in Liene non fa-
 tis depuratus sanguis per venas cordi re-
 missus, & per arterias delatus in cere-
 brum,

brum, ibique non ritè in venosos ductus transumptus, sed circa anastomoses stagnans, spiritus inquinat, & eorum puritatem contaminando, naturalemque temperiem alterando, melancholiam excitat *Φόβος καὶ ὀυδμήν*, tristitiâ & metu, ἀνευ *Φανερῆς αἰτίας*, absque manifesta causa terrificam.

Morbum comitiales seu epilepsiam cum melancholia conjunctam à splene ortam vidit *Nic. Tulpius l. 1. observ. Medic. 9.* in juvene. *Lien in eo*, ait, à *turgida atra bilis fermento jam tumidus*, diffudit ilicò ex se vapores cerebro tam inimicos, ut juvenis protinus concideret in vehementissimos morbi comitialis insultus, excitatos non tantùm à causa interna, sed subinde quoque ab externa. Nam pressâ vel solo digito regione Lienis, contrahabantur ilicò omnes nervi, & sequebatur *confestim miserabilis universi corporis distentio*, cadens iteratis suis circuitibus usque

usque eo mentem jam aliquoties labie
factatam, & cum primis v. in ipsius
Imaginatricem. Et *Cl. Sennertus l. 1. part. 5. f. 1. c. 4. Med. Practic.* meminit
virum hypochondriacum epilepticum
factum, tandem etiam cœcum eva-
sisse.

In aliis sævissimi capitis dolores, ve-
tigo, apoplexia, mania, ὀδονταλγία
Phytalismus & alia à splene orta sym-
ptomata deprehenduntur.

Varices in Lienosis non rarò sub lin-
gua & inferioribus labiis visuntur, quod
rum meminit *Sennertus in lib. de Scor-
but. c. 5.* itē dentes corroduntur, vacillam
vel planè etiam ore excidunt. Oris ulcu-
cula in ejus modi temperaturis, item
stulæ in maxillis videntur. Sic *Gothofredus
Moebius Med. Physiolog. c. 16.* in nobili
Matrona palati tumorem, qui apertus
fœtentem materiam emittebat, obser-
vavit, cui demùm cancer lividis spar-
ramulis cum summo dolore succedebat;
qui tamen, cum esset incipiens

sanatus est. Confer. *Benedict, Sylvatic. Cent. 1. consult. & respons. Med. observ. 19. Laz. River. tom. 2. prax. s. 5. c. 5. Hoefer. l. 3. Hercul. Med. c. 3.*

Hos horrendos Lienis insultus totum caput ac cerebrum patiuntur, cum vitiosus sanguis illis infertur. Ille enim sanguis, cerebro qui cessurus est in alimentum, purus, quantum possibile est, esse debet.

Sanguis namque, qui est in homine, ut *Hippocrates l. 1. de morb.* loquitur, maximam partem ad prudentiam confert; quidam totum dicunt. Hinc à Liene mentis acumen & sagacitatem proficisci vulgò dicitur, & Lienosi pro ingeniosis habentur. Lien enim cum cerebro per nervos intima habet commercia. Spiritus animales in magna copia ad Lienem per nervos fluunt, ut tinctura nobilissima horum beneficio in eo elaboretur, ac universa sanguinis massa, si non unâ vice, crebriore tamen transitu, illustretur. Hic sanguis Lienaris, bonus tamen, ad cerebrum delatus, spiritus

ritus animales exacuit, eosdem segness
rigit, ac ad motus pernices irritat.

CAPUT XI.

*Ventris medii in corpore humano ad
fectus & symptomata, quæ Liene
primum autorem agnoscunt, pro
fert.*

COr à Liene laborante facillimè
consensum trahitur, nec ab eo
solum obstructionibus & tumoribus
verùm à vaporibus etiam pravis & ma
gnis ad istud exhalantib⁹ palpitat; quæ
exempla apud Zacut. Lusitanum l. 2. N.
dic. Princ. Histor. obs. 39. Petr. Forestum
17. observ. 5. Eugalenum observ. Mea
legimus. Sic etiam notante Tulpio
Observ. Med. 19. Adriano Roestio, præ
cto marino, excitavit induratus L.
tàm algidum malæ sinistrae torporem
nullis remediis potuerit calor iterum
cutem evocari. Unde paulatim ob
deri cor incepit, & à tetro malignæ b
ha

halitu tam frequentes productæ sunt palpitationes, ut æger tandem incidat in lethalem gangrænam. Et Cl. *Möbius* l. e. in virgine, ut & in viro nobilibus hujusmodi palpitationes gravissimas observavit.

Respiratio quoque læditur, & dyspnoea oritur à tumente Liene, pondere suo diaphragmatis, cui alligatur, motum impediente. Anhelare Lienosos omnes observavit *Helmontius* *Tract. de Asthma. & Tussi* §. 59. dum præ senio defungi Lien incepit. Tussim etiam aridam, Liene affecto, provenire noscum *Donat. Anton. ab Altomari de medend. corpor. human. mal. c. 47.* statuimus. Et ipsa Phthisis nonnunquam excitatur, cum scilicet Lienis infirmitates & obstructions eam ipsam falsedinis, acrimoniæ & impuritatis labem sanguini communicant, quam postea naturâ vel ex morbo imbecilles pulmones faciliè suscipiunt.

CAPUT XII.

*Ventris infimi in corpore humano affe-
ctus & symptomata, quæ causam ra-
dicalem in Liene habent, ex-
primit.*

HEpar plurimas calamitates Liens
fert acceptas, ejusque vitio intumescen-
tiam, obstructiones, hydropem, icte-
rum flavum, nigrum, aliaque symptomata
incurrit, sanguine existente crassiores,
nec satis à Liene ope & beneficio suæ tim-
eturæ cocto ac fermentato. Imò rarò Lien-
ne afflicto hepar ob vicinitatē manet im-
mune: licet hepar sæpè laboret, Liene op-
timum se habente. Et hæc causa est, quare
Lienos si identidem in dextro quoque
hypochoondrio | non minus intumes-
cunt, quàm in sinistro. Inflato nempe
Liene, flatulentus ille humor sæpè pec-
torum splenicum in ipsum hepar diman-
nat: unde & vena splenica cum rami-
bus suis, & ipsum hepatis viscus in tumorem
agitur. Interdum etiam accidit, ut as-
quatur

qua, quâ Lien tumet, nunc in articulos delapsa arthritidem creet, nunc verò per vesicam excernatur. Id verò nisi fiat, permanens aqua in venis unâ cum sanguine aut è naribus erumpit, aut verò in hepate remanens dextrum præcordium tendit atque attollit. Ejus rei plurima apud Autores præstant exempla. Ab ictero invetrato diuturniore, teste *Vesalio Fabric. corp. hum. l. 5. c. 9. Prosper. Marcellus* Florentiæ mortuus, habuit mollem ingentemque Lienem, cum jectore magno, duro & viridi.

Hydrops non semper ab hepate affecto, sed sæpius quoque à Liene laborante oritur. Nam præstantissimi Medici ac Anatomici, & inter eos *Vesalius l. c.* in hydrope Lienem vitiosum, hepate planè salvo, deprehensum fuisse testantur. Atque *Cl. Sennertus l. 3. part. 6. s. 2. Med. practic. c. 3.* in hydropico quodam & simul scorbutico, omentum corruptum, Lienemque pravè dispositum, hepate salvo vidit. Præterea *Hippocrates etiam 2. prognostic.* docet, hydropem aliquan-

do ab hepate aliquando ab ilibus oriri
 galli sacerdotis Bononiæ in xenodochico
 aquâ subtercutem mortui Lienem vidit
Vesalius l. c. exiguum eumq; albidum. Si-
 mile exemplum habet *Joh. Frideric. Tra-
 felman* apud *Schenckium*. In hydro-
 pe, Porro lapidosum omninò Lie-
 nem *Forestus*; intus instat sanguinis
 putre facti *Schenckius*; vitiosum, vesicu-
 lasque ei adnatas *Platerus*; intumescen-
 tem, scirrhusum & durum, itemque
 corruptum, & similem pici liquatæ *Ri-
 verius* observârunt. Unde patet, non
 omnem hydropis speciem ex summa he-
 patis imbecillitate aut intemperie per-
 petuò generari.

Icteri seu arquati nigri ortum Lienis
 vitio non immeritò *Autores* adscribunt
 quanquã *Platerus tr. 3. l. 1. c. 2. prax.* id eo
 argumento neget, quòd nulla sit ex Lie-
 ne in venam cavam via; quam tamen ex
 Liene per ramum splenicum in venam
 portæ & consequenter in cavam sati-
 patentem invenimus. Civem quoque
 Patavinum tribus annis in carcere de-

tentum, & tandem hoc affectu mortuum aperuit *Vesalius*, & vidit in eo Lienem exiguum, sed aridum & impensè durum, ut *l. 5. c. 9. Fabric. corp. hum. legimus.*

Ventriculus à vicino Liene non benè constituto graviter interdum afficitur. Hinc malè coquit, appetitus est plerumque prostratus; id quod hypochondriaci & scorbutici maximo suo cum damno quoridie experiuntur. Imò humor melancholicus nigricans in Lienis vasis restagnans sæpè vasa p.n. aperit, & in ipsum ventriculum sese effundit, & quidem per transudationem è tunicis magis, quàm veram effusionem in ipsum cavum stomachi, cùm vas breve in hoc manifesto hiatu non terminetur, sed intra ventriculi tunicas potius oblitescitur, ubi vel per vomitum, vel per alvum ejicitur.

Hoc in Cive quodam Jenensi se videri asserit *Mæbius l. c.* Hic per aliquot septimanas singulis diebus humorem atrar atramenti nigricantem vomitu

rejecit, simul de dolore hypochondrii
 sinistri conquerens: quo affectu, emac-
 ciato pedetentim corpore, tandem et-
 tiam obiit, frustra multis tentatis reme-
 diis. Sic etiam Cardinalis Cibi, cujus
 meminit *Valverda*, sanguinis vomitione
 defuncti ventriculus, Liene compresso,
 turgescibat, & è contra, compresso
 ventriculo, Lien turgere deprehende-
 batur. Et Nobilissimus quidam in Da-
 nia Vir, sexagenarius, referente *Thomae*
Bartholino cent. 3. Histor. Anat. 36. vom-
 itum cruentum perpetuum patieba-
 tur, inque magna copia per statas vice
 sanguinem rejecit à Liene, nullo vitæ
 aut valetudinis damno, sed salutaris eva-
 cuatione. Supra trigessimum annu-
 to commodo gavissus est, sanusque ho-
 medio vixit, & si subsisteret, vitæ suæ
 incolumitati timuit.

Intestina Lienis impetus interdum
 tiam patiuntur; interdum verò per
 Lienem salubriter exonerat. Sic eni-
 scribit *Hippocrates sect. 6. aph. 43.* *Quod*
Lienosi difficultate intestinorum con-

ripiuntur, iis supervenientem longam dysenteriam aqua intercutem & lavitas intestinorum excipit, & moriuntur. Nimirum, ut Galenus in comm. explicat, quibus longo tempore Lien induruit, iis superveniens dysenteria malum solvit, ratione traslationis, & evacuationis humorum crassorum, melancholicorum, qui in Liene infixi erant. Si tamen immoderatio sit dysenteria, labefactantur praverum humorum transitu intestina, & cum vires ipsorum, tum calidi innati oppellejia in venis & visceribus pereant, hydrops & Lienteria oriuntur. Et aph. 48. ita differit: Lienosis difficultas intestinorum superveniens, bonum. Hoc est, ut Liebauus apud Holler. in comm. super hunc aph. exposit: Lien humore melancholico pleno, deplendo, salutaris est dysenteria, non ea quidem, qua est ab atrabile:

ea enim lethalis esse consuevit : non
 ea, quae est cum ulcere intestinorum
 nisi forsitan ab humore melancholico
 fuerit, qui diuturnâ morâ putredinem
 & à putredine acrimoniam quandam
 acquisiverit, aut qui acri humori per
 mixtus, acris evaserit : Cujus ac
 crimonie vi atque impetu ulcus in in
 testinis suo transitu excitari potest
 qualis dysenteria salutaris quoque Lien
 tiosis futura est, si modo diu non perse
 veret ; non ea, inquam, quae longa est
 haec enim hydropem aut lenteriam in
 vehit, sed ea quae cruenta est, & quae
 diu non perseverat.

Pancreas, Liene affecto, ut ait Na
 than. Highmorus Disquisit. Anat. l. 1. par
 2. c. 8. vix aut nunquam integrum eva
 dit; plerumque enim simul obstruitur
 vel scirrhus afficitur. Hinc forsitan
 Riolanus Anthropograph. l. 2. c. 16. pan
 creas, cum in morbois ac melancholici
 corporibus Lienis affecti vice fun

gatur

gatur, vel etiā morbis Lienis similes effectus incurrat, Lienem vicarium appellat: Quod Cl. *Thuari* exemplo docet, cujus occur, aperto cadavere, deprehensum est induratum, rotundum, instar sphaerae factum, & transfixum gypseâ pituitâ, seivum referente; pancreas verò amplitudine suâ, & pondere ipsum hepar æquavit, totum scirrhosum, multis globulis speciei ovi columbini refertum, Lien verò exilis fuit, ut vix unciam ponderâset. Imò, quod majus est, pancreas affectum gravissima symptomata, ut Lien, proferre solet, veluti: tabem, febres, scirrhos, abscessus, steatomata, hydropem, vomitum, inquietudines, vigilias concumaces, lipothymiam, convulsiones, in foeminis passionem hysterica, aliosque perniciosissimos affectus, qui ex hoc fonte, quasi ex pandoræ pyxide ad perniciem humani generis non infrequenter erumpunt, testibus *Fernesio de part. morb. & sympt. l. 6. c. 7. Joh. Riolano. Anthropolog. l. 2. c. 16. & Fabric. Hildano cent. 1. observ. Chir. 71. Sic*

miserium pancreatis suppurati exemplum legimus apud *Nic. Tulpium*. l. 4. *Observ. Med.* 33. In juvene quodam, quem quasi natum ad miseriam, ductâ iam formosissimâ uxore, febris quartana, paucis post annis in eas, contra morem aliorum hominum, redegit angustias, ut nequiverit unquam in cubiliâ quiescere, nedum, urgente etiam vel maximâ dormiendi necessitate, si nocte, si die somnum capere, nisi vel pronus consideret in sedili, vel caput imlecto haberet sublime, interdictâ ipsi quasi omni decumbendi copiâ; corpore enim vel minimum, si retractorum, si in alterutrum latus inclinato, vix dici potest, quàm acerbos ilicò persentisceret dolores cum in lumbis, tum in ventre, quorum cruciatibus quâlibet febris accessione tam miserandum in modum excarnificatus fuit, ut oppressus miseris, ne dicam enectus, non invitatus tandem è vi a discesserit, s. Etâ Medicis copiâ inquirendi in naturam luctuosorum symptomatum, quorum effrenatis

insul-

insultibus ne *Hercules* quidem par fuisset. Invenit autem Anatome jecur inflammatum, intestina vitellina, ventriculum verò atrabile perfusum, eandemque in turgidis omenti, ac multi jugis Lienis venis, quarum congeriem vas breve perperam vocant, adeoque copiosam, ut eoram omnibus digito inde experimeretur: in varicosis vasorum spermaticorum anfractibus, vesiculisque sub vesica positis, ob exectum alterum testem, plurimum stabulabatur seminis. Sed potissimam admirationem movit pancreas supra infraque ut extuberans, ac turgidum, sic intus sordido pure ac viscida pituitâ impendio nimis infarctum. Cujus pondere depressis oclulisque venæ cavæ, ac arteriæ magnæ tunicis, visceri huic suppositis, ut emarcuit juvenile hoc corpus genio suo defraudatum, sic excitavit contumax ipsius obstructio summas illas præcordiorum angustias, quæ commitabantur quasi unq; febris accessiones; in calefcente procul dubio putrida hujus

vilceris proluvie, sive ab incendio febrili, sive à pulvinorum calore, cujus vapores deinde in ventrem, spinalem medullam, cerebrumque delatos, ecquis non videt excitasse dira illa symptomata, quibus corpus hoc quotidie fuit exagitatum.

Suppurato ergò pancreate, vel obstructo saltem eo, atque ipso adeò retentis excrementis intumescente, tot pariter valis compressis, & hepar & Lien gravibus damnis afficiuntur, quemadmodum exemplum ex *Tulpio* adductum luculenter monstrat. Et licet sæpius contingat hepatis Lienisve affectiones pravæ, malam pancreatis constitutionem inferre, non rarò tamen contrarium evenire, experientia docet. Hoc in nobilissimæ nuperrimè *Highmorus* observasse se l. c. scribit, quæ annos retro plures, convulsionibus, epilepsiâ & passionibus hystericâ laborabat, & tandem post doctores & cruciatus exquisitos, vitam curæ præsertim commutavit. Apud *Eundem* pariter quodam Lugdunensi refertur

eur, qui nihil dormire potuit, sed cum dormire conaretur, in lipothymiam inciderebat, donec tandem mortuus; aperto corpore, pancreas, integris salvisque cæteris partibus, duntaxat repertum est abscessu putrefectum. Imò in cadavere profratris *Cl. Blasii Nic. ab Ouringa* 14. annorum pueri, lentâ morte extincti, à Practico-exercitatissimo *Barbette*, aperti, ut ipse *Blasius Comm. in Veslingii Syntagm. Anat. c. 4.* scribit, hepatis Lienisve constitutio naturalis omninò observata est, cum tamen pancreas hoc verum, non minus quàm illud *Aselii* in menterio, sciri nosum omninò, maximèque molis fuerit, accedente, & præter alia plurima, intestinorum hinc inde coaliti, nec non gangrænâ verâ.

Affectus hypochondriacus, scorbutus, cachexia, & ex hisce pallor faciei seu color expallido fuscus, aliaque gravissima symptomata maximam quoque partem à Liene p.n. se habente proveniunt. Nihil enim frequentius in hisce, quàm ut de sinistri hypochondri dolore gravati-

vo conquerantur. *Bello armatus* insigni
Ictus apud *Vesalium* l. c. annis multis pa-
 lidus & Lienosus à Medicis iudicatus
 mortuus, & sectus à *Vesalio*, habuit mor-
 lem magnumque Lienem. Interdum
 in scorbuto præsertim, plurima sympto-
 mata ex vitio Lienis simul in uno ægre
 to occurrunt. Ante aliquot annos in viro
 quodam generoso Saxone splenetico
 & de sinistri hypochondrii dolore con-
 querente vidit *Mœbius* l. c. maculas scor-
 buticas, arthritidē vagam cum variis hinc
 inde in partibus musculosis prorumpen-
 tibus, cordis palpitatione, melancholiā
 vigiliis, appetitu prostrato & dyspepsiā.
 In hisce autem affectibus Lien afficitur ut
 pars similis, temperata, ratione com-
 ponentium partium, quatenus hæc à tem-
 perie solita desciunt; & intemperata ex-
 vadunt; ut dissimilis & organica, ra-
 tione meatuum vasorumque: arteria-
 rum, quibus maximè abundat, obstru-
 ctione, quæ in causa est, quominus attra-
 hantur in debita quantitate succi san-
 guinei depurandi; venarum, quæ allaturæ
 per

per arterias sanguinem limosis terrestribus atomis non defecatum, revehere partim non possunt, partim reiecto, ceu miscele quodam, inficit totam sanguineam massam, quæ iterum ad partes per arterias delata, variorum huiusmodi symptomatum est autor.

Quoad substantiam itidem Lien afficitur, quatenus restagnans depurandus sanguis & motu peregrino subsistens fermentatur, depravatur, adeoque distendit membranas splenicas, dolorem gravativum subinferens. In apicem scilicet prodeunt, quibus segregatio debebatur, excrementitiæ molecule, salso-acidæ aciores evadunt, sicque totum funditus penetrant Lienis fungosum corpus, ut interdum subaugescens in tumorem elevatus fuisse observationibus constat.

Renes non leve à Liene patiuntur incommodum, dum tartarus & acida salia volatilia ab eo non probè admodum beneficio suæ tincturæ præparata in his stagnant, & tunc, quoniam crassiores huiusmodi, scorix adhuc in

sanguine hærent, excerni nequeunt, indeque plurimorum malorum causæ nobis oboriuntur, quemadmodum etiam præstantissimi Medici vel ad unum omnes uno consensu nobiscum idipsum approbant. Interdum urina nigricantes atramento similes, testibus Hippocrate l. 3. Epid. s. 3. t. 10. Zacuto Lusitano l. 2. Histor. Medic. Princip. Dub. 63. & Ioh. Rhodio cent. 3. observ. Medic. 31. excernuntur.

Tumentibus hæmorrhoidibus, fluxusque hæmorrhoidum immodico in Lienosis nihil frequentius. Quæ, si tumentes aperiantur, magnum auxilium Lienosæ præbeat. Hinc melancholicum morbum etiam incipiens hæmorrhoids plerumque prohibet & jam effectum remittit, secundum effectum Hipp. s. 6. aph. 1. Melancholicis & Nephriticis hæmorrhoides supervenientes bono sunt. Hoc est: Melancholicos affectus & renum mala curant hæmorrhoides succedentes, id est sponte naturæ prodeuntes. Neque enim sunt excitandæ, nisi sit consuetudo. Eadem

ram nempe consuetudo mala est, siue multum, siue parum fluant, ut scribit *Hol-derius comm. in hunc aph.* Immoderatum etiam earum fluxum Lien sanat, cum scilicet ipse corroboratur, atque omni infirmitate liberatur.

Uterus tandem in foeminis Lienis peccata quoque luere tenetur. Liene enim obstructo, sanguis crassior ac feculentior ad uterum vehitur, menses subsistunt; & exinde interdum foedi colores virginum & mulierum aliaque symptomata oriri solent. Sic vidua quaedam apud *Petr. Forestum l. 28. observ. Med. 9.* ex mariti obitu ita tota mœsta & melancholica evasit, ut in maniam ferè incidere, adeoque ut sanguis crassus, multus & melancholicus ob crassitiem humoris ejusdem non solum uteri vasa obstruxerit, quò minus menses fluerent, verum etiam in toto corpore abundare coeperit, Lienis obstructione accedente: quod & dolor in hypochondrio sinistro perceptus indicavit, maximè quòd tempore autumnali *Forestum* consultum veniret.

ret, quo videlicet tempore humor illi
magis abundare consuevit, virginem ead
iam nobilem splenicam novit Moebius
l.c. quæ menses difficulter & cum dolore
emittere solebat.

CAPUT. XIII.

*Febres, quarum fons Lien est, com-
memorat.*

Quartana febris hîc suam fixit sedem
Vix aliquis diuturnâ febre quartan
nâ & nulla arte medicabili detinetur
quin vitium sit in Liene, ut antecedens &
consequens, inquit *Ballonius l. 1. consi*
107. Antecedens est infirmitas in sub
stantia latens, indeque exorta *αγαμέμνων*
γία. Consequens est infirmitas ex mor
bo aliquo precedente contracta. Unde &
vel durante eâ, dolor Lienis; vel cessan
te, is etiam succedit, vel tumor, durities,
hydrops, aliaque symptomata sequuntur
qualia exempla collegit *Petr. Forestus in*
obseru. suis Medicis. Galenus 1. aph. comm

2. similiter statuit, splenicis & omnino
 melancholicis quartò quoque die fieri
 recessiones, nimirum quartanarum fe-
 brium. Quæ doctrina fuit ipsius Hippo-
 cratis constat ex l. de nat. homin. & sect. 2. E-
 pid. s. 1. s. 24. Nullam tamen febrem sine
 bile oriri accensa prius, probat & opere-
 re explicando defendit Prosper. Martia-
 nus in comm. de nat. hom. cum scribitur
 οἱ πλείστοι πυρετῶν γίνονται ἀπὸ χολῆς.
 Febres magna ex parte, à bile oriuntur,
 ut, σύνολοι, ἀμφίμερονος περιττοῦ
 καὶ περιττοῦ.

Helmontius tract. de Febr. c. 6. s. 9. Lie-
 nem sub quartanæ torturis tolerare
 multa, docet, ut nigræ & retorridæ bilis
 cloaca fieri queat. Sedes autem, sub-
 jungit, non est in Lienis corpore, sed
 in arteriis, si non in omnibus, tantum in
 aliquibus, cum hoc viscus præ reliquis
 frequenti arteriarum propagine sit di-
 latatum.

Clarius Lienem Quartanæ focum ne-
 gat Gremsius l. 2. de natur. febr. c. 2. pag.
 401. Cùm Lien in illa non inflamma-

tur, neque detur humor melancholicus. Volunt autem ambo, causam chyli aciditatem in splene, qui quartana est exlex, in ibique archeum in furem convertere, propterque digestionem propriam vitiatam multa in cornu grua produci. Verum alia etiam praeter bilem *ἐν γαστρὶ* febrilem suscipere possunt. Motu frigidissima etiam incallescunt. Febris nulla fit, non affecto corde, etque non prius communicato fomite. Febris non est calor, inflammari prius Lien non debet. Lien verò quā suum archeum, quā vitiatam digestionem & in cornu grua producta est fomitis quartanae subiectum, ipsis etiam assentientibus. *Σύμφοι πῖα, σίμφοι πῖα, καὶ σίμφοι πῖα*, confluxio una, conspici ratio una, consentientia omnia Lienem eximi vetant. In universum, viscera febres progenerant; cumque actio huius visceris circa ejusmodi humorem *διὰ τὴν* febrilem versans negari non possit.

possit, & Lienosiâ quartana frequen-
 tus corripiantur, perque eandem libe-
 rentur, uti testantur *Hippocrates* s. 8.
ph. 70. & *Galenus comm. 2. in 1. Epid. l. 4.*
 Lienem febris ejusdem fontem præci-
 uum esse, omninò arbitramur.

Nec hujus tantùm quartanæ febris,
 erùm aliarum etiam tùm simplicium,
 tùm compositarum febrium fons & sca-
 urigo est Lien, nisi ipse probè suo fun-
 atur officio, talemque tincturam gene-
 et, quæ sanguinem purum ac laudabi-
 em reddere, cunctisque visceribus no-
 um robur ac singularem vigorem im-
 ertiri possit.

CAPUT XIV.

*Externos quosdam corporis humani
 affectus à Liene provenientes
 producit.*

Elephantiasis, Cancer, scabiesque
 sicca sua itidem primordia è Liene
 ucunt. *Vesalius l. 6. in elephantiasi la-*
 bo.

borante turgidiorem majoremque im-
perit Lienem.

Ulcerata tibiârû & varices Lienis viti-
suppûllulare multi attestantur. *Hippocrates* l. 2. prædict. ait : quibus Lienis
magni sunt, neque sanguinis eruptiones
contingunt, neque os graveolet, in
biis ii mala ulcera habent & nigras cic-
atrices

Cl. Nic. Tulpus l. 2. Observ. Med.
30. censet hæc signa à veteribus com-
memorata indicare magis humoris m-
lancholici putredinem, quàm Lienis m-
gnitudinem auctâ. Atrâ quippe bile, a
circa Lienem putrescente, vitiatur m-
tantum os, sed erumpunt utique varices
& leduntur tantoperè crura, ut memi-
rim vidisse in annu quartanaria, à putre-
hac bile ultra viginti ulcera, non min-
profundè cruribus impressa, ac si cand-
ea inuississet ferrum. Verùm quòd isti
sanguinis vitium à Lienis vitio pro-
niat, plus satis notum.

Celeber. Sennertus Tract. de Scorbut.
meminit custodis templi in arce Wit-
bee

pergēsi, quòd ei scorbutico vena in medio ferè crure sponte aperta fuerit, quæ sanguinem satis copiosum per aliquot dies fuderit, ut à chirurgo sisti non poterit.

Dolores artuum vagi in scorbuticis, liene suo officio non ritè fungente, sæpius occurrunt. Fiunt autem, quando eccans materia scorbuti in vaporosa substantia cum tenuibus humoribus permixta, diversimodè hùc illùc in humano corpore movetur, & potissimum sensibiles articulorum partes afficit.



ANATOMIÆ LIENIS SECTIO IV.

*Quæstiones quasdam singulares ad Li-
enem spectantes ventilat.*

CAPUT I.

*Quæritur (1.) An Lien semper sit se-
des & causa Melancholia?*

Affe-



Effectus melancholici per
 am Lienī malē habenti v
 gō adscripti sunt ex falsa hyp
 thesi, quā Lien credebatur receptac
 lum melancholiæ: quæ sententia vec
 plurimorum, si juxta ipsorum mentē
 capiatur, corruiť pridem, imprimis p
 sanguinis circulationem inventam. D
 terea tamen non omnis melancholia
 Lienem relata est, ne à veteribus quide
 Notissimum enim cuius existit, qui nec
 est planē hospes in arte, melancholia
 aliquam primariam statui (præter h
 pochondriacam) quæ sedem suam
 cerebro habeat; ubi ergō Lien neq
 quam præ aliis visceribus sit labefact
 tus; sic quoque alia melancholia qu
 dam universalis statuitur, ubi massa sa
 guinis universalis vitiata est; atque hīc
 iam Lien præ aliis visceribus haud
 cessariō affectus est; sed & ipsa mel
 cholia hypochondriaca dicta, ut & aff
 ctio speciatim hypochondriaca appe
 ta, à plurimis pridem excellentissim
 Medicis, Sennerto, Ioustono & aliis,

etiam ante sanguinis circulationem admissam, non Lieni duntaxat, sed & hepatis, mesenterio, omento, quin & ventriculo (cui soli sedem primariam mali in affectione hypochondriaca attribuit *Highmorus*) transferibi consuevit. Sic quoque dari melancholiam uterinam, notissimum est. Nihil ergo mirum erit, sæpe numero in ipsis melancholicis affectibus Lienem nequaquam labefactum offendi. Quare etiam celeberrimus *Francisc. de le Boë Sylvius Disp. Med. §. de Liene §. 7.* in cadaverum humanorum ex variis morborum generibus defunctorum longè ultra centum à se dissectorum examine atque observatione valdè est miratus, nullum viscus si cor excipiat musculosum (fibrosum dixerit potius) minus offendi labefactum ipso Liene; etiam in affectibus melancholicis, perperam Lieni vulgò adscriptis. Item in affectibus melancholicis, etiam diuturnis, & post multorum annorum vexationem ad mortem usque egros comitantibus, in cadaverum plu-

rimorum perscrutatione, innoxium, plerumque præ cæteris visceribus sanum vidit Lienem, non inflatum, non induratum, non obstructum. Nunquam certè omnis melancholia à Medicis rationalibus ad Lienem refertur, nec melancholicorum affectuum quorumcunque sedes & causa ab ipsis in uno Lien constituta est.

Si vel unum duntaxat *Platerum*, fidei-
cissimum Practicum cum ratione expe-
derimus, videbimus melancholia
quandoque induci per causas externas
eamque gravissimam, ut loquitur ipse
deterioremque ferè quàm illa, quæ
interna causa evenire solet, ægerrime
curabilem; sic melancholia gravis ac di-
uturna quandoque ex timore exoritur
sic gravis & diuturna ex terrore oboritur
ob visum suspensi hominis cadaver;
melancholia fœminæ aliquando in-
cursa, ad desperationem eam adigens, quæ
nubere alicui coacta fuisset, quem ille
nolebat; sic melancholia aliquando pro
phantasiam oborta; vel ob conscientiam
que

quemcunque cruciatum; vel ob solam imaginationem metumque alicujus periculi concepti; vel ob pudorem & verecundiam ob commissum errorem: quæ exempla affectuum melancholicorum extant apud *Platerum*, tum in *l. 1. Med. Pract. defunct. l. c. 3.* tum in *observat. etiam l. 1.* quæ certè nequaquam à *Platero* ad *Lienem* referuntur.

Ejusmodi generis & illa melancholia est, quam memorat *Platerus l. c.* ex invidia oboriri, quâ cor, ut dici solet, rodatur. Talis accidit iis, quos ambitio inanisque vexat gloria; ac qui amore sui ipsius (philautiâ capti, stulta multa & ludicra jactabundi dicunt, & faciunt: quæ eleganter in milite glorioso sub persona *Thraſonis* & *Pyrgopolinici* in comædiis suis ostenderunt *Comici*. Melancholia ergo oboriri potest, cum innoxius, ac præ cæteris visceribus sanus videtur *Lien*, nec ullo modo inflatus, nec obstructus invenitur.

Ad idem quoque melancholiæ genus delirium illud *Alchymistarum*, ut vocat

Xa *Pla*

Platerus, refertur, qui lapidem illum Philosophorum tanto ardore quærit, et si laborum & impensarum jacturam se facere videant, nihilque efficere vel alios efficisse cognoscant, tamen indefesso labore non remittunt. Tales verò tunc maximè suum producunt affectum, cum solos se sapere sibi persuadent; at alios omnes, qui Chymici ignorant, tum Medicos, tum Philosophos planè rudes esse & inexpertes opinantur.

In sanguinis insuper massa talis esse potest dispositio. ut materiam fermenti idoneam non habeat, nec adeò materiam suggerat Lienì in fermentum convertendam, sed tota transeat per Lienis meatus, Liene ipso visibili nullo affectu laborante. Pororum laxitas ac substantiæ habitudo talis etiam Lienì quandoque obtingere potest, quæ sanguinem quoque sedimentum transmittit, nec materiam fermento idoneam relinquit, quæ tamen dispositio non facillè sensu externo discernitur, si saltem nulla sensu

ni vel inflatio, vel induratio, vel obstructio appareat.

Certè multiplex experientia in Practicorum observationibus obvia fatis est, quæ Lienem quandoque inflatum, vel induratum, vel obstructum ostendit: hæc ratio evidens, quâ concipimus, quantumque evenire posse, ut citra inflationem, vel indurationem, vel obstructionem, ex vitio tamen imperceptibili sensui non fiat in Liene, quòd alias fieri naturaliter consuevit; hæc utraque necessitatem imponit statuendi ac sentiendi, non rarò vitio Lienis contingere, ut sanguinis conveniens fermentatio cedatur. Atque ita usum Lienis confirmat *Thom. Willis l. de Fermentat. c. 5.* quòd viscere malè affecto, sanguis aut fermentescat nimis, uti in affectibus orbucicis aut hypochondriacis; aut si lien sit obstructus, vel scirrhuso tumore obsessus, sanguis idoneâ fermentatione destituatur, atque hydrops, cachexia, et tympanites inducatur. Nec dubitare porrò quisquam cum *Marcello*

Malpighio de viscer. structur. Exerc.
Anat. de Liene c. 6. debet, in quibus li-
 xuriat plus justo Lienosus liquor, in hi-
 ichores exaltari, & sales fixos liberiorre
 reddi, hosque in palati & oris regionem
 in crura & confimilia copiosius confu-
 ere, vel per urinam deturbari, & inter-
 dum in interioribus cavitatibus conge-
 stione vel irruptione factâ, ascitum ex-
 citare.

CAPUT II.

Queritur (2.) An Lien pro vero
proprio subjecto in quolibet scorbut-
to haberi possit?

Autores plurimi qui de scorbuto
 bro scripserunt, Lienem prim-
 riò affectum esse, & ex hujus solius læsi-
 ne reliqua incommoda omnia pend-
 re crediderunt, imò pro hoc, tanquam
 pro aris & focis certârunt. - Cùm verò
 non levia circa horû opinionem occu-
 rant dubia, quæstionem hanc forma-

nobis placuit ; cui tamen extoto calcu-
 um nostrum non subijcimus. Et quam-
 vis crassi & feculenti sanguinis reliquæ,
 Lienī p.n. se habenti, communiter in-
 hæreant, ipsaque autopsia demonstret,
 ipsum tartareorum feculentorum & sa-
 linorum humorum saburrâ obsessum
 universo corpori maximo esse nocu-
 mento, accuratissima tamen exquisitissi-
 morum Anatomicorum ac Medicorum
 perscrutatio in cadavera hoc morbo ex-
 tincta, longè aliud nos docet, ut meritò
 illam opinionem omnibus ferè acceptā,
 nō ita ambabus manibus amplectendam
 esse censeamus. Cl. *Sennertus* l. 3. med.
 pract. part. 5. §. 2. c. 2. in cadavere scor-
 buto extincti aperto, omentum quidem
 totum ferè putridum & corruptum, in
 Liene verò nihil, quod quantum ad sen-
 sum culpari posset, deprehendit. Et *Pet-
 rus Forestus* l. 20. observat. 11. in quo-
 dam Hollandiæ præside magis hepar
 quàm Lienem affectum fuisse diligenter
 annotavit. Sic etiam *Reusnerus Exerc.*
 4. de scorbut. pag. 199. & 200. Viri eu-

iusdam hepar corruptum, callosum
 ὀδύγχλον, & ad depurationem san-
 guinis in idoneum vidit: Lienem ver-
 fore, magnitudine & colore cum hepate sano certantem. Imò Gregor. Hód-
 Pius ipse, qui Lienem ὀδύγχλον πάλιν
 in suo Tract. de scorbut. f. 2. §. 8. statu-
 scorbuticum quendam se vidisse, tom. 1.
 l. 7. observ. 4. meminit, cui jecur totum
 scirrhosum ac tuberosum interius atque
 exterius fuit, nec quidquam vasorum ve-
 sanguinis exhibuit. Lien verò tripl-
 major quàm secundum naturam esse se-
 let, optimè sanus visus est, parenchyma
 jecoris colore lat rubeo, nec non sub-
 stantiâ carnosâ referens. Item in No-
 bili quodam Bavaro, viro 36. circiter an-
 norum ætatis, corpulento, lassitudinē
 spontaneâ, maculis lividis nigrescenti-
 bus in ulcera degenerantibus, in cruri-
 bus ac brachiis affecto, quæ omnia lon-
 ge antè gingivarum sanguinolentia &
 exulceratio præcesserat, ita ut non dubi-
 tandum, quin scorbuto confirmato la-
 boraret, in quo post mortem Lien quo-
 quæ

que sat inculpata constitutionis | viscus
 sanguineum referens, inventus fuit. Et
 Cl. Thom. Willis Dissertat. Epistolic. Idem
 urin. c. 4 pag. 353. post plurimum scorbu-
 ticorum cadaverum dissectionem mul-
 toties observavit hepar aut cystin fel-
 leam in culpa fuisse. Invenit enim in
 nonnullis hepar prorsus exangue & in-
 star uberis vaccini exsiccum: in aliis ve-
 sicam bilariam prorsus vacuum & ina-
 nem, in aliis lapidibus oblitam, in aliis a-
 murcâ minimè amarescente repletam;
 Lienem verò optimè validum & sanum.

Conclusionem ergò hîc à particulari
 ad universale facere non possumus; &
 per consequens Lien neque primariò,
 neque semper & in omni scorbutico
 à *τοῦ σκωρβυτικοῦ* afficitur, & propterea sub-
 jecti proprii nomen minimè sibi tribuit.
 Interim & sæpius contingit, quod Lien
 forma humoris specificè corrupti impri-
 matur, sicque scorbutica *ἡσθένσις*
 inducatur, cum tamen τὸ πρῶτον δυνάμεν
 sive primum subiectum ejus non
 semper sit.

CAPUT III.

*Quaritur (3.) An in affectibus Lienis
potius in sinistro quàm dextro latere
vena sit secanda ?*

DE loco, in quo in affectibus Lienis
sit secanda vena, diversæ sunt Au-
torum sententiæ, Galenus l. 2. ad Glau-
con. de art. curand. c. 2 l. 13. meth.
med. c. 10. & l. de curand. rat. per
vena sect. c. 16. Guil. Placentinus
in Summ. conservat. & curat. c. 119.
& 122. Sylvaticus controvers. med.
42. Sal. Albertus l. de scorbuto g.
240. Platerus tom. 3. med. Pract. l.
2. c. 4. Ronseus de magn. Lien. c. 8.
Forestus l. 20. observ. II. VVierus l.
de morb. incogn. & de scorbut. pag. II.
Franc. Vallesius controvers. Med. &
Philosoph. l. 7. c. 5. Spigelius Fabric.
corp. hum. l. 8. c. 14. & Riolanus l. 2.

anthropolog. c. 13. defendunt partes, & in sinistro brachio sanguinem esse mittendum ob maiorem lateris sinistri cum Liene consensum & sympathiam suadent.

Verùm *Thaddaus Dunus l. 1. art. evan-
guand. rat. per venâ sect. c. 3.* *Reusnerus
de scorbut Exer. 7.* *Sennertus instit. med.
l. 5. part. 2. s. 1. c. 17. l. 2. de febr. c. 19.*
& *Gregor. Horstius tom. 2. l. 7. tra-
ctat. de scorbut. sect. 2. §. 11.* prærogati-
vam hanc Lienì minimè concedunt, sed
& in dextro brachio venæ sectionem u-
tiliter institui posse scribunt. Et rectè
ac dextrè quidem. Venæ enim sinistri
lateris æque ac dextri ex uno fonte de-
ducuntur, nimirum è cavæ venæ trun-
co. Iam sive in sinistro, sive in dextro
brachio vena secetur perinde est: U-
trumque enim unico gaudet fonte, uni-
cum habet truncum, per quem sanguini
adscendendum erit. Vid. *Meth. ratio-
nal. curand. Camilli Raven. c. 41. pag. 318.*

Qualis verò eligatur vena, indicatio-
nes monstrabunt. Secari tamen ple-
rumque solent basilica, Mediana, ce-
pha-

phalica, salva tella, saphæna, poplitea, pollicaris, venæ labiorum & hypoglottidum &c. procujuscunque scilicet indicantis ratione. Et hoc modo sæpius unâ fideliâ (ut commune habet proverbium) duo parietes de albari possunt.

CAPUT IV.

Queritur (4.) An Salvatella sectio in affectibus Lienis eam, quæ vulgò jactatur, utilitatem habeat?

DE venæ Salvatellæ sectione, & u-
sibus, qui ex ejus sectione prove-
niunt, Medici itidem inter se discrepant,
alii, ut Galenus de curand. rat. per sang.
miss. c. 14. Alex. Trallian. l. 8. c. 12. Oriba-
sius Collect. l. 7. c. 7. Aëtius tetrab. 1. serm.
3 c. 12. eam imprimis in affectibus Lien-
is prodesse dicunt. Idem statuunt
Mauritani plurimi, & venæ hujus se-
ctionem valdè commendant, non solum
ad Lienis, sed aliarum partium morbos,
unde

unde etiam nati versus *Schola Salernita-*
nec. 103.

Ex salvatella tibi plurima dona
minuta:

Splenem, hepar, pectus, vocem, pra-
cordia purgat,

Innaturalem tollit de corde dolo-
rem.

Alii hanc opinionem impugnant, qui, licet concedant, ubi in cubito maiores venæ non apparent, has venas secari posse: hoc tamen negant, quod Lienis affectibus peculiariter prosint. Interquos est *Horatius Augennus*, qui l. de miss. sang. c. 6. scribit: *Quid parvarum venarum sectio amplius faciat, quod magnarum efficere non potuerit?* Et postea addit: *Et si affectus Lienis juvantur hoc auxilio, quando magnarum venarum incisio, fieri non potuit: tamen non æque, ut magnarum venarum juvare duplici de causa: primo, quia distantes sunt à partibus affectis: deinde quia parvæ venæ sanguinem crassum e-*

vacuare nō possunt. Imprimis v. idurget
Angenius, quōd illi, qui salvatellæ sec-
 tionem laudant, nullam ejus rei ratio-
 nem reddere possunt, sed experientiam
 saltem prætendunt. Ipse verò ait, se
 istam experientiam cognoscere non po-
 tuisse, imò potius hoc observâsse, eam
 venæ sectionem multis nocuisse.

Habet quidem sectio hujus salvatellæ
 suas laudes, ac in variis affectibus sum-
 ma cum utilitate institui potest; velut
 nos etiam civem quendam Embdanum
 in febris tertiana ex ejus sectione ma-
 gnum auxilium percepisse observavimus;
 verum ei peculiarem quandam præro-
 gativam, quōd sinistra sit, attribuere, au-
 topia anatomica repugnat, cum nullam
 cum Liene, vel ejus ramo splenico habe-
 at connectionem (quemadmodum testatur
Aretæo l. 2. de acut. morb. curat. c. 2. eam
 ad Lienem usque pertingere nonnulli
 putârunt) sed iste ramus à cubiti venâ
 propagetur. Experientia quoque in
 hac sectione sæpius fallax est. Nam ut
 sit certa experientia, & ut omnis effe-

Etus alicui auxilio adscribatur, ipsum solum usurpatum fuisse necessarium est. Nam si plura simul in usum trahantur auxilia, atque aliquis effectus inde subsequatur, cui is tribuendus sit, dubium est. Id quod etiam in sectione salvatellæ locum habet, Nam si alia plura præcesserunt remedia, & postea salvatella quoque aperiatur, atque æger indè melius habeat: certè soli salvatellæ apertæ effectus is assignari non potest.

Nec obstat, quòd *Vallesius l. 7. Controvers. c. 5.* novam adducat rationem, quòd scilicet membra secundum rectitudinem excrementa sua deponere, & exponere soleant: quia maximè dubium hoc est, cum excrementa vergant ad sua receptacula, si dantur, si minus, ad partes imbecilliores decumbunt. Hæc ratione dextram corporis partem ad glandulas ejusdem lateris post aures, circa alas & inguina sua excrementa exonerare concedimus. At venarum alia est ratio, quæ distribuuntur in totum corpus, & per consequens etiam in extremi-

tremitates, non ut excrementa deponant, quod fit per accidens, quia accidit, ut sanguis p.n. impuritate laboret; sed ut sanguinem à nutritione superfluum ad cor reducant. Adde, quòd eadem superesset difficultas; quomodo enim Lien magis ad salvatellam sinistræ manûs quàm dextræ deponeret excrementa sua, cum æqualiter unaquæque tam à jecore quàm Liene distet. leg. plur. apud Joh. Baptistam Sylvaticum *Conrovers.* 43. *Zacut. Lusitan.* l. 1. *Med. Princip. Histor.* 14. *Adr. Spigel.* l. 5. *Fabric. corp. hum.* c. 7. *Sennert.* l. 2. d. *Febr.* c. 19. & *Paralipom.* 23. ad l. 2. de febr. c. 19. *Horstium tom.* 2. l. 7 tract. de scorbut. f. 2. §. II. &c.

CAPUT V.

Queritur (5.) An hemorrhoidum & Mensium provocatio affectibus Lienis conveniat?

EVacuatio sanguinis vicaria interdum pro venæ sectione substitui potest, nimirum tunc temporis, ubi fortas-

is natura subjecti magis hæmorrhoidum vel mensium provocationem, quam venarum incisionem suadet. Si igitur vel ob consuetas evacuationes suppressas vel alias ob causas materia peccans eò vergit, naturæ succurrendum per illa remedia, quæ ad hæmorrhoidum mensiumq; reperationem faciunt, quia commodissimè per illa loca ducitur materia peccans, ad quæ suâ naturâ vergere videtur, ut ex Hippocrate s. 1. aph. 21. colligere licet.

CAPUT VI.

Quæritur (6.) An Lienosis usus aceti conducat?

Videtur, quòd non; cum enim teste Galeno l. 4. simpl. med. c. 12. ejusmodi vires acetum habeat, ut juxta Mercurium l. 6. de febr. gignendo melancholico succo sit accommodatissimum, consequens erit, illud ipsum Lienosis minimè convenire: cui ratio ejusdem Mercurii l. 1. de morb. intern. curat. c. 17. succedit, similitudo scilicet aceti & melancholiæ.

ejus respectu intempestivus acidorum
usus melancholiam generat. *Hippo-*
crates etiam l. 3. de vict. acut. t. 38, acetum
melancholicis adversissimum esse scri-
bit :

Contra *Galenus* l. II. meth. med. & l. 9.
de medicam. comp. K. T. c. 7. Lienosis acce-
tum convenire manifestis verbis asserit ;
ubi spleneticis medicamentis aliquid ae-
reti commiscendum esse statuit. Hanc
Galenus assertionem Practicorum plerique
sequuntur, usum aceti Lienosis conce-
dendo, non simpliciter, sed quatenus ae-
cetum desiccet, attenuat, & crassitiem ac-
viscositatem incidit.

Mercurialis l. 3. de morb. med. c. 22.
pro quaestione hujus decisione notat,
quod melancholicus humor possit au-
geri à medicamentis vel alimentis dupli-
citer, vel secundum qualitatem solam,
vel secundum substantiam : primo mo-
do acetum auget melancholiam, eod-
quod faciat aciditatem, quæ est propria
melancholiæ, sed non secundo, quia
hæc ratione potius diminuit eandem,
qua-

quatenus aciditate sua penetrat, obstructions dissolvit. Hæc *Mercurialis* sententia ut magis intelligatur, distinguendum venit inter melancholicum sanguinem, qui secundum naturam generatur, & inter impuritates varias, ex quibus obstructions & scirrhi Lienis nascuntur: illum quoad qualitatem auget acetum; has verò dirimit & dissolvit.

Nos potius pro quæstionis hujus intellectione inter aceti usum modicum ac tempestivum, & inter immodicum & intempestivum distinguimus. Modicus ac tempestivus aceti usus Lieni gratissimum pabulum est, eum corroborat, ac humores crassos & viscosos in ipso stantibus incidit & dissolvit. Immodicus verò & intempestivus ejus usus, cum vigilias inducat, intestina lædat, humores exaltet ac fermentet, atque præterea corpus exsiccet atque refrigeret, Lienosis & scorbuticis utique adversatur; & in specie mulieribus magis bellum indicit acetum quam viris; utero enim dolorificum est

CAPUT VII.

Quæritur (7.) An Lienosis & Scorbuticis fontes aciduli conveniant?

IN affectibus spleneticis & scorbuticis, ubi optima medicamenta interdum nihil valent, fontes aciduli, sapore subacrescentis vini longè gratissimi, multum auxilii præstant, quatenus scilicet incidunt, dissolvunt, obstructiones tollunt, acrimoniam humorum obtundunt, & visceribus affectis robur addunt, prout mineram ferri sulphurisque maxima ex parte præterfluentes, ejusmodi virtutes imbibunt, ut ob spiritus illorum metallorum sibi unitos varios & admirandos in humano corpore effectus producant.

De virtutibus ejusmodi fontium acidulorum in affectibus hepatis, Lienis ac aliis contumacibus egregie scribit *Felix Platerus Quest. Medic. 87. pag. 158. 159. Aquas illas naturâ acidas multis profuisse experientia testa-*

tur, cum multi ex obstructionibus viscerum malum corporis contrahentes, cachexiâ diutinâ laborantes, & quibus hydropis imminabat periculum, harum potu restituti sint, multis, quibus muliebria defecerant, harum usu revocata fuerint. Et quibus alvi constipatio familiaris, sitis præter naturalis inordinata, prostrata appetentia, aliæque, quæ bilis præsertim afferre solet incommoda, negotium facessabant, melius post illarum usum habuerunt. Quibus sabulum, arena, calculi in renibus aut vesica congesta, nephriticos dolores pepererant, postea ab illis liberi & immunes facti sint; & præsertim quibus illuvies fæda, biliosa, putris, maligna, in venis mesaraicis coacerata, diuque retenta, varia accidensia, quæ melancholiam hypochondriacam, epilepsiam, febres intermittentes, præire, minari, atque procreare

creare solent, induxerat, potu acidiorum, per diarrhaam, quam illa plierumque movere solent, excussa, manifesteque in ipsis excrementis subcinereis & subnigris apparente, ab ejusmodi gravibus affectibus, quorum praeludia jam senserant, liberati fuerunt. Alii quoque scabritie & psorâ infectis ulceribus cacoëtheis & malignis infecti, balneo harum aquarum curati sunt.

CAPUT. IIX.

Queritur (8.) An in Lienis ac hepatis Obstructionibus chalybis usus prosit?

IN affectibus Lienis ac hepatis multum celebrari chalybem & veterum & recentiorum observationes abunde testantur. Quomodo verò, quave virtute aut energiâ tale præstet officium controversatur. De temperamento quoque non levia occurrunt litigia. Nonnulli illum temperatum, alii frigidum

alii calidum & siccissimum esse, atque ideo in his affectionibus minus convenire volunt. Alii pondere partes obstructas permeare, & ita ab infarctu liberari vasa contendunt. Alii abstergendi & aperiendi vim habere statuunt, atque sic mucosas obstruentesque particulas eliminari volunt, cum humores à parte, cui adhæreant, quasi abradat. Alii peculiarem cum humore melancholico & adusto habere cognationem, atque ideo illum seu attrahere, seu imbibere, & cum eo uniri autumant, cum bilis atra seu melancholia vitriolata naturæ sit particeps, & ferruginei quid sapiat, quæ cum crassiori chalybe unita per alvum exturbatur. Alii illum adstringere; calorem & humorum effervescentiam reprimere; atque ideo in dysenteria perutile haberi remedium. Alii illum desiccare, ulcera agglutinare. Alii alvum turbare, vomitumque ciere; alii vomitum sistere, ac reprimere contendunt. Adeo ut non leve sit negotium determinare, an consultius illi fecerint, qui

qui in dysenteria & hæmorrhagia (ut
 statur fluxus) chalybis suaserunt usum
 an qui in viscerum & mesenterii obstruc-
 tione, ut fundantur humores & reser-
 ta vasa infarctus exturbent suos, usum
 iam suadent chalybis. Sine discrimi-
 nâ Medicis præscribitur, & experientia
 approbat usum; hepatis etenim Lienis
 que obstructionibus aperiendis primis
 utilis est. Quare ad affectionem hypo-
 chondriacam, scorbutum, hydropem
 cachexiam in mulieribus ex mensium
 obstructione, aliisque pertinacibus
 Lienis & hepatis obstructionibus ortis
 morbos probatum est remedium, & me-
 ritò ob id magnificandum. *Plinius* *Fi-*
stor. Nat. l. 34. c. 15. inter alia de chaly-
 bis usu scribit: *Propinatur contra Lienis*
vitia; absomit enim illa. *Pav-*
Aegineta de Re Med. l. 3. c. 49. aquam
in qua extinctum candens ferrum,
potam spleneticis competere, scribit
Dioscorides l. 5. c. 53. *Lienosis auxili-*
ri. *Aëtius tetrab. 3. serm. 2. c. 11.* *Lien-*

nosus præstantissimum esse remedium,
ait, aquam vinum aut poscam, in qui-
bus ferrum extinctum fuerit, per mul-
tos dies sumptam. Oribasius Synops.
l. 9. c. 24. cæliacis & Lienosis multum
conferre autor est. Et Rhases Lienis
tumoribus utilem esse scribit. Quæ o-
mnia & posteriores Medici confirmant,
& omnes uno ore ferrum & chalybem
Lienis obstructionibus prodesse testan-
tur. Atque inter eos Jul. Cesar Clau-
dinus Respons. Medic. 29. scribit,
proprium melancholia hypochondriaca
alexipharmacum esse chalybem, quoniã
continuus illius usus semper felicem
finem in agris sit assequutus: siquidem
in reserandis obstructionibus, in qui-
bus omnis melancholia curanda cardo
versatur, nulli medicamento cedat
Mercatus etiam de morb. mulier. l. 2.
c. 6. refert, tantam esse chalybis natu-
ram & efficaciam, ut magnos etiam Li-

enis & uteri scirrhus persanasse visum
sit. Et de intern. morb. curat. l. 1.

27. Incredibili efficaciam affectioni hypochondriaca chalybem proudesse, id
experimento esse confirmatum, in
omnibus ferè affectionis hypochondri-
ca causis usum chalybis commodum
esse, siue in fœminis ex utero, siue in
eis, ac viris ex ventriculo, mesenterio
hepate, aut splene obstructis, aut quolibet
humore obsessis malum oriatur.

Chalybis hujus egregium usum
hisce affectibus illustrat historia, cujus
mentionem facit Celeberr. Rolsincius.
2. cons. 7. Magni nominis Melanchol-
icus ex mentis perturbatione, viso epilep-
tico in terram desubito prostrato, ha-
specie depravatae imaginationis labora-
rans, quod non posset in arce sua degen-
tere sine magnis cordis angustiis, peregrè au-
tem profectus nihil mali sensit. Hic nu-
merosis iuvantibus aliis, solo usu pilularum
electicarum, cum croco Martis nigro

& speciebus diarrhodon per multas septimanas singulis ferè diebus sumptis liberatus, his solis salvam valetudinem adscripsit.

Fluxus deinde omnes, hæmorrhagiam & dysenteriam stypticitate suâ facile cohibet etiam chalybs. Intestinorum lubricitatem & laxitatem constringit, poros constipando sudores reprimat; hæmorrhagiam sistit; aperta vasa restringendo consolidat, expectorationem prohibet, cum vasa cohibendo angustiora reddat.

Quomodo autem chalybs diversos hos effectus præstet, non pauci sunt, qui dubitant; cum hi planè contrarii sint; & partim frigoris partim caloris comites. Sed meo iudicio, nulla est dubitatio, & variis modis illi potest satisfieri. Quid enim mirum, si diversos effectus promat chalybs, cum multa alia reperiantur medicamenta, quæ diversis & penè contrariis qualitatibus sunt prædita, ob diversitatem partium, è quibus constant. Constare autem diversis & he-

terogeneis partibus chalybem, ac non
frigidis tantum, sed etiam calidis, vel im-
de constat, quod ferrum ipsum, è quo
conficitur, eas in se continet. Ac de fri-
gidis quidem nemo dubitat, cum ex *Ga-
leno & Aristotele* terreum sit, & suam
consistentiam à frigore habeat. De cali-
dis autem patet, tum quia etiam ipsum ex
*Paulo, Actio, Dioscoride, Avicenna,
Halyabbate & Rhase* ventrem solvat, &
scirrhus Lienis dissipat; tum quia ex *Ga-
leno* omnia metalla plurimam substan-
tiam igneam habent, ut nos putamus,
ob sulphur, quod in sui compositione
recipiunt. Quod si igitur in ferro ca-
lidæ partes sunt, cur non & multò magis
inerunt in chalybe, cum ab igne aduren-
te, cujus vi è ferro conficitur, eas maxi-
mè vigorari, nemo possit ire inficias; sed
& illud dici potest, quod aperiat & de-
tergat chalybs, non habere illud à calo-
re, sed id fieri ratione vel adstringentis,
quâ pollet, facultatis, vel exiccantis.
Nam adstrictionem non parùm facere ad-
referendas obstructions, ex eo confir-

marit

marifacilè potest, quòd videlicet ex ad-
strictione roboratæ partes facilius me-
liusque materiam morbificam vincunt
& superant; quæ autem vehementer ex-
siccant, ea evacuant quoque insensibili-
ter, ita ut jure merito de chalybe etiam
affirmari possit, obstructions tollere,
quatenus exsiccando, humiditates excre-
mentitias obstruentes absumit.

Facultate autem suâ stypticâ potissi-
mum vicem remedii obtinere chalybem
testatur etiam Cl. *Hghmorius l. de affect.*
hypochondr. c. 9. quorum scilicet vasa in-
teriora cuncta, aut partis alicujus parti-
cularis præcipua nimium relaxata, totius
massæ redundantiam recipiunt, atq; in-
de debilitantur, vicinas partes gravant, &
debitam circulationem retardant. Hæc
vitrioli stypticitas constringit rursus &
contrahit, ut æquali proportionē ad sin-
gula vasa derivetur sanguis, atque hoc
modo singulis partibus proportionatus
communicetur & sanguis & calor, ac va-
sa excretoria dicata redundantiam illam
ac onus proprium n. odè in majoribus

internis contentum fuscipiunt, debiteo
tempore excernunt, non quòd obstruend
referet, sed quia nimium relaxata co
stringit chalybs. Quomodo verò ch
lybs corrigatur, ac alia etiam medic
menta utilissima ex eo sint præparand
quomodo item exhibeatur, & quando
usurpandus, lege apud Sennertum l.
Med. Pract. pars 5. sect. 1. c. 6. Jul. C.
Claudin. in appendic. de ingressu ad insir
sect. 2. & Paul. Zachiam l. 1. c. 21. de affe
hypochondr.

CAPVT IX.

Quaritur (9.) Num etiam moderata
quædam ambulatio Lienis sit con-
ducibilis?

QUòd moderata quædam ambulatio
Lienis maximè conducatur, *Plantus*
circul. act. 2. sc. 2. v. 29. tradit; ita eni
ille:

Lien directu' sit P. A. ambula, id enim E
eni optimum' sit.

Et hoc etiam alii cum *Plauto* confen
tunt. Curios etenim in morbis splenis
quibusdam ad eò strenuè iuvare deprec
h. 2.

henditur, ut etiam *Aëtius Amidenus* se alios novisse referat, qui solis cursibus ac deambulationibus ab omni affectione sunt liberati.

Theod. Priscianus, & ante eum *Aretaeus* gestationes adhibendas voluerunt in spleneticis. Item, teste *Mercuriali de art. Gymn.* l. 5. pag. 250. spleneticos cursum debere appetere dixit. Et *Aëtius* l. 3. serm. 2. c. 28. cursum Lienis tumores deprimere scribit.

Plutarchus in vit. *Demosthenis* ex aliorum relatione hoc sequenti quoque confirmat historiâ: *Laomedontem* quendam *Orchomenium* spleneticum & cachecticum, cui à Medicis praescriptum fuerat, ut crebrâ & contentâ ambulatione cursuque uteretur, si à morbo huiusmodi liberari volebat, adeò currendo levatum esse, ut summus cursor evaserit, obque id ausus sit ad certamina aggredi, in quibus coronâ victores donabantur. Atque ita Anatomia hæc

Lig.

Lienis paucis à nobis tradita est ; Summo ergò nostro Opifici sit laus, honor
atque gloria in æternum !

FINIS.

Errata emendanda.

Pag. 9. l. 27. leg. acquirente. p. 29. l. 6. leg. sanus. pag. 34. l. 10. leg. Synonymia. l. 10. leg. locum. l. 26. leg. *αίμα* *Ιάδης*. p. 36. 13. post throni del. & p. 41. l. 17. leg. auct. p. 44. l. 11. post lutulentorum leg. luvium. p. 46. l. 25. leg. Lienosum. pag. 47 l. 16 leg. trifidum. l. 26. leg. panarolus. p. 48. l. 17. post Romæ leg. legimus. p. 49. l. 5. leg. Vesalius, item corp. p. 66. l. 2. leg. viscus. p. 72. l. 2. leg. consortii. pag. 9. l. 10. leg. conturbato. l. 11. l. concreta. l. 2. leg. Fabric. p. 101. l. 17. leg. fluore. p. 13. l. 19. leg. filamentorum. p. 155. l. 10. leg. riam in. p. 288. l. 16. del. in; adde post *extremis* *currente*, sed etiam in extremis capsula

finibus, nam; ubi del. non. p. 199. l. 10.
 leg. hyponchondriacâ. p. 204. l. 26. leg.
 physiolog. p. 230. l. 12. leg. fiunt. p. 237. l.
 21. leg. attollatur. p. 238. l. 2. leg. audaci⁹. p.
 286. l. 18. leg. sanguinê. l. 22. leg. fermenti
 p. 307. l. 18. leg. digitum. p. 300. l. 4. leg. a-
 quas. l. 25. leg. interdum. p. 361. l. 8. leg. de-
 stillatione p. 364. l. 26. add. lib. 4. p. 364. l.
 17. leg. oleaginosus. p. 371. l. 25. post Et
 leg. Galenus l. 1. ad Glauco. c. 14. p. 402. l.
 26. leg. critica p. 405. l. 2. leg. Phlegmo-
 nes. p. 413. l. 5. leg. steatomatis. p. 419. l. 17.
 leg. genua. p. 449. l. 5. leg. quidem. p. 452.
 l. 17. leg. ulcuscula. p. 501. l. 3. leg. con-
 venire. Reliqua, quæ per absentiam
 Autoris huic Libro irrepsere, benevo-
 lus Lector facillè corriget.







